



## 백일해 예방수칙 안내

(우 54072) 전라북도 군산시 공포3로 48(조촌동) 교무실 : 063-453-9009 행정실 : 063-454-8083 (fax : 063-454-8084)

학부모님 안녕하세요.

최근 백일해 유행이 발생하여 이에 관하여 알려드리니 백일해 예방 및 전파 차단에 협조하여 주시기 바랍니다.

### 1. 백일해란?

백일해는 전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병으로 처음에는 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 기침이 점진적으로 심해져서 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타납니다. 이후 심한 기침 발작 후 좁아진 성대를 통해 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 '웁(Whoop)'소리가 발생합니다.

백일해는 호흡기 분비물 등의 비말 등을 통하여 호흡기로 감염되므로 기본적으로 손 위생 등 개인위생 수칙을 준수하고, 기침 증상이 있는 사람과의 접촉을 피하시기 바랍니다. 또한 기침 증상이 있는 사람의 경우에는 의료기관이나 보건소에 방문하실 때 반드시 마스크를 착용하시기 바랍니다.

### 2. 백일해 예방접종 안내

귀댁의 자녀가 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)을 접종받도록 합니다.

**\* DTaP 예방접종 주요 내용(디프테리아, 백일해, 파상풍)**

**접종기준:** 기본 접종 3회 (생후 2, 4, 6개월), 추가접종 3회 (생후 15~18개월, 4~6세, 11~12세)

**접종비용:** 무료 (단, 성인의 경우 유료 접종)

### 3. 자녀가 백일해에 걸렸거나 의심될 경우

- 1) 백일해에 걸렸거나 의심될 경우 반드시 마스크를 착용하고 의료기관이나 보건소에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다. (진단검사는 비인두 흡인액 등을 채취하여 백일해를 신속히 진단 및 치료하고, 추가 전파를 차단하기 위해 필요합니다.)
- 2) 백일해를 진단받은 경우 담임선생님과 보건선생님에게 자녀가 백일해에 걸렸음을 알립니다.
- 3) 백일해 항생제 치료 중인 경우에는 치료 5일 후까지(치료를 받지 않은 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리)는 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 등교를 하지 않고 자택 격리 치료 또는 입원 치료를 받도록 합니다.
- 4) 손 씻기를 자주하고 기침이나 재채기할 때는 반드시 휴지를 사용하거나 손수건이나 옷으로 가리도록 합니다.
- 5) 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용합니다.

2023. 11. 24.

군 산 금 빛 초 등 학 교 장