



‘꿈이 싹싹, 사랑 듬뿍, 행복 가득’ 봉서유치원

11월 보건소식지

제 2024-47호

학부모님, 안녕하십니까?

질병관리청과 교육부에서는 인플루엔자 확산 및 전파 차단을 위한 ‘어린이 인플루엔자 예방접종 집중 접종기간’을 운영하고 있습니다.

이와 관련하여, 관심 있으신 학부모님께서서는 겨울철 유아의 건강보호를 위하여 인플루엔자 접종에 관심을 가져주시길 바랍니다. 또한, 건강 관리를 위하여 평소 손씻기와 기침 예절 등 예방수칙을 잘 지킬 수 있도록 가정에서도 지도 부탁드립니다.

지원대상

생후 6개월 ~ 13세 어린이 [2011.1.1. ~ 2024.8.31.출생자]

지원내용

인플루엔자 4가 예방접종 1회

지원기간

· 2회 접종 대상자		2024.9.20.(금) ~ 2025.4.30.(수)
· 1회 접종 대상자		2024.10.2.(수) ~ 2025.4.30.(수)

접종기관

지정의료기관 및 보건소

*예방접종도우미 누리집에서 확인 가능, 보건소는 방문 전 확인 필수

이런 분들은 예방접종을 하시는 안 됩니다!

- ☑ 과거 인플루엔자 예방접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☑ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ☑ 인플루엔자 예방접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ☑ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기

예방접종도우미
바로가기



QR 코드를
스캔해주세요

검색창에

예방접종도우미

검색해주세요

예방접종 전·후 주의사항

- ☑ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다
- ☑ 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다
- ☑ 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다
- ☑ 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다
- ☑ 접종 부위는 청결하게 유지합니다
- ☑ 접종 후 2~3일간은 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다

의료기관 방문 시 행동수칙

- 1 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용
- 2 손소독제 개인위생 수칙 준수
- 3 접종 후 현장에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가

인플루엔자 예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- ☑ 국소 이상반응: 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ☑ 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등



부어오름, 통증



발열



무력감



근육통



두통

예방접종 후 이상반응이 생기면

- 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다

인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- ☑ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ☑ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등을 만지지 않기
- ☑ 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침 예절 지키기
- ☑ 인플루엔자에 감염되었을 경우 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에 등원·등교 자제하기
- ☑ 감작스러운 발열과 콧물, 인후통, 근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 곧바로 가까운 의료기관에서 진료받기

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있으며, 「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.

2024. 11. 1.

봉서유치원장