

보도참고자료



보도일시	배포즉시	대변인실	044-203-6588
배포일시	2017. 5. 23.(화)		
담당부서	교육부 학생건강정책과	과장 조명연, 사무관 정희권 (044-203-6547)	
	질병관리본부 감염병감시과 예방접종관리과	과장 이동한, 연구사 인혜경 (043-719-7167) 과장 공인식, 연구관 엄혜은 (043-719-6828)	

2018 평창동계올림픽과 패럴림픽 대회, 이제는 평창입니다.

수두 환자 및 집단발생 증가, 차단은 예방수칙 준수로

- ◇ 만12세 이하 어린이, 보건소와 지정 의료기관에서 주소지 관계없이 수두 무료접종
- ◇ 감염예방 위해 기침예절 지키기 및 30초 이상 손씻기 등 개인위생수칙 준수
- ◇ 집단감염 방지를 위해 감염환자 등원·등교 중지

□ 교육부와 질병관리본부는 봄철 수두 환자 증가가 지속됨에 따라 감염예방을 위해 학부모, 교사의 적극적인 협조를 당부하였다.

○ 우선, 수두 예방접종 일정*에 맞춰 제때 접종을 하고, 어린이의 예방접종력**을 확인하여 빠뜨렸다면 지금이라도 접종하며,

* 생후 12~15개월 1회 예방접종 권장('04.1.1일 이후 출생아는 「어린이 국가예방접종 지원사업」을 통해 가까운 보건소 및 지정 의료기관에서 1회 무료 접종 가능)

** 자녀의 접종기록과 지정 의료기관은 예방접종도우미(<https://nip.cdc.go.kr>) 홈페이지와 모바일 어플리케이션을 통해 보호자가 직접 확인 가능

○ 둘째, 기침예절과 30초 이상 손씻기 등 개인위생 수칙을 준수하고,


* 수두는 발진이 나타나기 1~2일 전부터 감염자의 침방울(비말) 등 호흡기 분비물로 인한 공기 전파와 수포성 병변의 직접 접촉으로 전파

- 셋째, 발진 등 수두 의심증상*이 있는 경우 가까운 의료기관에서 진료를 받고, 모든 수포에 딱지가 앉아 전염력이 없어졌다고 의사가 판정하면 어린이집·학교에 등원·등교하도록 권고하였다.

* 수두는 미열을 시작으로 온몸에 발진성 수포(물집)가 1주일 가량 발생하며, 전염력이 강함

- 수두 집단 발생 학교는 학생들이 밀접하게 접촉하는 단체행사 등 모임 자체
- 의료기관에서는 수두 환자진료 시 환자·보호자에게 등원·등교 중지 등 전파예방교육 실시

- 질병관리본부 관계자는 수두가 금년 4월 이후 지속적으로 증가하고 있고, 주로 6세 이하 미취학 아동과 초등학교 저학년생에서 발생률이 높아 봄철 유행 시기(4월~6월)동안 당분간 증가세는 지속될 수 있다고 설명하면서,



<수두 연도별, 주별 신고 현황, 2017년 19주>

- 보육시설과 학교에서는 조기 차단 및 확산 방지를 위해 수두 집단 환자*가 발생한 경우 관할 보건소에 바로 알려줄 것을 당부하였다.

* 3주 이내 동일 학급(집단)에서 해당 학급의 5%이상 수두환자가 발생한 경우


<붙임> 1. 질병의 개요

2. 단체생활 감염병 예방수칙 및 손씻기 등 개인위생 실천



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 교육부 학생 건강정책과 정희권 사무관(☎ 044-203-6548), 질병관리본부 감염병감시과 인혜경 연구사(☎ 043-719-7167)에게 연락주시기 바랍니다.

□ 수두

구 분	내 용
병원체	수두 대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)
전파경로	수포성 병변에 직접접촉, 호흡기분비물의 공기전파를 통해 감염
증상 및 임상경과	<div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 잠복기는 10~21일(평균 14~16일)이며, 발진 발생 1~2일 전 권태감과 미열이 나타난 뒤 발진이 발생(소아의 경우 발진이 첫 번째 증상으로 나타나기도 함) ■ 발진은 보통 머리에서 처음 나타나 몸통, 사지로 퍼져나가는데 그 과정에서 반점, 구진, 수포, 농포와 같은 다른 형태로 진행되고, 회복기에 이르면 모든 병변에 가피가 형성 ■ 수두는 일반적으로 증상이 가볍고 자가 치유되는 질환이나 간혹 합병증(2차 피부감염, 폐렴, 신경계 질환)을 동반 </div>  <div>[수두 증상]</div>
치료	대증요법(피부병소의 세균감염을 줄이기 위한 목욕, 항히스타민제 투여 등)
유행양상	<ul style="list-style-type: none"> ■ 수두는 피부병변과의 접촉 또는 말하거나 재채기할 때 나오는 호흡기분비물을 통해 감염되므로, 집단생활을 하는 학교 등에서 발생 증가가 우려됨 ■ 수두는 연중 4~6월, 11~1월에 많이 발생하며, 4~6세 연령대에서 발생률이 높음
환자관리	전파방지를 위해 환자는 모든 병변이 가피로 앓을 때까지 격리가 필요함
예방	<p>수두 예방을 위해서는 개인위생 수칙을 준수하고, 수두를 앓은 적이 없거나 예방접종을 받지 않은 소아는 예방접종을 받아야 함</p> <p>* 접종기준: 생후 12~15개월 1회 예방접종</p>

□ 단체생활 감염병 예방수칙

- ✓ 첫째, 비누를 사용하여 30초 이상 손을 자주 씻고, 기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침예절을 지켜주세요.
- ✓ 둘째, 감염병 의심증상이 발생한 경우 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에 방문하여 진료를 받으세요.
- ✓ 셋째, 집단유행을 막기 위해 감염 환자는 전염기간* 동안에는 등원·등교(학원 등 사람이 많은 장소 포함)를 하지 않도록 하세요.

* 등원·등교중지 기간: (수두) 모든 수포에 딱지가 앉을 때까지 격리

□ 올바른 손씻기(30초 이상) 및 기침예절 지키기

