



제2군 감염병 수두예방 정보


발행인: 부귀중학교장
 편집인: 보건교사 신자현
 발행처: 부귀중 보건실
 보건실 070-4278-5602

우) 55416 진안군 부귀면 상거석길 14-7 교무실 063)432-8546 FAX 063)433-4885

학부모님, 안녕하십니까?

질병관리본부를 통해 수집된 전 연령 자료를 분석한 결과에 의하면 지난해 동기간 대비 18.2% 수두 발생이 증가하고 있어 수두예방 정보를 안내해 드립니다. 집단생활을 하는 학교에서 발생증가가 우려되고 있으며, 수두는 전염력이 매우 강하므로 각 가정에서 자녀의 건강상태를 잘 살피시어 건강하게 학교생활을 할 수 있도록 학부모님들의 각별한 관심 부탁드립니다.

□ 최근 추세



구 분	내 용
병원체	수두 대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)
전파경로	주로 감염자의 호흡기분비물(비말)로 사람 간 전파가 이루어짐
증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> • 잠복기 : 10~21일(평균 14~16일) • 전구기 : 발진 발생 1일 내지 2일 전 발생할 수 있으며 권태감과 미열이 나타남. 소아는 발진이 첫 번째 증후로 나타나는 경우가 많음 • 발진기 : 발진은 주로 몸통, 두피, 얼굴에 발생하며 소양감을 동반하고, 24시간 내 반점(macules), 구진(papules), 수포(vesicles), 농포(pustules), 가피의 순으로 빠르게 진행되며 동시에 여러 모양의 발진이 관찰됨 • 회복기 : 모든 병변에 가피가 형성되며 회복됨 • 합병증 : 발진부위의 2차 세균감염, 폐렴, 뇌염, 라이 증후군 <p>※ 격리기간 : 모든 수포에 딱지가 앉을 때까지</p>

붉은 반점 ▶



물집 (수포성발진) ▶




딱지 ▶



흔적



구 분	내 용
전염성	<ul style="list-style-type: none"> 전염성이 강하므로 수두에 감염된 사람은 다른 사람들과의 접촉을 삼가 합니다. 전염되는 기간은 물집이 잡히기 1-2일 전부터 물집 잡히고 3-7일 뒤 딱지가 생길 때 까지 입니다. 격리기간 : 발진 후 7 ~ 10 일간
치료	<ul style="list-style-type: none"> 수두 환자 치료에는 피부 병소의 세균 감염을 줄이기 위해 목욕을 자주 시키며, 항히스타민제를 경구 투여하거나 칼라민 로션을 도포하는 등 대증요법이 이용됨 합병증이 없는 경우 특별한 치료법을 필요로 하지 않으나 중증으로 발전할 위험이 있는 경우 항바이러스제를 투여
수두에 걸리면?	<ul style="list-style-type: none"> 수두가 의심되면 일단 등교하지 말고 병원진료를 받습니다. 진단을 받은 경우 '등교중지' 하고 담임 선생님께 알립니다. 회복 후 진료확인서나 의사소견서를 제출하면 출석으로 인정됩니다.
예방법	<ul style="list-style-type: none"> 예방접종대상 : 모든 영유아 -과거력 상 수두를 앓은 적이 없거나 예방접종력이 없는 경우 접종을 권장 예방접종시기 : 생후 12~15개월 단체생활 감염병 예방수칙  <p>단체생활 감염병 예방수칙</p> <p>첫째 비누를 사용해 30초 동안 충분히 손을 씻고, 기침이나 재채기를 할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침예절 준수</p> <p>둘째 감염병 의심 환자가 발생한 경우 즉시 보건교사(담임교사)에게 알리고, 환자는 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관 방문</p> <p>셋째 감염병 집단유행을 막기 위해 감염 환자는 격리기간* 동안에 등교를 하지 않고, 격리치료 중에는 다른 사람에게 전파되지 않도록 각별히 주의</p> <p><small>격리기간 수두 모든 수포에 딱지가 앉을 때까지 격리 유행성이하선염 이하선염 증상 발현 후 5일까지 격리 백일해 적절한 항생제 치료 시작 후 5일 홍역 발진 발생 후 4일까지 격리</small></p>

2017. 04. 11.

부 귀 중 학 교 장

