



## 겨울철 수두 감염병 예방 안내

제 2022-229호

♣ 교무실 251-5811 ♣ 행정실 251-5809 ♣ FAX 251-5813  <http://www.cjsb.es.kr>

학부모님, 안녕하십니까?

겨울철 수두는 매년 11월~1월까지 유행되고 있습니다. 수두는 전염력이 매우 강하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제 2조에 근거하여 **등교중지** 합니다.

수두 감염예방 및 확산 방지를 위해서는 예방접종, 기침 예절, 올바른 손씻기 등 개인위생을 준수해야 합니다. 가정에서 자녀들을 잘 살펴보고, 수두가 의심되면 등교하지 말고 **가까운 의료기관을 방문하여 진료**를 받으시기 바랍니다.

구분	내용				
병원체	수두 대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)				
전파경로	수포성 병변에 직접접촉, 호흡기분비물의 공기전파를 통해 감염				
증상	잠복기	10~21일(평균 14~16일)			
	초기증상	발진 발생 1~2일 전 권태감과 미열 발생 후 발진 (단, 소아의 경우 발진이 첫 번째 증상으로 나타나기도 함)			
	임상경과	보통 머리에서 처음 나타나 몸통, 사지로 퍼져나가는데 그 과정에서 반점, 구진, 수포, 농포와 같은 다른 형태로 진행되고, 회복기에 이르면 모든 병변에 가피가 형성			
		붉은 반점 ▶	물집(수포) ▶	딱지 ▶	흔적
					
유행양상	<ul style="list-style-type: none"><li>연중 4~6월, 11~1월에 많이 발생</li><li>수두는 피부병변과의 접촉 또는 말하거나 재채기할 때 나오는 호흡기 분비물을 통해 감염되므로, 집단생활을 하는 학교 등에서 발생 증가가 우려</li></ul>				
환자관리	<ul style="list-style-type: none"><li>전파방지를 위해 모든 병변이 가피(딱지)로 앓을 때까지 격리가 필요함.</li><li>❁ 완치 후 등교 시 <b>병명, 격리기간이 표기된 의사진단서 또는 진료 확인서를 제출하면 결석으로 처리하지 않습니다.</b></li></ul>				
예방	<ul style="list-style-type: none"><li>❁ 첫째, 기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침예절을 지키고, 비누를 사용하여 30초 이상 손을 자주 씻어 주세요.</li><li>❁ 둘째, 감염병 의심증상이 발생한 경우 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에 방문하여 진료를 받으세요.</li><li>❁ 셋째, 집단유행을 막기 위해 감염 환자는 전염기간 동안에는 등원·등교를 하지 않도록 하세요.</li></ul>				

2022년 12월 20일

전 주 송 복 초 등 학 교 장