

코로나19 감염 예방 관리 안내

[제2-1판] 주요 개정 사항

1. 임상증상

- 주요 증상은 발열, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실, 폐렴
- 그 외 피로, 식욕감소, 가래, 소화기증상(오심, 구토, 설사) 혼돈, 어지럼증, 콧물이나 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부증상 등 다양하게 나타남

2. 등교수업일 조정

- 단독으로 판단하지 않고, 교육부-교육청-학교-방역당국과 협의하여 결정

3. 감염예방을 위한 관리 철저

- 하교 후 노래방, PC방, 학원 등 다중이용시설 방문 및 소모임금지, 자제 등에 대해 학생교육

4. 학교구성원 건강관리 강화

- 장애 등으로 상시 마스크 착용이 어려운 학생은 장애 특성을 고려하여 마스크 착용을 교육하고, 발열체크 및 건강상태 확인 더욱 자주 실시
- 기저질환자의 경우 코로나19 임상 증상이 있는 학생이 등교수업을 희망하는 경우 해당 증상이 코로나19와 연관성이 없고 타인에게 전파되는 감염병이 아니라는 것을 의사의 소견 등으로 확인 후 등교
- 코로나19 임상증상이 있는 학생은 가정에서의 건강관리 상황을 기록할 수 있는 기록지 제공하고 작성하도록 하여 가정내 관리를 강화. -출결처리 증빙 활용 가능
- **가정에서 코로나 19 임상증상 발견 시 선별진료소 방문 전 콜센터 또는 관할보건소 (덕진선별진료소: 250-3901)에 문의**
- 선별진료소 이동방법
학교에서 보호자 인계 또는 119 신고하여 구급대 지원받아 이송

5. 교실위생관리

- 환기가 가능한 교실은 창문을 닫고 에어컨을 사용하되, 쉬는 시간마다 환기 실시
- 유치원은 최소 1시간마다 1~2회 환기 실시
- 에어컨 바람이 몸에 직접 닿지 않게 하고, 바람 세기를 낮춰서 사용
- 일시적 관찰실에 의심 학생이 재실하여 있는 경우에는 복도 쪽 창문은 닫고, 실외쪽 창문은 모두 개방
- 가능한 모든 출입문 및 창문 개방(자연환기양 증가)

6. 감염의심자

- 선별진료소에서 코로나19 검사를 받지 않은 경우 집에서 충분히 휴식을 취하면서 경과를 관찰 후 호전되면 등교
- 3~4일 관찰하여 증상이 호전되지 않거나 악화되면 콜센터, 보건소 문의 후 안내에 따라 조치

□ 학생용 마스크 착용 기본수칙

◇ 학교 일과시간 중에는 마스크를 쓰세요

- 교실, 복도 등 실내공간에서 다른 사람과 함께 있을 때 마스크를 쓰세요
- 마스크는 보건용, 수술용, 비말차단용(신설 예정), 면마스크 모두 가능해요
- 기저질환이 있는 학생은 의사 선생님과 마스크를 쓰는 것에 대해 상담하고 상담내용에 맞게 써주세요

◇ 이럴 때는 마스크를 쓰지 않아도 괜찮아요

- 머리가 아프거나 숨이 차면 마스크를 즉시 벗고, 괜찮아질 때까지 벗고 있어요 이럴 땐 사람과 2m(최소 1m) 이상 떨어지고 이야기를 가능한 하지 마세요
- 운동장, 교정 등 실외에서 다른 사람과 2m(최소 1m) 이상 떨어져 있다면 마스크를 쓰지 않아도 괜찮아요 이럴 땐 이야기를 가능한 하지 마세요

◇ 마스크를 쓰고 있을 때 지켜주세요

- 얼굴 크기에 맞는 적당한 마스크를 골라서 코와 입이 보이지 않도록 얼굴에 잘 맞게 쓰세요
- 마스크를 쓰고 있을 때는 마스크를 만지지 않아요. 만졌다면 30초 이상 흐르는 물과 비누로 손을 씻거나, 손 소독제로 손을 씻듯이 문지르세요
- 마스크를 서로 바꿔쓰거나, 쓰던 마스크를 다른 사람에게 빌려주면 안돼요

◇ 마스크를 쓰기 전이나 벗을 때 지켜주세요

- 마스크가 더러워지지 않도록 마스크를 만지기 전에 30초 이상 흐르는 물과 비누로 손을 씻거나, 손 소독제로 손을 씻듯이 문지르세요
- 마스크를 벗을 때는 앞면에 손을 대지 않고, 끈만 잡고 벗으세요
- 마스크를 버릴 때는 아무 곳이나 두지 말고 즉시 쓰레기통에 버리고, 30초 이상 흐르는 물과 비누로 손을 씻거나, 손 소독제로 손을 씻듯이 문지르세요

◇ 마스크를 잃어버리거나, 더러워질 때, 망가질 때 지켜주세요

- 학교에 올 때 마스크를 여유 있게 가지고 오고, 마스크를 잃어버리거나, 더러워지거나 망가졌을 때 새 마스크를 쓰세요.
새 마스크를 쓰기 전까지는 친구들과 가능한 이야기를 하지 마세요