

소아청소년 코로나19 백신 개별접종 추가사항 안내

학부모님! 안녕하십니까?

최근 지역사회 확진자 수 증가에 따라 소아청소년 감염율이 높아지고, 오미크론 등 전파력이 높은 변이 바이러스 출현으로 감염 위험이 더욱 증가하고 있어, 질병관리청에서는 소아청소년의 접종 편의성을 높이하고자 '21년 12월 10일부터 아래와 같이 사전예약과 당일접종을 시행하오니 안내사항을 참고하시기 바랍니다.

<코로나19 백신 개별접종 추가사항 안내>

■ 접종대상	주민등록상 04. 1. 1.~ 09. 12. 31. 출생자
■ 시작일	2021년 12월 10일부터
■ 접종 2일 전 사전예약	청소년 코로나19 백신 접종 사전예약 시, 사전예약일 2일 후부터 접종일 지정 가능
■ 자유로운 당일접종	사전예약 없이 접종기관에 방문하여 당일에 접종가능 ※ 단, 당일병원 방문하기 전에 백신접종 가능한지 확인 후 당일방문 필요.
※ 2022.2.1.부터 적용되는 청소년 방역패스에 대비하기 위해서는 2021.12.27.(월)까지 1차 접종을 완료하여야 함	

- **방법** : 개인의 희망 여부 및 보호자(법정대리인)의 자발적 동의 기반 → 「코로나19 예방접종 사전시스템(누리집) <https://ncvr2.kdca.go.kr>」 접속 또는 콜센터(1339, 063-120) 전화예약 후 개별적으로 접종기관 방문하여 접종

■ **확인사항**

- 접종 시에는 보호자(법정대리인)가 동행하여야 하며, 보호자(법정대리인)가 동행하지 못하는 경우 보호자(법정대리인)가 작성한 ①접종 시행 동의서와 ②예진표를 접종대상자(학생)가 의료기관에 제출하여야 함 (관련서류 2종은 학교 홈페이지 게시됨)
- 접종 시 신분증을 개인별로 지참:

■ **백신종류 및 접종장소** : 화이자 백신(3주 간격 2회 접종) / 위탁의료기관

■ **유의사항**

- 가능한 학부모 동반하여 접종합니다.
- 예방접종 전·후 주의사항, 이상반응 등 반드시 사전숙지
- 접종 후 3일 간 건강상태를 유의 깊게 관찰하고, 최소 일주일간 격렬한 운동 및 활동을 피합니다.

단 ! 다음과 같은 경우 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다!

- ▶ 코로나19 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스*와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우
- ▶ 1차 코로나19 예방접종 후 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우, 첫 번째 백신과 동일 플랫폼의 백신으로 접종 금기
 - * 아나필락시스: 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 몸 전체의 발진, 빠른 심장 박동, 현기증, 쇼크 등의 증상을 동반한 심각한 알레르기 반응
- ★ 약(장 세척제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 등에 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 기록해 주세요

▶ 뒷면에 이어집니다.

★ 코로나19 예방접종 전·후 주의사항

접종 전

- ▶ 건강상태가 좋을 때, 접종하기
- ▶ 접종 전 반드시 의사의 예진 받기
- ▶ 다음과 같은 경우 예방접종 연기하기
 - 코로나19 감염이 의심되는 경우
 - 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자
 - 발열(37.5℃ 이상) 등 급성병증이 있는 경우
 - 1차 mRNA 코로나19 백신(화이자) 접종 후 심근염/심낭염 발생이 확인된 경우



접종 후

- ▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머무르며 이상반응 발생여부 관찰하기
- ▶ 귀가 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰하고 일주일 정도는 고강도의 운동 및 활동 자제하기
- ▶ 접종부위 청결하게 유지하기
- ▶ 평소와 다른 신체 증상이 나타나는 경우 의사의 진료 받기

★ 코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나면 어떻게 해야 하나요?

- ▶ 접종부위 부기, 통증이 있는 경우 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질하기
- ▶ 미열이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하기
- ▶ 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우 해열진통제를 복용하기
 - * 예방접종 전 아세트아미노펜 성분의 해열진통제 준비, 예방접종 후 몸살 증상이 나타날 경우 해열진통제 복용
- ▶ 다음과 같은 경우에는 의사의 진료를 받으세요.
 - 가슴통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨 가쁨, 호흡 시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
 - 접종부위의 통증, 부기, 발적이나 발열 등이 접종 후 2일이 지나도 호전되지 않거나 악화되는 경우
 - 접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타나는 경우
- ▶ 다음과 같은 경우에는 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하세요.
 - 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우, 입술·얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우

이상반응 발생이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의하시기 바라며, 예방접종도우미 누리집 (<https://nip.kdca.go.kr>) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

<참고 자료: 접종증명·음성확인제 적용 등 시설 >

※ 방역패스 적용 예외 연령은 2022.2.1.(화) 0시부터 기존 18세 이하에서 0~11세 이하로 조정

※ 방역패스 적용 대상 확대(18세 이하인 자 → 0~11세 이하인 자) 조치는 2022.2.1.(화) 0시부터 적용

접종증명·음성확인제 의무적용 시설(16종)

- ▲ 유흥시설 등(유흥주점, 단란주점, 클럽(나이트), 헌팅포차, 감성주점, 콜라텍·무도장)
- ▲ 노래(코인)연습장 ▲ 실내체육시설 ▲ 목욕장업 ▲ 경륜·경정·경마/카지노(내국인)
- ▲ 식당·카페 ▲ 학원 등 ▲ 영화관·공연장 ▲ 독서실·스터디카페 ▲ 멀티방 ▲ PC방
- ▲ 스포츠경기(관람)장(실내) ▲ 박물관·미술관·과학관 ▲ 파티룸 ▲ 도서관 ▲ 마사지업소·안마소

접종증명·음성확인제 미적용 시설(14종)

- ▲ 결혼식장 ▲ 장례식장 ▲ 유원시설(놀이공원·워터파크) ▲ 오락실 ▲ 상점·마트·백화점(각 300㎡ 이상)
- ▲ 스포츠경기(관람)장(실외) ▲ 실외체육시설 ▲ 숙박시설 ▲ 키즈카페 ▲ 돌잔치
- ▲ 전시회·박람회 ▲ 이·미용업 ▲ 국제회의·학술행사 ▲ 방문판매 등을 위한 직접판매홍보관

2021년 12월 22일

전 북 과 학 고 등 학 교 장