



새로운 생각, 따뜻한 마음, 함께하는 금빛교육

## 2022-2023절기 어린이 인플루엔자 국가예방접종 안내



(우 54072) 전라북도 군산시 공포3로 48(조촌동) 교무실 : 063-453-9009 행정실 : 063-454-8083 (fax : 063-454-8084)

학부모님 안녕하세요?

사회적 거리두기가 완화되고, 인플루엔자가 유행하지 않은 지난 2년 기간 동안 자연면역 감소로 인해 질병관리청에는 2022.9.16.(금)일 전국에 인플루엔자 확산에 대한 유행주의보를 발령하였습니다.

다음 안내 사항을 살펴보시고, 건강한 학교생활을 위하여 많은 관심 부탁드립니다.

### ▶ 지원 대상: 생후 6개월~만13세 어린이 (2009.1.1. ~ 2022.8.31.출생)

- 생후6개월~만9세 미만 소아중 이전 접종이력이 총1회 이하인 경우(2회 접종지원)

### ▶ 지원 기간: 1회 접종대상자 2022.10.5.(수) ~ 2023. 4.30.(일)

2회 접종대상자 2022. 9.21.(수) ~ 2023. 4.30.(일)

### ▶ 접종 기관: 주소지와 관계없이 가까운 보건소 또는 지정의료기관

- 예방접종도우미 누리집 <https://nip.kdca.go.kr> > 지정의료기관 찾기 > 인플루엔자 국가예방접종 지원사업

### ▶ 접종 시행 및 관리

- 어린이 예방접종은 보호자 동행이 원칙입니다. 부득이하게 보호자(부모, 법정대리인 등) 동행이 어려운 접종 대상자는 사전에 보호자가 작성한 예방접종 시행 동의서 및 예진표를 소지하고 병원을 방문하여 접종하여야 합니다.

- 접종은 교육 활동에 지장이 없는 범위(하교 후, 주말 등)에서 시행하도록하며, 접종으로 인한 결석(지각, 조퇴 등)은 출석으로 인정되지 않습니다.

- 보호자동의서 및 예방접종 예진표 : 학교홈페이지 [보건소식]에서 다운 가능

- 인플루엔자 예방접종 후 가장 흔한 이상반응은 백신을 접종받은 사람의 15~20%에서 나타나는 접종 부위 발적과 통증이 있으나, 대부분 1~2일 이내에 사라집니다.

<이상반응이 생겼을 때> 예방접종도우미 누리집 → 안전한 예방접종 → 이상반응 신고하기

### ▶ 생활 속 인플루엔자 예방수칙

- 인플루엔자 유행 전 예방접종 받으세요.
- 손을 자주 씻고 손으로 눈·코·입을 만지지 않는 등 개인위생수칙을 잘 지켜주세요.
- 기침이나 재채기를 할 때는 휴지, 옷깃 등으로 입을 가리는 기침예절을 지켜주세요.
- 발열과 호흡기 증상(기침, 콧물 등)이 있는 경우 마스크를 착용해 주세요.
- 인플루엔자가 유행할 때에는 사람들이 많이 모이는 장소의 방문을 피해주세요.
- 인플루엔자 의심 증상이 있을 경우 즉시 의사의 진료를 받으세요.



바로가기 QR코드 스캔

<https://nip.kdca.go.kr/>

스캔하기

## <예방접종 전·후 주의사항>

- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- ✓ 건강상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다.
- ✓ 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ✓ 접종 후 15~30분간 접종 기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

## 예방접종을 위해 의료기관 방문 시 행동수칙



보호자와  
대상자 모두  
마스크 착용



손소독 등  
개인위생 수칙  
준수



대상자, 보호자는  
코로나19 증상이 있을 시  
내원 전 알리기



접종 후 의료기관에서  
20~30분 머무르며  
이상반응 관찰 후 귀가

## <이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다.>

- ✓ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우  
인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람은 예방접종 시 주의가 필요
- ✓ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

## <인플루엔자 예방접종 후 이상반응>

- ✓ 예방접종 후 발생 가능한 이상반응
  - 국소 이상반응: 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증 - 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등
- ✓ 예방접종 후 이상반응이 생기면
  - 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며 2~3일 이내 호전됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.  
『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있으니 보건소로 문의하시기 바랍니다.

**2022. 9. 28.**  
**군 산 금 빛 초 등 학 교 장**