

	2024학년도 호흡기 감염병 예방 안내문	가 정 통 신 문
		2024. 8. 22.(목)
		발행부서 : 교무실
전북 익산시 함열읍 와리 3길 19-3 / http://www.hamyol.hs.kr / 861-0887(교무실) 861-0888(행정실)		

학부모님 가정에 행복과 건강이 함께하시기를 기원합니다. 최근 코로나19 환자가 지속적으로 증가하고 학령기 청소년을 중심으로 백일해, 마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행이 지속되고 있습니다. 개학 후 안전하고 건강한 학교생활을 위해 호흡기 감염병 예방수칙을 안내하오니 자녀의 건강관리에 참고하시고 호흡기 증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 및 검사가 이루어질 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

코로나19 감염증 (4급 감염병)	<ul style="list-style-type: none"> * 주요증상 : 발열, 기침, 인후통, 코막힘 또는 콧물 등 * 등교중지(출석인정) 기준 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> • 확진자 ⇒ 원칙적으로 격리기간이 명시된 의사소견서의 격리기간에 따름 단, 의사소견서에 격리기간이 명시되어 있지 않은 경우, 코로나19 주요증상이 호전된 후 24시간 경과시까지 확진자 격리 권고 </div> <div style="width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> • 유증상자 ⇒ 등교중지가 필요한 감염병이 의심되는 경우 확진 여부를 확인할 때까지 등교중지 실시 ⇒ 진료 결과 감염병이 아니었다 하더라도 결과 확인까지의 기간은 출석으로 인정 </div> </div>
백일해 (2급 감염병)	<ul style="list-style-type: none"> * 청소년에서의 백일해 증상은 가벼운 기침으로 시작될 수 있으므로, 기침이 지속되는 경우 가까운 의료기관을 방문하여 진료를 받으시기 바랍니다. * 등교중지(출석인정) 기준 • 확진자 ⇒ 적절한 항생제 투여시작 후 5일까지 • 밀접접촉자로 통보받은 경우 모니터링 기간(마지막 접촉일 이후 21일째까지) 동안 기침 등 증상이 나타나면, 마스크를 착용하고 병의원에 방문하여 백일해 노출자(백일해 환자 접촉자)임을 알리고 검사를 받습니다.
마이코플라스마 폐렴균 감염증 (4급 감염병)	<ul style="list-style-type: none"> * 주요증상 : 감염초기 발열, 두통, 인후통이 나타나고 이어서 기침이 2주 이상 지속 * 등교중지(출석인정) 기준 ⇒ 격리기간이 명시된 의사소견서의 격리기간에 따름
인플루엔자 (4급 감염병)	<ul style="list-style-type: none"> * 주요증상 : 고열(38~41℃), 기침, 인후통, 두통, 근육통, 피로감, 쇠약감, 식욕부진 등 * 등교중지(출석인정) 기준 ⇒ “해열제 없이” 정상체온 회복 후 24시간이 경과시까지 (단, 해열제를 투약한 경우, 마지막 해열제 투약 시점부터 48시간이 경과해야 함)
등교중지 시 출결 관리	<ul style="list-style-type: none"> * 감염병 확진 시 담임선생님께 진단 사실을 알리고 등교중지(출석인정) * 등교중지 기간에는 학원이나 다중이용시설을 출입하지 않기 * 검사, 치료, 완치 후 검사결과, 진단서, 의사소견서, 진료확인서 등 증빙자료를 담임선생님께 제출하면 격리기간 동안 출석으로 인정 ★ 증빙자료에 진단명, 격리기간이 반드시 명시되어야 출석인정됨

2024.7.26.

질병관리청

호흡기감염병 예방을 위한

5대 예방수칙



첫째, 기침예절 실천

- ▶ 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- ▶ 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- ▶ 기침한 후에는 비누로 손씻기
- ▶ 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기



둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- ▶ 흐르는 물에 비누로 30초 이상
 - ▶ 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- ※ 비누로 손 씻으면, 호흡기 감염병 5명 중 1명이 예방 가능



셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- ▶ 2시간 마다, 10분씩 환기
- ▶ 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기



다섯째, 발열 및 호흡기 증상시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기