

학교생활목표
참되고(眞)
착하고(善)
아름답게(美)



함열여중소식

<http://www.hamyol60.ms.kr>

전화번호:

교무실 063)861-0612

행정실 063)861-0611

학부모님 안녕하십니까?

질병관리청 발표에 따르면 최근 '마이코플라스마 폐렴균 감염증' 및 '백일해'가 크게 유행하고 있으며, **마이코플라스마 폐렴 유행주의보**가 발령(24.6.24~, 2주 연속 250명 이상 발생)되었습니다.

의심 증상이 있는 경우 가까운 의료기관에서 진료를 받으시고, 학교 내 감염병 확산방지를 위해 **호흡기 감염병 예방 수칙준수**를 부탁드립니다.

마이코프라스마 폐렴균 감염병 및 백일해 예방 안내

1. 마이코프라스마 폐렴균 감염병

가. 정의 : 마이코프라스마 폐렴균에 감염되어 발생하는 질환

나. 감염경로 : 비말전파 증상이 발생한 후 20일까지 전파 가능

다. 잠복기 : 2~3주

라. 주요증상 : 발열, 기침, 인후통, 두통, 폐렴의 가장 흔한 원인 인후염과 같은 상기도 감염증, 기관지염 등을 유발하며 일부의 경우 **중증의 비정형 폐렴으로 발전**

- 감염 초기 발열, 두통, 인후통이 나타나고 이어 기침이 2주 이상 지속

- 보통 증상이 3~4주간 지속되다가 회복

마. 예방 : 올바른 손씻기, 기침예절 등 방역수칙 준수

2. 백일해

가. 정의 : 백일해균(Bordetella pertussis) 감염에 의한 호흡기 질환

나. 감염경로 : 환자 또는 보균자의 비말 감염에 의해 전파, **전염성이 강함**

다. 잠복기 : 4~21일

라. 주요증상 : 발작성 기침이 특징적으로 숨을 들이 쉴 때 높은 소리의 흠(whoop) 소리가 나며 구토를 동반하기도 함

마. 예 방 : 예방접종

귀댁의 자녀가 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)을 예방접종

3. 마이코프라스마 폐렴균 감염병 및 백일해에 걸렸거나 의심이 될 경우

- **의심증상**이 있는 경우 의료기관이나 보건소에 내원하여 진료 및 검사

- 진단받은 경우 담임선생님과 보건선생님에게 알림

- 백일해 법정감염병 2급, 마이코플라스마 폐렴균감염증 법정전염병 4급으로 **진단 시 등교 중지**, 관련내용 **의사소견서 제출 시 출석인정**

- 손 씻기를 자주하고 기침이나 재채기 할 때에는 마스크 착용과 기침 예절 실천

- 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 소독제, 소독티슈로 소독하여 사용



흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기



기침이나 재채기 할 때는 입과 코를 가리기




씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



호흡기 증상 시 진료 및 휴식하기



증상이 있는 동안 사람 많은 곳 피하기



환자와 수건, 물컵 등 구분하여 사용하기

2024.4.29. 질병관리청

백일해 예방법은?

- 올바른 손씻기의 생활화**
흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- 기침예절 실천**
휴지나 옷소매로 입과 코를 가리기
- 실내에서는 자주 환기하기**
하루 최소 3회, 매회 10분 이상
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기**
- 기침 증상이 있는 경우 마스크 착용하고 의료기관 방문하여 진료받기**

6/7

2024.4.29. 질병관리청

백일해 감염되면 어떻게 해야 하나요?

- 백일해에 걸리면 학교, 어린이집 등 **전파 차단**을 위해 전염기간 동안 **등교, 등원*을 중지하고 집에서 격리**합니다.
 - **등교, 등원 중지기간:**
 - (적정 항생제 복용 시) 투여 후 5일까지 격리
 - (치료받지 않는 경우) 기침 멈출 때까지 최소 3주 이상 격리
- 백일해 환자와 접촉한 사람은 의료기관을 방문하여 상담 후 **예방적 항생제 치료**를 고려할 수 있습니다.

4/7

2024.4.29. 질병관리청

백일해 감염되면 어떻게 해야 하나요?

- 백일해에 걸리면 학교, 어린이집 등 **전파 차단**을 위해 전염기간 동안 **등교, 등원*을 중지하고 집에서 격리**합니다.
 - **등교, 등원 중지기간:**
 - (적정 항생제 복용 시) 투여 후 5일까지 격리
 - (치료받지 않는 경우) 기침 멈출 때까지 최소 3주 이상 격리
- 백일해 환자와 접촉한 사람은 의료기관을 방문하여 상담 후 **예방적 항생제 치료**를 고려할 수 있습니다.

4/7

2024.4.29. 질병관리청

백일해 예방법은?

예방접종
접종일정에 맞춘 예방접종이 가장 중요합니다!

기초접종	3차 DTaP 생후 2개월	2차 DTaP 생후 4개월	1차 DTaP 생후 6개월
추가접종	4차 DTaP 생후 15-18개월	5차 DTaP 4-6세	6차 Tdap 11-12세

5/7

2024년 7월 3일

함열여자중학교장 (직인생략)