



<http://hanbyeo.hs.kr>

『자생적 활력이 넘치는 한별고』

가정통신문

- 발송번호 2023-028
- 발송일 2023.04.18
- 전화 063)291-2022
- 발송처 한별고등학교

제 목

эм폭스 주의 발령 및 예방수칙

학부모님 가정에 건강과 평안을 기원합니다.

질병관리청은 최근 국내 엠폭스(원숭이두창) 환자가 증가함에 따라 4월 13일부터 위기경보 수준을 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 격상하였습니다.

엠폭스(원숭이두창) 바이러스는 확진자와 밀접접촉(피부접촉, 성접촉 등)으로 전파되는 질병 특성상 대규모 발생 가능성이 낮고, 대부분이 자연 회복되며, 치료 및 진단 등의 충분한 대응 수단을 확보하고 있어 공중보건체계에 미치는 영향력은 제한적일 것으로 평가하고 있습니다.

하지만 처음 확진자는 모두 해외 감염이었으나, 2023.4.7. 이후 해외여행력 없는 지역사회 확진자가 5명 추가 발생하여 엠폭스(원숭이두창) 감염병 예방을 안내해 드리니, 참고하시어 감염병에 주의하시기 바랍니다.

1. 엠폭스(원숭이두창) 질병 개요

| 구 분 | 내 용 |
|-------------|--|
| 정의 | 원숭이두창 바이러스(Monkeypox virus) 감염에 의한 급성 발열, 발진성 질환 |
| 감염경로 | <ul style="list-style-type: none">원숭이두창 바이러스에 감염된 동물(쥐, 다람쥐, 브레리도그와 같은 설치류 및 원숭이 등), 감염된 사람 또는 바이러스에 오염된 물질과 접촉할 경우 감염될 수 있습니다.(피부병변 부산물) 감염된 동물·사람의 혈액, 체액, 피부, 점막병변(발진, 짹지)에 직·간접 접촉(매개물) 감염된 사람·동물이 사용한 물건, 천(의류, 침구 또는 수건) 및 표면에 접촉(비말) 호흡기 분비물(코, 구강, 인두, 점막, 폐포에 있는 감염비말)에 접촉(기타) 태반을 통해 감염된 모체에서 태아로 수직감염 |
| 잠복기 | <ul style="list-style-type: none">5~21일(평균 6~13일) |
| 주요증상 및 임상경과 | <ul style="list-style-type: none"><u>발열, 오한, 림프절 부종, 피로, 근육통 및 요통, 두통, 호흡기 증상(인후통, 코막힘, 기침 등)</u> 등과 같은 증상이 나타나며, 보통 1~4일 후에 발진 증상이 나타남<ul style="list-style-type: none">* '22년 5월 이후 비풍토병 국가에서 유행 중인 사례는 발진 전 전구기(발열 등)가 없거나 발진 후에 전구기가 나타나기도 함. 특정부위(항문생식기)에 발진 수가 5개 미만으로 나타나기도 하고 항문궤양, 구강 점막 궤양, 항문직장 통증, 앙구 통증, 이금후증 등을 동반하는 사례가 다수 보고되고 있음<u>발진은 얼굴, 입, 손, 발, 가슴, 항문생식기 근처 등에서 나타남</u><ul style="list-style-type: none">- 발진은 대체로 반점부터 시작하여 여러 단계로(반점→구진→수포(물집)→脓포(고름)→가피(딱지))로 진행되며 초기에는 뾰루지나 물집처럼 보일 수 있으며, 통증과 가려움증 동반하기도 함* 임상증상이 비슷한 수두, 홍역, 움, 매독 등과 감별 진단 중요함<u>'22년 이후 유럽과 북미를 중심으로 발생 중인 서아프리카 계통 엠폭스는 대부분 2~4주 후 자연 치유되며, 치명률은 1% 미만으로 보고됨</u><ul style="list-style-type: none">* 면역저하자, 8세 미만 소아, 습진 병력, 임신 및 모유 수유자에서 중증도가 높을 수 있음* 풍토병 국가를 중심으로 발생하는 중앙아프리카 계통 엠폭스의 치사율은 약 10%로 보고됨<u>전구기(3~5일 간): 전염력이 강한 시기</u> |
| 진 단 | <ul style="list-style-type: none">검체(피부병변액, 피부병변조직, 가피, 구인두도말, 혈액 등)에서 특이 유전자 검출 |
| 치 료 | <ul style="list-style-type: none"><u>대부분 자연치료 또는 대증치료</u>필요시, 국가 비축 항바이러스제(테코비리마트) 치료 시행 |
| 환자 관리 | <ul style="list-style-type: none">표준주의, 접촉주의, 비말주의 준수환자: <u>감염력이 소실될 때까지(피부병변의 가피가 탈락되고 새로운 피부형성) 1인실 격리 입원·치료</u>의사환자: 1인실 격리병상 배정 후 검체 채취(검사결과 시까지 격리유지) |

| | |
|----|--|
| 예방 | <ul style="list-style-type: none"> • 예방접종 <ul style="list-style-type: none"> - 3세대 두창 백신은 효과성이 입증되어 FDA(미국)과 EMA(유럽)에서 두창과 엠폴스 백신으로 3세대 백신을 승인한 바 있음 • 예방을 위한 주의사항 <ol style="list-style-type: none"> ① 감염된(감염의 위험이 있는) 사람 또는 동물과의 직·간접적 접촉 피하기 ② 감염된 환자가 사용한 물품(린넨과 같은 침구류 등)과의 접촉 피하기 ③ 의심되는 사람, 동물 또는 물건과 접촉을 한 경우, 비누와 물로 손을 씻거나 알코올 성분의 손 소독제를 이용하여 깨끗이 하기 ④ 엠폴스 발생국(장소)을 여행하는 경우, 바이러스를 보유할 수 있는 동물과의 접촉 피하기 |
|----|--|

2023. 2. 22.



엠폴스 예방 및 행동수칙

대국민용



엠폴스 예방수칙

✓ 손 씻기 등 개인적인 위생 수칙 준수

* 의심증상자 접촉 후 비누와 물 사용 손씻기 또는 알코올 성분 손 소독제 사용

✓ 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가

✓ 엠폴스 의심증상자 피부병변(발진이나 띠지 등) 접촉 삼가

✓ 엠폴스 의심증상자 사용 물품(침구류, 수건, 의복, 세면대 등) 접촉 삼가

✓ 엠폴스 의심증상자와 부득이한 접촉 시 적절한 개인보호구 착용

✓ 아프거나 죽은 동물과의 직접 접촉 및 사용 물품 주의

✓ 아프리카 수입 야생동물 및 반려동물 접촉 주의



엠폴스 의심증상(발진 등) 발생 시 행동요령

✓ 실거주지 관할 보건소로 즉시 신고하여 방역 당국의 조치사항 안내에 따름

✓ 엠폴스 진단 전까지 동거인을 비롯한 주위사람들과의 접촉 삼가

* 침구, 식기, 컵 등 물품을 별도로 사용하고 가능하면 생활공간을 분리

✓ 철저한 손위생 및 가족, 동거인 등 보호하기 위해 개인보호구 사용

* 피부병변을 긴 소매 및 바지 등으로 감싸 노출 최소화, 마스크 착용, 일회용 장갑 등

✓ 의심증상자의 쓰레기 및 침구는 별도로 분리하여 관리

* 확진되면 쓰레기는 폐기물로 별도 분리 배출하고 침구도 별도 세탁 시행

✓ 애완동물을 포함한 기타 동물과의 접촉 삼가

2023. 4. 18.

한 별 고 등 학 교 장

