



감염병(수두) 발생 안내 드립니다.

학부모님 안녕하십니까?

학교에서 수두 확진자가 발생하였습니다. 수두의 조기 발견과 지역사회 확산 차단으로 우리의 자녀들이 건강한 학교생활을 보낼 수 있도록 관심을 당부드리며 감염병 예방을 위한 수칙을 안내드립니다.

구 분	내 용 <수두>
병원체	수두 대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)
전파경로	수포성 병변에 직접접촉, 비말 등 호흡기 분비물의 공기전파를 통해 감염
증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> 잠복기는 10~21일이며, 발진 발생 1~2일 전 권태감과 미열이 나타난 뒤 발진이 발생 수두는 일반적으로 증상이 가볍고 자가 치유되는 질환이나 간혹 합병증(2차 피부감염, 폐렴, 신경계 질환)을 동반 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  가벼운 몸살 (미열, 권태감) </div> <div style="text-align: center;">  온몸의 수포성 발진 </div> <div style="text-align: center;">  발진부위 가려움증 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>♣ 수두 발진의 특징</p>  머리에서 시작 몸통, 사지로 번짐 </div> <div style="text-align: center;"> <p>작은 빨간 반 수포(물집) 농포(고름이 찬) 가피(딱지) ▶ 회</p>  </div> </div>
치료	대증요법(피부병소의 세균감염을 줄이기 위한 목욕, 항히스타민제 투여 등)
유행양상	<ul style="list-style-type: none"> 피부병변과 접촉 또는 호흡기 분비물을 통해 감염되므로, 학교 등에서 발생 증가가 우려됨 수두는 연중 4~6월, 11~1월에 많이 발생하며, 4~6세 연령대에서 발생률이 높음
환자관리	전파방지를 위해 환자는 모든 병변이 가피로 앓을 때까지 격리가 필요함(의사소견서)
예방 및 행동수칙	<ol style="list-style-type: none"> 수두 예방을 위해서 개인위생 수칙을 준수 <ul style="list-style-type: none"> 마스크 착용, 손씻기, 기침예절 지키기, 환기(교실 또는 가정내) 등 수두를 앓은 적이 없거나 예방접종을 받지 않은 소아는 예방접종을 받아야 함 의심증상(미열, 두통, 발진, 가려움증 등)이 발생한 경우 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에서 진료를 받으세요.(진단받으면 즉시 담임선생님께 알림) <ul style="list-style-type: none"> 수두는 2급 법정 감염병으로 확진 시 등교중지(출석인정)됩니다. 출석인정증빙: 의사 진단서 또는 진료 확인서

2022. 11. 21.

전 주 한 일 고 등 학 교

