

 http://www.iksan.es.kr	<p style="text-align: center;">가 정 통 신 문</p> <p style="text-align: center;">백일해 예방 안내</p>	<p>스스로 열심히 공부하고 바르게 자라서 나라의 큰 일꾼이 되자</p>
--	--	--

학부모님 안녕하십니까?

최근 백일해 발생이 증가 추세를 보이고 있어 백일해 예방 및 전파 차단 방법을 안내하오니 감염병 예방 및 확산 방지에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

▷ 백일해란?

처음에 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 기침이 차차 심해져서 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타나며 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 ‘웁(Whoop)’소리가 발생합니다. 백일해는 호흡기 분비물 등의 비말 등을 통하여 호흡기로 감염되므로 손 씻기 등 개인위생 수칙을 준수하고, 기침 증상이 있는 사람과의 접촉을 피해야 합니다. 또한 기침 증상이 있으면 의료기관이나 보건소에 방문하실 때 반드시 마스크를 착용하시기 바랍니다.

▷ 예방접종의 중요성

귀댁의 자녀가 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)을 접종받도록 합니다.

디프테리아·파상풍·백일해(이하 DTaP) 표준 접종		
접종 기준	기본접종 3회	생후 2, 4, 6개월
	추가접종 3회	생후 15-18개월, 4-6세, 11-12세
접종 기관	질병관리청 누리집(https://nip.kdca.go.kr/irhp/)참고*	
접종 비용	무료(단, 성인의 경우 유료접종)	

* 질병관리청 예방접종도우미 → 예방접종 관리 → 지정의료기관 찾기 → 어린이 국가예방접종 지원사업

▷ 자녀가 백일해에 걸렸거나 의심될 경우

1. 백일해에 걸렸거나 의심될 경우 의료기관이나 보건소에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다.
※ 진단검사는 비인두 흡인액 등을 채취하여 백일해를 신속히 진단 및 치료하고, 추가 전파를 차단하기 위해 필요합니다.
2. 백일해를 진단받은 경우 담임선생님께 자녀가 백일해에 걸렸음을 알립니다.
3. 백일해 항생제 치료 중인 경우에는 치료 5일 후까지(치료를 받지 않은 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리)는 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 등교를 하지 않고 자택 격리치료 또는 입원치료를 받도록 합니다.
4. 손 씻기를 자주하고 기침이나 재채기 할 때에는 반드시 휴지를 사용하거나 손수건이나 옷으로 가리도록 합니다.
5. 침이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용합니다.

2023. 11. 23.

익 산 초 등 학 교 장