



함께 꿈꾸며
배움이 삶이 되는 교육

이리남교육통신

제 2022-66호

교무실: 063-851-1413
행정실: 063-843-1060

인플루엔자 유행주의보 발령 및 무료 예방 접종 안내

학부모님, 안녕하십니까? 질병관리청에서는 2022년 9월 16일부터 전국에 인플루엔자 유행주의보를 발령하였습니다. 인플루엔자 유행시기에 학교 및 지역사회 확산을 방지하기 위해 관련 정보 및 무료 예방 접종을 안내해 드리오니 독감의 유행 이전에 예방접종을 맞을 수 있도록 가정에서 협조해 주시기 바랍니다.

□ 인플루엔자 질병 개요

정의	<ul style="list-style-type: none"> 인플루엔자 바이러스 감염에 의한 급성 호흡기 질환
전파경로	<ul style="list-style-type: none"> 감염된 환자의 호흡기로부터 비말(droplet)로 전파. (기침, 재채기, 타액이 묻은 물체)
잠복기	<ul style="list-style-type: none"> 1~4일 (2일)
감염 기간	<ul style="list-style-type: none"> 전염력은 증상시작 1일전부터 4~5일간 가장 높아짐. 환자의 나이나 상태에 따라 바이러스 전파 기간에 차이가 날 수 있음.
주요 증상	<ul style="list-style-type: none"> 고열(38~40℃), 기침, 인후통 등 호흡기 증상과 두통, 근육통, 피로감, 식욕부진 등 전신증상을 보임 소아는 오심, 구토, 설사 등이 동반될 수 있음.
진단	<ul style="list-style-type: none"> 검체(인후 및 비인두 도찰물, 인후 및 비인두 흡인물) 채취
치료	<ul style="list-style-type: none"> 항바이러스제 치료 및 대증 요법
합병증	<ul style="list-style-type: none"> 가장 흔한 합병증은 2차호흡기 질환으로 부비동염, 중이염 등 상부 호흡기 감염증이 흔하고 모세기관지염, 기관지염, 폐렴 등 하부호흡기 감염증, 신경계 합병증(뇌염, 척수염, 길랑-바레 증후군), 횡단성 척수염, 심근염, 근육염, 기흉 등이 발생 가능함.
등교중지	<ul style="list-style-type: none"> 인플루엔자로 진단 된 경우 「학교보건법」 제8조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 감염병 환자 및 의사(의심)환자 등에 대하여 등교 등을 중지할 수 있다. 인플루엔자로 인한 등교 중지 기간은 “해열제 없이 정상체온 회복 후 24시간이 경과할 때까지” 완치 후 등교 시 의사소견서 (진단서 또는 진료확인서) 등을 담임선생님께 제출

예 방

■ 예방접종 권장

- 집단생활로 인한 인플루엔자 유행방지를 위해, 어린이 인플루엔자 국가 무료 예방접종 사업을 시행하고 있습니다.

① 접종대상 : 2009.1.1. ~ 2022.8.31. 출생자

② 지원 기간

구분	접종 횟수	접종 기간
생후 6개월~만 9세 미만 어린이 중 인플루엔자 예방접종을 처음 하는 경우	4주 간격으로 2회	22.9.21(수)~23.4.30(일)
만 9세~만 13세 어린이 또는 인플루엔자 예방접종력이 2회 이상 있는 경우	매년 1회	22.10.5(수)~23.4.30(일)

③ 접종 백신 : 4가 인플루엔자 백신

④ 접종 장소 : 지정의료기관 및 보건소 -예방접종도우미 누리집에서 확인 가능

⑤ 예방접종 금기사항

: 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우,
인플루엔자 백신 접종 후 심한 과민 반응 또는 계란에 심한 과민반응(아나필락시스, 쇼크 증상)의 과거력이 있는 경우,
과거 백신접종 후 6주 이내 길랑-바레 증후군이나 다른 신경 이상의 발생력,
현재 발열이 확인된 경우,

※ 강제사항이 아니며 본인과 보호자가 모두 희망하는 경우 접종하시면 됩니다.

※ 모든 예방접종은 부작용이 있을 수 있으므로 의사와 상담 후 접종 하시기를 바랍니다.

■ 인플루엔자 감염 예방 수칙

① 인플루엔자 예방접종 받기: 해당 접종 시기에 맞춰 접종하기

② 발열 및 호흡기 증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기

③ 올바른 손씻기의 생활화

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- 외출 후, 식사 전후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후, 용변 후 등

④ 기침예절 실천

- 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
- 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기
- 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천

⑤ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등 만지지 않기

2022.09.20.

이 리 남 초 등 학 교 장