



송학교육통신

교
훈

알차고 바르게
푸른 꿈 키워가는
어린이가 되자

우)54667 익산시 학곤로 57 교무실 063)855-3606


수두 및 유행성 이하선염 예방 안내

학부모님 안녕하십니까?

전북특별자치도청에서는 신학기 시작과 함께 아동, 청소년의 수두 및 유행성 이하선염(볼거리) 발생이 증가하고 있음을 알려왔습니다. 이에 감염병 확산 방지를 위하여 예방법과 관리 방법 등에 관한 정보를 알려드리니 각 가정에서는 면역력이 약한 아이들이 감염되지 않도록 주의하시길 당부드립니다.

■ 수두는 어떤 질병일까요?

- 수두는 법정 감염병으로 전염력이 높은 질환입니다.
감염 또는 감염 의심될 경우 **등교중지**를 해야 합니다.
- 완치 후 등교 시 격리기간이 표기된 의사소견서 또는 진료확인서를 제출하면 결석으로 처리하지 않습니다.(출석인정결석)

구 분	내 용
병원체	· 수두-대상포진 바이러스(Human alphaherpesvirus 3) · 피부 병변에 전염력이 있는 수두-대상포진 바이러스가 존재
감염경로	· 수두 환자의 수포액과 직접 접촉 (피부 병변이 주요 감염 전파원) · 호흡기 분비물의 공기 전파를 통해 감염
격리기간	모든 피부 병변에 가피(딱지)가 형성될 때까지
전염기간	<ul style="list-style-type: none"> ■ 물질이 잡히기 1~2일 전부터 물질 잡히고 3~7일 뒤, 딱지가 생길 때까지 (격리 기간 : 발진 후 7~10일간) ■ 전염력이 매우 높아 가족 안에서 2차 전파율이 매우 높음
증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 발진 시작 1~2일 전부터 권태감과 미열 ■ 발진은 보통 두피, 얼굴, 또는 몸통으로 ■ 모든 병변에 가피가 형성되면서 회복함  <p style="text-align: right;">[수두 증상]</p>
예방	<ul style="list-style-type: none"> • 개인위생 수칙 준수 : 손 씻기(모든 전염병의 70% 예방), 기침 및 재채기는 입 가리기 • 수두 예방접종 : 수두를 앓은 적이 없거나 예방접종을 받지 않은 소아는 예방 접종하기 • 수두 환자와 접촉하지 않도록 주의

■ 유행성이하선염(볼거리)는 어떤 질병일까요?

구 분	내 용
병원체	유행성이하선염 바이러스(Mumps orthorubulavirus)
감염경로 (전염기간) 및 격리기간	<ul style="list-style-type: none"> 감염된 사람의 재채기, 대화할 때 침 등의 비말이 호흡기로 흡입되면서 감염 증상발현 초기부터 발현 이후 5일까지 타인에게 옮길 가능성 있어 접촉에 주의
잠복기	12~25일(평균 16~18일)
증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> 발열, 편측 혹은 양측 이하선의 종창·동통이 특징 약 20%는 무증상 감염자이며, 일반적으로 30~40%에서 이하선을 침범 이하선 부종은 2~3일 내에 최고에 달하며, 그 후 1주일 정도면 다른 증상과 함께 치유됨 <ul style="list-style-type: none"> 악하선 및 설하선도 약 10%의 환자에서 침범 약 25%의 환자는 한쪽에만 증상이 나타남
치료	보존적 치료: 충분한 수분 공급, 고열·통증에 대한 대증치료
유행양상	예방접종 도입 이후 청소년 및 젊은 성인에서의 발생이 증가하는 경향을 보이다가 최근에는 4~12세 학동기 소아에서 다시 호발하고 있음
예방	<ul style="list-style-type: none"> MMR예방접종 완료하기(1차: 생후 12~15개월, 2차 만4~6세) 비누로 30초 이상 손을 깨끗이 씻기 기침이나 재채기를 할 때는 휴지나 옷 소매 위쪽으로 입과 코를 가리기



[유행성 이하선염 증상]

수두 · 유행성이하선염 3대 예방수칙

- ◇ 첫째, 예방접종은 감염 예방에 가장 효과적인 방법으로, **수두 및 MMR** (홍역·유행성이하선염·풍진) **접종 미완료자는 예방접종 완료하기**
- ◇ 둘째, 자주 손씻기, 기침 예절 지키기, 씻지 않는 손으로 눈·코·입 만지지 않기, 의심증상 시 마스크 착용 등 **개인위생 철저히 준수하기**
- ◇ 셋째, 발열, 발진, 침샘이 부어오르는 등 감염 의심 증상징후가 있다면 진료를 받고 **감염력이 소실되는 시기*에 등교하기**
 - * 수두 : 모든 발진 병변의 가피(딱지) 형성(발진 시작 후 최소 5일) 이후
 - * 유행성이하선염 : 증상 발현 5일 이후

2024. 4. 5.

이 리 송 학 초 등 학 교 장