








안녕하세요.

환절기와 신학기 집단생활이 본격적으로 시작되는 시기에 **감염병 예방 및 확산 방지**를 위해 유치원에서는 유아들의 감염병 예방 관리에 최선을 다하고 있습니다. 특히, **인플루엔자 등 주의해야 할 감염병**에 대해 안내해 드리오니 하단의 자료를 참고하시어 감염병 예방에 협조해주시기 바랍니다.

1 법정 감염병이 의심될 경우

- ① 가정에서 **37.5℃ 이상의 발열 및 감염병이 의심될 경우 등교하지 않고** 담임교사에게 연락 후 병원진료를 받습니다.
- ② 담임교사에게 감염병 발생 여부를 알립니다.
- ③ 집단 발병을 예방하기 위해 감염병 증상 발현 시 일정 기간 등원하지 않습니다.

2 감염병 예방을 위한 생활 수칙

	기침예절 실천하기	① 호흡기 증상 있는 경우 마스크 착용하기 ② 기침할 때 휴지나 옷소매로 입과 코 가리기
	올바른 손씻기 생활화하기	① 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 ② 외출 후, 식사 전·후, 기침 후, 화장실에 다녀온 후 등
	씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기	
	실내에서 자주 환기하기	
	발열 및 호흡기 증상시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기	



3 주요 감염병의 임상증상 및 관리 안내

감염병	임상증상	전파경로 및 감염 가능 기간
코로나19	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침,	<ul style="list-style-type: none"> 5일간 등교중지 권고 - 회복을 위해 충분한 휴식을 취하도록 권고함
인플루엔자 (독감)	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침, 객담	<ul style="list-style-type: none"> 출석인정 등교중지 기간은 의사 소견에 따름 - 해열제 없이 정상체온 회복 후 24시간이 경과할 때까지 감염 가능 기간 : 증상 발생 1일 전부터 5일까지
홍역	발진, 발열, 기침, 콧물, koplik 반점	<ul style="list-style-type: none"> 전파경로 : 호흡기 분비물 등의 비말 또는 직접 접촉 감염 가능 기간 : 피부발진 발생 4일 전부터 발생 후 4일까지
유행성 이하선염 (볼거리)	이하선 부종, 발열, 두통, 근육통	<ul style="list-style-type: none"> 전파경로 : 타액, 비말을 통한 직접 전파, 타액과 비말로 오염된 물건의 접촉 감염 가능 기간 : 이하선염 발현 3일 전부터 5일 후까지
수두	피부 발진, 수포, 발열, 피로감	<ul style="list-style-type: none"> 전파경로 : 직접전파-비말, 타액, 수포액의 직접 접촉 감염 가능 기간 : 발진 1~2일 전부터 모든 피부 병변에 가피가 생길 때까지
수족구병	발열, 손·발바닥·구강 내 수포 및 궤양	<ul style="list-style-type: none"> 전파경로 : 분변 경구 전파, 비말감염, 매개물에 의한 간접전파 감염 가능 기간 : 발병 후 7일간 가장 전염력 강함 피부 병변(수포)에 가피가 형성될 때 까지
유행성 각결막염	충혈, 안통, 이물감, 많은 눈물, 눈곱, 눈부심, 결막하출혈	<ul style="list-style-type: none"> 전염력이 강한 눈병의 경우 유행 가능성 높으므로 주의가 필요함 감염된 경우 수건이나 개인 소지품 등은 개별 사용해야 함 안질환이 의심되는 경우 안과진료 받기 감염 가능 기간 : 발병 후 14일까지

2025. 3. 14.

이 리 유 치 원 장