



이리유치원 교육통신

건강하고
예의바르며
꿈을 키우는 어린이

홈페이지 : <http://www.iriu.co.kr>

교무실 842-2835

행정실 842-2836








백일해 예방수칙 안내문

안녕하십니까?

최근 경남 및 부산을 중심으로 **제2급 감염병인 백일해**가 급격하게 확산되고 있는 상황으로 백일해 유행 상황 대비 및 주의가 필요합니다.

환자의 다수가 단체생활을 하는 어린이로 확인된바, 백일해 발병과 유행 차단을 위해 **백일해 등 호흡기 감염병 예방수칙 카드뉴스**를 안내해 드리오니 하단의 자료를 참고하시어 감염병 확산 방지에 협조해주시기 바랍니다.

◆ 백일해 질병 개요 ◆

구분	내용
정의	백일해균(<i>Bordetella pertussis</i>) 감염에 의한 급성 호흡기 질환
발생현황	<p>제2급 법정감염병</p> <p>☞ 국내에서 DTaP 백신의 도입으로 백신접종률의 증가와 함께 환자 발생이 2001년 이후 연간 20명 내외 수준이었으나, 2012년 230명과 같이 소규모 유행은 지속됨</p> <p>☞ 선진국에서도 2~5년 주기로 백일해 돌발유행이 반복되고 있으며, 백일해가 모든 연령에서 발현되는 양상을 보임</p>
감염경로	환자 또는 보균자의 비말감염 에 의해 전파
전염력	전염력이 강함
잠복기	4~21일
주요증상	<p>카타르기: 콧물, 눈물, 경한 기침 등의 상기도 감염 증상이 1~2주간 나타남 백일해균 증식이 왕성하여 전염성이 제일 높은 시기</p> <p>발작기: 발작성 기침, 기침 후 구토, 무호흡 등</p> <p>회복기: 발작성 기침의 횟수, 정도가 호전됨, 회복은 천천히 진행되고 2~3주 후 기침은 소실되지만 비발작성 기침은 수 주간 지속될 수 있음</p> <div>     </div> <div>    </div>
진단	비인두도말, 비인두흡인물, 가래 검체
치료	항생제 치료
예방	<p>예방접종 (소아)</p> <p>생후 2, 4, 6, 15~18개월, 만 4~6세에 DTaP 백신접종, 만 11~12세에 Tdap 추가접종</p>

▶ 백일해 등 호흡기 감염병 예방수칙 카드뉴스



2024. 4. 25.
이 리 유 치 원 장

