



배움과 나눔으로 성장하는 행복한 학교  
가 온 교 육 통 신  
**사람유두종바이러스(HPV)**  
**국가예방접종 지원사업 안내**

제 2023-12호  
2023. 3. 6  
063)840-8205

학부모님 안녕하십니까?

2023년 사람유두종바이러스(HPV) 국가예방접종 지원사업과 관련하여 다음과 같이 안내드리오니 대상자는 접종에 참고해주시기 바랍니다.

지원대상	① 만 12~17세 여성 청소년(2005.1.1.~2010.12.31. 출생자) ② 만 18~26세 저소득층* 여성(1996.1.1.~2004.12.31.출생자) * 「국민기초생활보장법」상 기초생활보장수급자 및 차상위 계층
지원내용	○ 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종(총 2~3회)
지원백신	○ HPV 4가(가다실), HPV 2가(서바릭스) ※ 예방접종 횟수는 첫접종 연령에 따라 다르며, 자세한 내용은 접종기관에 문의
접종기관	○ 지정의료기관* 및 보건소* * * 지정의료기관의 경우 예방접종도우미 홈페이지( <a href="https://nip.kdca.go.kr">https://nip.kdca.go.kr</a> )> 예방접종 관리>지정의료기관 찾기>에서 확인 가능 * * 지자체 상황에 따라 일부 보건소에서는 예방접종이 불가능할 수 있으니 보건소 방문 전 확인 필요
관련서식	○ 예방접종도우미 홈페이지( <a href="https://nip.kdca.go.kr">https://nip.kdca.go.kr</a> )>'관련자료 다운로드'에서 확인 가능
예방접종 전·후 주의사항	○ 안전한 예방접종을 위해 미성년자는 보호자와 동행하도록 합니다. ○ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받도록 합니다. ○ 중증도 이상의 심한 급성질환이 있는 경우에는 접종을 연기하나, 감기 등 가벼운 질환을 앓는 경우는 접종 시행 가능합니다. ○ 접종부위는 청결하게 유지합니다. ○ 예방접종 후 20~30분간 접종기관에 앉아있거나 누워있는 것으로 더욱 안전한 접종이 가능합니다. ○ 예방접종 후 2~3일간은 주의깊게 관찰하고, 평소와 다른 신체증상이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

붙임 1. 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 안내문

2023년 3월 6일

**익산가온초등학교장**



# 2023년 HPV 국가예방접종 지원사업 안내



## 접종 필요성

- ☑ '자궁경부암'은 사람유두종바이러스(HPV) 감염이 주 원인으로, HPV 예방접종 시 자궁경부암 등 관련 암에 대해 70~90%의 높은 예방 효과가 있습니다.
- ☑ HPV 예방접종은 HPV 감염의 가장 큰 원인인 성경험 이전에 접종을 권고하고 있으며, 만 12세가 지났어도 성경험이 없는 경우라면 예방효과가 높아 조기에 접종을 권장합니다.

## 지원 대상 및 지원 내용

- 지원 대상** 만 12~17세 여성 청소년 (2005. 1. 1. ~ 2011. 12. 31. 출생자)  
 만 18~26세 저소득층\* 여성 (1996. 1. 1. ~ 2004. 12. 31. 출생자)  
 \* 「국민기초생활보장법」 상 기초생활보장수급자 및 차상위계층(기준중위소득 50% 이하)
- 지원 내용** HPV 예방접종 2~3회 지원  
 ※ 만 12세(10~11년생)는 접종과 건강상담 함께 제공

## 접종 기관

- 지정의료기관** 예방접종도우미 누리집에서 확인(<https://nip.kdca.go.kr>)
- 보건소** 지자체 상황에 따라 보건소에서 예방접종이 불가능할 수 있으니 방문 전 확인

## 접종 횟수

- ☑ HPV 1차 접종 당시 만 12~14세 2회, 만 15세 이상 3회
- ※ 자세한 접종 일정은 접종 당일 지정의료기관 또는 보건소에서 상담

## 예방접종 전·후 주의사항

- ☑ 안전한 예방접종을 위해 미성년자는 보호자와 동행하도록 합니다.
- ☑ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받도록 합니다.
- ☑ 중증도 이상의 심한 급성질환이 있는 경우에는 접종을 연기하나, 감기 등 가벼운 질환을 앓는 경우는 접종 시행 가능합니다.
- ☑ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ☑ 예방접종 후 20~30분간 접종기관에 앉아있거나 누워있는 것으로 더욱 안전한 접종이 가능합니다.
- ☑ 예방접종 후 2~3일간은 주의 깊게 관찰하고, 평소와 다른 신체증상이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

※ 자세한 예방접종 안내는 보건소 및 의료기관에서 가능합니다.