



따뜻한 마음 새로운 생각으로 꿈을 키우는 어린이 육성

코로나19-인플루엔자 동시 유행 대비 안내

(56428) 고창군 고창읍 중앙로 259 • 교무실 560-1704 • 보건실 560-1750 • FAX 562-1029

학부모님, 안녕하십니까?

질병관리청에서 올해 겨울은 코로나19와 인플루엔자의 동시 유행을 우려하고 있습니다. 또한 현재 우리 지역에 인플루엔자 환자가 증가함에 따라 코로나19와 인플루엔자 예방 및 대처 방법에 대해 안내하오니, 증상이 있는 학생은 병원 진료를 받을 수 있도록 부탁드립니다.

구분	인플루엔자(독감)	코로나 19
정의	□ 인플루엔자 바이러스(Influenza virus A.B.C)에 의한 급성 호흡기 질환	□ 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2)에 의한 급성 호흡기 질환
전파 경로	□ 감염된 환자의 호흡기로부터 비말 매개 전파	□ 감염된 환자의 호흡기로부터 비말 매개 전파
잠복기	□ 1~4일(평균2일)	□ 평균 잠복기 4.2일
감염 기간	□ 증상 시작 1일 전부터 4~5일간 전파력 높음 □ 단, 소아나 면역저하자에게는 바이러스 배출 기간이 2주 이상 길어지기도 함	□ 증상 발생 1~3일 전부터 증상 후 7일 정도 □ 전파력 높음(오미크론)
주요 증상	□ 고열(38~40℃), 마른기침, 인후통 등 □ 그 외 두통 근육통, 피로감, 쇠약감, 식욕부진, 콧물, 코막힘, 안구통, 구토, 복통 등이 동반될 수 있음 □ 대부분 경증 자연 치유, 개인에 따라 합병증 발생 또는 기저 질환의 악화로 중증 질환까지 다양함. □ 증상 지속 기간 5~9일 <div> 인플루엔자 주요 증상 발열, 두통, 근육통 기침, 콧물, 인후통 설사 메스꺼움, 구토 ● 발열과 같은 전신 증상 3~4일간 지속 ● 기침과 인후통은 해열된 후에도 며칠간 더 지속될 수 있음 </div>	□ 발열, 오한, 기침, 호흡곤란, 인후통, 원목소리 등 □ 그 외 피로, 근육통, 몸살, 두통, 미각 또는 후각 상실, 코막힘, 콧물, 구토, 메스꺼움, 설사 등 □ 무증상, 경증부터 중증 질환까지 다양함 <div> 코로나19 주요 증상 마른기침, 인후통 발열 피로 근육통 후각·미각손실 </div>
예방 수칙	□ 인플루엔자 예방접종(70~90% 예방효과 있음) □ 유증상 시, 가까운 의료기관 방문하여 진료받기 □ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 □ 마스크 착용 및 기침 예절 지키기 □ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기	□ 코로나 백신접종 □ 유증상 시, 가까운 의료기관 방문하여 진료받기 □ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 □ 마스크 착용 및 기침 예절 지키기 □ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

2022년 11월 11일

고 창 초 등 학 교 장



*** 예방접종 금기사항**

- 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우
- 백신접종 후 심한 과민 반응 또는 계란에 심한 과민 반응의 과거력이 있는 경우
- 과거 백신접종 후 6주 이내 길랑-바레 증후군이나 다른 신경 이상의 발생력
- 현재 발열이 확인된 경우

※ 백신접종은 절대 강제 사항이 아니며 본인과 보호자가 모두 희망하는 경우에만 접종 시행

※ 모든 예방접종은 부작용이 있을 수 있으므로 의사와 충분히 상담 후 예방접종