

- 1. 하나님을 사랑하자.
- 2. 사람을 사랑하자.
- 3. 흠을 사랑하자.



## 코로나19 유증상자 발생시 주요변경사항 및 설 연휴 특별 방역대책 대책 안내

안녕하십니까?

최근 오미크론 변이 확진자 급증에 따라 중앙방역대책본부에서 확진자 및 접촉자 관리기준이 변경되어 안내하오니 가정에서는 변경지침을 참고하시어 건강한 생활을 하시기 바랍니다.

### I 오미크론 변이 바이러스 특징

- 국내 발생 오미크론 검출률 50.3%로 우세종화(1월 3주차)
- 오미크론 치명률 0.16%로 델타 바이러스 0.9%에 비해 1/5 낮음

구분	코로나19 바이러스	델타 변이 바이러스	오미크론 변이 바이러스
증상	미각·후각 소실 기침, 인후통, 설사, 두통 발열 등	미각·후각 소실 기침, 콧물, 두통, 재채기 등	미각·후각 소실(-) 피로감, 근육통, 인후통(목아픔) 등
특징			델타 변이보다 전파력 높고 중증도 낮음
예후	코로나19 바이러스 변이 거듭하면서 사망률, 중증도 약화 경향 ※ 중환자실 병상 가동률 71.9%(12월 5주)에서 25.9%(1월 3주)로 감소		

### II 확진자 및 접촉자 발생시 주요 변경 사항

- 확진자: 지자체, 유행 규모 급증 시 심층 역학조사 생략 가능
- 접촉자: 가족 및 중증 진행 고위험군\* 중심 조사
- \* 60대 이상, 고위험 기저질환자, 감염 취약 시설(장기 요양기관, 정신건강 시설, 장애인시설) 3종

학교는 감염취약시설에서 제외되어 학교에서 확진자 발생 시 접촉자 파악하지 않습니다.  
코로나19 의심증상 발생 시 인근 보건소 방문하여 검사 받으시기 바랍니다.

### III 설 연휴 특별방역 대책 안내

- 설 연휴 포함 다중 이용 교통수단 이용 시 KF 80 이상 마스크 권장
- 미접종자 기본 접종, 2차 접종 유효기간 만료 전 3차 접종하기
- 올바른 마스크 착용, 감염위험시설(밀집·밀접·밀폐 시설) 보건용 마스크 착용하기
- 1일 3회 이상 회당 10분 이상 환기하기

● **출발 전**

- 최소 2주 전 백신접종 완료 또는 3차 접종
- 코로나 진단검사 시행
- 코로나19 의심 증상 발현시 방문 및 모임 취소 또는 연기
- 다중이용시설 출입 자제

● **이동할 때**

- 가급적 개인차량 이용
- 대중교통 이용시 마스크 착용 및 음식 섭취 자제
- 휴게소 체류시간 최소화
- 밀집장소 출입자제

● **고향에서**

- 차례 등 제례 참석인원 최소화
- 짧게 머무르기
- 어르신 등 만날 때는 **손 소독 및 마스크** 착용
- 자주 **손을** 씻고 주기적 **실내 환기**(1일 3회 이상)

● **귀가 후**

- 일정 시간 다중이용시설 출입자제
- 집에서 머무르면서 건강상태 관찰
- 타지역 방문 후 일상생활 복귀 전 적극 PCR 검사 받기

 **이럴 땐,  
학교나  
담임선생님께 꼭  
알려주세요!**

✔️ 코로나19 관련 격리 통보 또는 확진 받는 경우 등 **특이사항이 있을 땐** 즉시 학교나 담임선생님께 알려주시기 바랍니다.

▶ 학생 또는 동거가족이 **코로나19** 확진을 받은 경우

건강 상태  
자가진단

✔️ 교육부 지침에 따라 **방학 중에 중단되었던 건강상태 자가진단을 개학 1주일 전(2022. 2. 23.수)부터** 재개하오니 반드시 참여해주시기 바랍니다.

2022. 1. 27.

금 성 여 자 중 학 교 장 "직인생략"