



성홍열 예방 및 관리 수칙 안내

2025학년도
교육소식



교무실: 833-2621, 행정실: 835-0646, 담당 : 김현옥

학부모님 안녕하십니까?

최근 국내에서 성홍열 환자 발생이 증가하고 있으며, 특히 유치원, 학교 등 집단시설에서 소아·청소년 중심 집단발생 가능성이 있어 성홍열 예방 및 관리에 각별한 주의가 요구되고 있습니다. 이에, 성홍열 예방 및 관리 수칙을 안내드리오니 참고하여 주시기 바랍니다.

성홍열 질병 개요

| | |
|------|--|
| 병원체 | A군 베타 용혈성 연쇄구균 (2급 감염병) |
| 전파경로 | ·환자의 호흡기 분비물과 직접 접촉 ·환자의 호흡기 분비물과 손이나 물건을 통한 간접 접촉 |
| 주요증상 | <p>·인후통에 동반되는 갑작스런 발열, 두통, 식욕부진, 구토, 인후염 등</p> <p>·발진 : 1~2일째 작은 좁쌀 크기로 입주위 및 전신(손발바닥 제외)에 발생했다가 3~4일 후 사라지기 시작</p> <p>·붉은 얼굴 : 얼굴은 홍조가 나타나나 입 주위는 창백</p> <p>·혀 : 초기에는 회백색에서 발병 후 2~3일이 지나면 붉은색(딸기모양의 혀)</p> |



성홍열 예방·관리 수칙

| | |
|----|---|
| 예방 | <p>□ 예방 백신은 없으며 일반적 예방수칙 준수</p> <ul style="list-style-type: none"> - 올바른 손씻기 : 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 - 기침 예절 : 기침이나 재채기는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기, 발열 및 호흡기 증상이 있으면 마스크 쓰기 - 수건, 물컵, 식기구 등 개인용품 공유하지 않기 - (환경소독) : 가구 표면, 장난감, 손잡이, 수도꼭지 등 자주 청소, 소독하기 |
| 관리 | <ul style="list-style-type: none"> - 발열, 인후통 등 성홍열 의심 증상이 있으면 빠른 시일 내 의료기관 진료 - 성홍열 진단 시, 항생제 치료 시작 후 최소 24시간까지 등교 중지 (*2급 법정감염병으로 출석인정, 등교 시 소견서 제출) |

2025. 6. 11.

전 북 맹 아 학 교 장

