



## 제목 : 신학기 감염병 예방 안내

학부모님, 안녕하십니까?

항상 자녀의 건강한 학교생활을 위해 협조해 주시는 학부모님께 감사드립니다.

감염병 환자 등교 중지 및 호흡기 관련 예방수칙에 대해 안내드립니다. 아래 사항들을 참고하시어 감염병 확산 방지에 협조해 주시기 바랍니다.

## 1. 감염병 의심 및 진단 시 등교 중지 안내

- ① 감염병이 의심 될 경우 등교하지 않고 담임교사에게 연락 후 병원 진료를 받도록 합니다.
- ② 감염병 진단을 받은 경우, 담임교사에게 감염병 발생 여부를 알립니다.
- ③ 증상 발현 후 학교나 학원에서 집단 발병을 예방하기 위해 일정 기간 등교하지 않습니다.
- ④ 병명과 격리기간이 명시된 의사 소견서(또는 진료확인서, 진단서) 제출 시 출석 인정  
(등교중지 기간은 의사 소견에 따름)

## 2. 호흡기 감염 예방 수칙

- ① 올바른 손씻기 생활화하기: 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ② 기침 예절 실천하기
  - 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기
  - 기침 후 올바른 손씻기 실천하기
  - 발열과 호흡기 증상(기침, 콧물, 목아픔 등)이 있을 시 마스크 착용하기
- ③ 씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기
- ④ 발열 및 증상 시 의료기관 방문 등을 통해 적절한 진료 받기
- ⑤ 실내에서 자주 환기

## 3. 감염병 증상 및 등교중지 기간

병명	증상	전파경로
인플루엔자	발열, 두통, 근육통, 인후통, 기침 등	○ 전파경로: 환자 또는 보균자의 비말 감염에 의한 전파 (전염성이 강함) ○ 등교가능 기간: 해열제 없이 정상체온 회복 후 24시간이 경과할 때까지 (단, 해열제를 투약한 경우 마지막 해열제 투약 시점부터 48시간이 경과해야 함)
백일해	상기도 감염 증상, 발작적 기침, 구토 (발열은 심하지 않음)	○ 전파경로: 환자 또는 보균자의 비말 감염에 의한 전파 (전염성이 강함) ○ 등교중지기간: 적절한 항생제 투여 시작 후 5일까지
홍역	발진, 발열, 기침, 콧물, koplik 반점(구강의 회백색 반점)	○ 전파경로: 호흡기 분비물 등의 비말 또는 오염된 물건을 통한 ○ 등교중지기간: 피부발진 후 5일까지
유행성 이하선염 (볼거리)	이하선 부종, 발열, 두통, 근육통	○ 전파경로: 타액, 비말을 통한 직접 전파, 타액과 비말로 오염된 물건을 통한 전파 ○ 등교중지기간: 증상 후 5일까지
수두	피부 발진, 수포, 발열, 피로감	○ 전파경로: 직접전파-비말, 타액, 수포액의 직접 접촉 ○ 등교중지기간: 모든 피부 병변에 가피가 생길 때까지
수족구병	발열, 손·발바닥·구강 내 수포 및 궤양	○ 전파경로: 분변 경구 전파, 비말감염, 매개물에 의한 간접전파 ○ 등교중지기간: 발병 후 7일간 가장 전염력 강함. 피부 병변(수포)에 가피가 형성될 때까지
결핵	발열, 전신 피로감, 식은땀, 체중 감소	○ 전파경로: 호흡기 분비물 등의 공기 전파 ○ 등교중지기간: 약물 치료 시작 후 2주까지

2025년 3월 7일

전 북 펫 고 등 학 교 장

