

• 노로바이러스 식중독이란?



식품의약품안전처


특징

- 노로바이러스에 오염된 음식물이나 물을 통해 사람에게 감염
- 영유아에서 성인까지 폭넓은 연령층에 발생 하나 특히, 어린이, 노약자 등 면역력이 약한 사람에게 위험
- 겨울철에 발생하지만 계절에 관계없이 연중 지속적으로 발생




증상

- 감염 후 24~48시간 내에 설사, 구토, 발열, 복통을 일으킴. 통상 3일내에 회복되나 1주간 분변으로 바이러스는 계속 배출



예방법

- 음식물이나 물은 85°C에서 1분 이상 충분히 가열한 후 섭취
- 외출 했다 돌아온 후, 식사전 반드시 손씻기
- 여성비누, 알코올 소독제는 충분한 소독 효과가 없으나, 염소소독제는 효과가 있음



노로바이러스감염 예방수칙!

★ 개인위생 철저!! 손씻기 잊지 마세요~

★ 채소 및 과일 등 생으로 섭취할 땐 깨끗한 물에 씻으세요.

★ 음식은 완전히 익혀 먹자. 특히 조개 등의 패류는 꼭 익혀서!!

★ 환경 위생 관리

- 염소 : 장난감 등(200mg/L), 바닥·화장실(100mg/L), 토사물 등(5000mg/L)
- 가열 : 70°C에서 5분간 가열 또는 100°C에서 1분간 가열

★ 설사 등 증상이 있을 땐 음식 조리 NO 영유아, 환자 간호 NO



