

수두유행에 따른 안내

학부모님 안녕하세요 ?

요즘 우리학교 어린이들에게 수두가 증가하고 있어 알려드립니다. 예방 주사를 맞아도 걸리게 되므로 기침예절을 준수하고 흐르는 물에 비누로 손 씻기 등 개인위생을 청결히 하여 발생하지 않도록 부탁드립니다.

구 분	내 용
병원체	수두 대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)
전파경로	수포성 병변에 직접접촉, 호흡기분비물의 공기전파를 통해 감염
전염기	발진(수포)생기기 1~2일전부터 가피 생길때까지
증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 잠복기는 10~21일(평균 14~16일)이며, 발진 발생 1~2일 전 권태감과 미열이 나타난 뒤 발진이 발생(소아의 경우 발진이 첫 번째 증상으로 나타나기도 함) ■ 발진은 보통 머리에서 처음 나타나 몸통, 사지로 퍼져나가는데 그 과정에서 반점, 구진, 수포, 농포와 같은 다른 형태로 진행되고, 회복기에 이르면 모든 병변에 가피가 형성됨. ■ 수두는 일반적으로 증상이 가볍고 자가 치유되는 질환이나 간혹 합병증(2차 피부감염, 폐렴, 신경계 질환)을 동반
치료	대증요법(피부병소의 세균감염을 줄이기 위한 목욕, 항히스타민제 투여 등)
감염경로	<ul style="list-style-type: none"> ■ 수두는 피부병변과의 접촉 또는 말하거나 재채기할 때 나오는 호흡기분비물을 통해 감염되므로, 집단생활을 하는 학교 등에서 발생 증가가 우려됨 ■ 수두는 연중 4~6월, 11~1월에 많이 발생하며, 4~6세 연령대에서 발생률이 높음
환자관리	전파방지를 위해 환자는 모든 병변이 가피로 앓을 때까지 격리가 필요함(1주일)
예방	<p>수두 예방을 위해서는 개인위생 수칙을 준수하고, 수두를 앓은 적이 없거나 예방접종을 받지 않은 소아는 예방접종을 받아야 함</p> <p>* 접종기준: 생후 12~15개월 1회 예방접종</p>
수두의심 혹은 발병시	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전염력이 강하여 출석으로 인정하므로 담임교사에게 전화 연락 후 학교, 학원 및 마트 등에 가지 않아야하고, 피(딱지)가 형성될 때까지 집에서 쉽니다. ■ 담임 선생님께 의사소견서를 제출합니다.



[수두 증상]

2019년 6월 12일

전주만성초등학교장 박 성 배

단체생활 감염병 예방수칙 및 손 씻기 등 개인위생 실천

□ 단체생활 감염병 예방수칙

- ✓ 첫째, 비누를 사용하여 30초 이상 손을 자주 씻고, 기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침예절을 지켜 주세요.
- ✓ 둘째, 감염병 의심증상이 발생한 경우 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에 방문하여 진료를 받으세요.
- ✓ 셋째, 집단유행을 막기 위해 감염 환자는 전염기간* 동안에는 등원·등교(학원 등 사람이 많은 장소 포함)를 하지 않도록 하세요.

*등원·등교중지기간: (수두) 모든 수포에 딱지가 앉을 때까지 격리

□ 올바른 손씻기(30초 이상) 및 기침예절 지키기

