



가정통신문

교훈
성실, 창의, 협동

전주시 완산구 따박골 2길 21 전화) 063-220-6401 팩스) 063-220-6405 (www.jgch.hs.kr)

(2, 3학년 결핵검사 실시 안내)

★ 1. 결핵검사

검사 일시	2023.3.29.(수) 9:00	검사 복장	1. 교복 안에 면티를 입고 등교합니다. 검사 전 교복 상의를 탈의하고 면티만 입은 상태 에서 검사합니다. (속옷은 그대로 착용하고 검사합니다.)
검사 대상	2, 3학년 재학생 전원(266명) 지각·결석하지 않기!!		2. 목걸이 등의 악세사리나 장식이 달린 티셔츠, 후드티를 입지 않아야 합니다.
검사 장소	교내 주차장		
검사 방법	3학년 1반부터 반별로 순차적 실시, 이동 검진차량에서 흉부 엑스선 촬영		
검사 안내 영상	QR코드를 통해 결핵검사 안내영상을 확인해 보세요 https://youtu.be/KLk7XtRQJjY		



★ 2. 결과안내

- 가. 검사 결과 정상인 경우 따로 결과 통보를 하지 않으며 이상이 있는 경우에만 차후 가정통신문을 발송합니다.
- 나. 검사 결과 결핵으로 의심되는 학생은 보호자 동의하에 보건소에서 2차 검사(객담, 혈액 검사)를 시행합니다.
- 다. 검사 당일 결석한 학생은 보건소에 개별 방문하여 흉부 X-선 촬영을 해야 합니다.
(모든 학생 결핵검사 의무사항)

3. 결핵이란?

★ 결핵은 전신의 병으로,

- ☞ 결핵은 우리 몸 어느 곳이나 발생할 수 있는 전신의 병이나 폐에 균이 가장 잘 침범하므로 폐결핵이 대부분을 차지함
- 결핵에 감염되었다고 모두 다 병으로 발전하는 것은 아님(감염된 사람의 10% 정도가 활동성 결핵)
- 결핵의 전염을 막는 가장 중요하고 효과적인 방법은 전염병 환자의 빠른 발견과 발견된 환자가 치료를 받는 것임

★ 결핵환자에게 나타나는 증상

- 평소 2주 이상 지속되는 기침, 가래, 객혈(피섞인 가래), 무력감과 미열, 호흡곤란, 가슴통증, 수면 시 식은 땀 등의 증상이 있다면 즉시 보건소를 방문하여 결핵 검사를 받아야 함
- 조기에 발견하면 약물로 완치 가능하나 적절한 치료하지 않으면 사망할 수 있음

★ 결핵의 감염과 발병

- 전염성이 있는 폐결핵 환자가 기침, 재채기, 노래, 말을 할 때 결핵균이 공기 중으로 나와 떠돌아다니다가 주위에 있는 사람들이 숨을 들이쉴 때 공기와 함께 폐 속으로 들어가 증식하여 감염이 이루어짐
- 평균적으로 환자와 가까이 접촉한 사람들의 25~30% 정도가 감염됨
- 집안에 결핵환자가 있을 경우 어린이와 노인은 반드시 병원에서 진찰받아야 함

★ 결핵 치료

- 결핵약을 2주 이상 지속적으로 복용하게 되면 대부분의 경우 전염성이 없어짐
- 최소 6개월 이상의 장기적이고 지속적인 약물복용이 매우 중요하며, 증세가 일시적으로 호전되었다고 해서 약 복용을 조기 중단하면 치료에 실패하거나 재발의 확률이 높아짐