



제 2021 - 13호

코로나19 예방 안내문

2021년 4월 14일

전주여자고등학교 보건실

☎ 710-5561

<http://www.jjg.hs.kr>

1 전북 현황

2021. 4. 14.(수)까지 전북의 코로나19 확진자는 1,751명 발생(1,414명 격리해제)하였습니다.

2 코로나19 예방접종 2분기 시행계획 [질병관리청]

○ 11월 집단면역 형성으로 함께 일상을 회복할 수 있도록 접종순서에 해당하시는 분들은 예방접종에 적극 참여해주시기 바랍니다.



요양병원 및
요양시설

- 요양병원·시설의 65세 이상 입원·입소자 및 종사자(37.7만명)는 3월 4주부터 접종 시작

* 영국·스코틀랜드의 접종결과를 근거로 65세 이상에 대한 아스트라제네카의 사용을 권고(3.10.)한 바 있으며, 이에 따라 요양병원·시설의 65세 이상 입원·입소 및 종사자에 대한 접종에는 아스트라제네카 백신을 사용할 예정




코로나19
취약시설 입소자
및 종사자

- 감염취약시설의 거주·이용자 및 종사자 등(66.94만명)에 대한 접종을 추진, 2분기 중 취약시설에 대한 1차 접종을 완료할 예정



65세 이상
어르신

시작 시기	4월 1주	6월중
대상	75세 이상(364만명)	65~74세(494.3만명)
접종장소	예방접종센터	위탁의료기관
	읍면동 등 지역단위에서 사전등록부터 이동, 접종, 귀가, 접종 후 모니터링까지 책임지는 지원체계 구축	온라인 예약이 어려운 어르신들을 고려, 콜센터(☎1339)를 통한 예약접수 준비중



학교 및
돌봄공간

시작 시기	4월중	6월
대상	특수교육과 장애아보육(5.1만명), 유치원 및 학교 내 보건교사와 어린이집의 간호인력(1.3만명)	유치원과 어린이집, 초등학교 1·2학년을 담당하는 교사, 교직원 및 관련종사자(49.1만명)



만성질환자

- 만성신장질환자(투석환자, 9.2만명) 및 만성중증호흡기질환자(1.2만명)에 대한 접종 실시

* 투석환자는 확진시에도 주기적 투석이 필요하며, 이 과정에서 격리 등 방역 조치가 어렵기 때문에 코로나19 예방접종이 필요합니다.



보건의료인과
사회필수인력 등

대상	시작 시기	세부 내용
보건 의료인	6월	• 의원급 의료기관, 치과 병·의원, 한방 병·의원, 약국에 종사하는 보건의료인까지 확대할 계획
사회필수인력	6월	• 경찰, 해양경찰, 소방, 군인 • 당초 3분기로 예정된 접종을 2분기 중 실시할 예정
항공승무원	5월	• 변이바이러스를 포함한 코로나19 유입 방지 목적 * 직업 특성상 해외출입은 잦으나, 자가격리 예외를 적용받고 있음

3 코로나19 예방접종 실시 과정 [질병관리청]

○ 예방접종 대상 확인 및 예약 절차

가. 개인별 예방접종시기 안내

- ▶ 누리집 접속(<http://ncv.kdca.go.kr>)



개인의 해당분기
예방접종대상포함 여부 및
추후 접종가능시기 안내

나. 예약 안내

1) 64세 이상, 일반국민 등

- ▶ 질병관리청 : 예약가능 안내(SMS 등)
- ▶ 예방접종 대상 : 누리집(인터넷 또는 모바일), 콜센터(☎1339)로 예약
- ▶ 예방접종 대상인 경우 가까운 예방접종 기관(예방접종센터, 위탁의료기관)에 1차 예방접종 가능 시기를 선택하여 예약
- ※ 2차 예방접종은 1차 접종 완료 후 예약 가능

2) 우선순위 대상기관 근무자

- ▶ 기관을 통한 예방접종의향 제출
- ▶ 기관별 일정에 따라 예방접종 실시
- ▶ 기관 : 예방접종 계획 수립, 백신 공급 등 일정 조율

○ 예방접종 기관에서



대기

- ▶ 발열 체크 및 대상자 확인
- ▶ 예방접종안내 및 예진표 작성



예방접종

- ▶ 예진 및 대기
- ▶ 예방접종



예방접종 후 관찰

- ▶ 예방접종 내역 확인서 수령(1차)
- ▶ 15~30분간 이상반응 관찰

○ 예방접종이 끝나고



예방접종 직후~3일 까지

- ▶ 귀가 후 3시간 이상 안정을 취하고, 주의깊게 관찰하기
- ▶ 3일간 특별한 증상이 나타나는지 관심 기울이기
- ※ **접종부위 통증, 발적, 두통, 피로감, 발열, 오한, 근육통 등 증상**이 나타날 수 있으며, 이는 정상적인 면역 반응으로 대부분 3일 내 사라짐



이상반응 발생이 의심되는 경우

- ▶ 대부분 해열·진통제 복용으로 증상이 호전되나, **3일 이상 발열이나 근육통이 지속된다면** 가까운 의료기관 방문하기
- ▶ 만일 **호흡곤란, 의식소실, 안면부종** 등을 동반한 심각한 알레르기 반응(아나필락시스 등)이 나타난 경우에는 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하기

○ 예방접종 후, 이런 증상이 생기면



접종부위 부기·통증이 있는 경우 깨끗한 수건으로 냉찜질



미열이 있는 경우 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취함



전신 통증이나 발열로 불편감이 있는 경우, 해열·진통제 복용



해열·진통제 복용에 제한은 없으나, 가급적 염증 제거 효과가 없는 아세트아미노펜 성분의 의약품 복용