



제 2021 - 21호

코로나19 예방 안내문

2021년 5월 27일

전주여자고등학교 보건실

☎ 710-5561

<http://www.jjg.hs.kr>

1 전북 현황

2021. 5. 27.(목)까지 전북의 코로나19 확진자는 2,199명 발생(2,023명 격리해제)하였습니다.

2 마스크 착용 장소별 기준과 착용 가이드 안내 [질병관리청]

가. 장소별 기준

- ✓ 실내 : 상시 마스크 착용
- ✓ 실외

- 집회·공연·행사 등 다중이 모이는 경우는 거리두기에 관계없이 마스크 착용
- 다른 사람과 2m 이상 거리두기가 어려운 경우 마스크 착용



나. 올바른 마스크 착용법

- ✓ 마스크는 입과 코를 완전히 가리고 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없도록 밀착해서 착용하는 것이 중요
※ 마스크를 착용하지 않았거나, 마스크를 착용하였으나 입과 코를 완전히 가리지 않은 경우는 미착용으로 간주

다. 착용 가능한 마스크의 종류

- ✓ 보건용 마스크(KF94, KF80 등), 비말차단용 마스크(KF-AD) 및 수술용(덴탈) 마스크
- ✓ 입과 코를 가릴 수 있는 천·면 마스크, 일회용 마스크
※ 망사형 마스크, 밸브형 마스크, 스카프 등의 옷가지로 얼굴을 가리는 것은 인정하지 않음

라. 마스크 착용 주의해야 할 경우

- ✓ 24개월 미만 영유아
※ 단, 아동 간 발달 상태가 다르므로 24개월 이상의 영유아일지라도, 마스크를 착용하는 경우 보호자의 세심한 관찰·감독이 필요
- ✓ 마스크 착용 시 호흡이 어려운 사람
※ 마스크 착용 중 호흡이 어려운 경우 즉시 마스크를 벗고 다른 사람과 분리된 별도의 장소에서 충분히 휴식을 취하도록 함
- ✓ 주변의 도움 없이 스스로 마스크를 착용하거나 벗기 어려운 사람

마. 마스크 착용 위반 시 과태료 안내

- ✓ 위반당사자 : 마스크를 착용하지 않거나 올바르게 착용하지 않은 경우, **10만원 이하의 과태료 부과**(횟수에 관계없이)
- ✓ 시설·장소 관리자·운영자 : 방역지침 게시 및 안내 등 관리 의무를 다하지 않은 경우, **300만원 이하의 과태료 부과**(* 1차 150만원, 2차 300만원)

3 혈소판 감소성 혈전증과 일반 혈전증은 어떻게 다른가요? [질병관리청]

- 혈소판 감소성 혈전증은 일반 혈전증과 달리 발생 확률이 희박하고 혈소판 감소를 동반한 뇌정맥동혈전증, 내장정맥혈전증 등과 같은 희귀한 혈전증으로, 매우 희박하지만 예방접종 후 4일~28일 내 발생할 수 있습니다.
- 코로나19 예방접종 후 혈전 의심 증상으로 의사의 진료가 필요한 경우
 - ① 접종 후 4주 내 호흡곤란, 흉통, 지속적인 복부 통증, 다리 붓기와 같은 증상이 나타난 경우
 - ② 접종 후 심한 또한 2일 이상의 지속적인 두통이 발생하며, 진통제에 반응하지 않거나 조절되지 않는 경우 또는 시야가 흐려지는 경우
 - ③ 접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타난 경우
 - ④ 접종 후 접종 부위가 아닌 곳에서 멍이나 출혈이 생긴 경우
- 혈소판 감소성 혈전증은 의사의 진료를 통해 조기 발견하고 적절히 치료하면 회복 가능한 질환입니다.