



안녕하십니까?

최근 **수두 및 유행성이하선염** 등 봄철 빈발 감염병의 유행이 우려되고 있습니다.  
이에 **개인위생수칙을 준수**하도록 협조하여 주시기 바랍니다.

\* 수두, 유행성이하선염은 **2급 법정감염병**으로 **진료확인서, 의사소견서, 진단서** 등 제출 시 **출결 인정됩니다.**

- 손씻기, 기침예절 지키기, 의심증상이 있는 경우 마스크 착용 등 개인위생 철저
- 발진, 발열 등 의심증상이 있는 경우 진료받기
  - 수두 의심증상 : 발진, 발열, 권태감 등
  - 유행성이하선염 의심증상 : 발열, 이하선의 종창이나 동통
- (의사)환자는 전염기 동안 등원 중지

수두		유행성이하선염	
<p><b>개요</b></p> <p>▶ 수두 바이러스에 의한 급성 발진성 감염질환</p> 	<p><b>감염경로</b></p> <p>▶ 환자의 수포액과 직접 접촉 (피부 병변이 주요 감염 전파원)</p> <p>▶ 환자의 호흡기 분비물을 에어로졸로 흡입</p> <p>▶ 급성 수두 또는 대상포진 환자의 피부병변 수포액을 에어로졸로 흡입</p> 	<p><b>개요</b></p> <p>▶ 유행성이하선염 바이러스 (Mumps virus) 감염에 의하여 나타나는 이하선 부종이 특징적인 급성 발열성 질환</p> 	<p><b>감염경로</b></p> <p>▶ 비말전파, 오염된 타액과 직접접촉</p> <p>▶ 전염기간은 이하선염 발현 3일 전부터 발현 후 5일까지</p> 
<p><b>증상</b></p> <p>▶ 대부분 15세 미만에서 발생하며, 감수성이 있는 사람 대부분 발진이 나타남</p> 	<p><b>예방법</b></p> <p>▶ 소아는 생후 12~15개월에 수두 백신 1회 접종 (13세 이상 미접종자는 4~8주 간격 2회 접종)</p> <p>▶ 성인은 4~8주 간격 2회 접종</p> 	<p><b>증상</b></p> <p>▶ 4세~12세 학령기에서 주로 발생하며, 발열, 편측 혹은 양측 이하선의 종창이나 동통이 특징</p> <p>▶ 약 20%는 무증상 감염자, 일반적으로 30~40%에서 이하선 침범</p> 	<p><b>예방법</b></p> <p>▶ 면역의 증가*가 없는 성인은 적어도 1회 접종</p> <p>* 유행성이하선염이 포함된(MMR) 백신 접종력, 유행성이하선염 진단 이력, 유행성이하선염 항체 양성</p> 

2025년 5월 12일



전주성현유치원