

	꿈 · 땀 · 보람이 넘치는 행복한 학교	전주용흥초등학교 (063) 227-4636
	백일해 발생 증가에 따른 예방관리 안내	

### 학부모님 안녕하십니까?

올해 백일해가 전 세계적으로 유행하는 상황이며, 국내 환자도 가파른 증가세를 보이고 있습니다. 이와 관련하여, 예방 관리 방법을 안내해드리니 지도에 참고하시어 감염병 예방 및 전파차단에 협조 바랍니다.

감염병 관련 출석인정 안내 및 예방수칙
감염병 의심 또는 확진시 - ①등교중지 ②병원진료 ③담임교사에게 알리기(등교중지 기간은 의사소견에 따름)
완치 후 등교 시 - 병명과 격리기간이 명시된 의사소견서 등을 학교로 제출 시 출석인정

구분	내 용
주요특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 법정감염병(제2급)</li> <li>• 환자 또는 보균자의 비말 감염에 의해 전파, 전염성이 강함</li> </ul>
환자관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환자 격리: 비말격리, 항생제 치료기간 5일까지 격리 치료를 받지 않은 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리</li> <li>• 접촉자 관리: 예방적 항생제 투여, 증상 발생 모니터링</li> </ul>
주요증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 급성 호흡기 감염병, 발작성 기침이 특징적(발열은 심하지 않음)</li> <li>• 카타르기(catarrhal stage) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 콧물, 눈물, 경한 기침 등의 상기도 감염 증상이 1~2주간 나타남. 백일해균의 증식이 가장 왕성하여 전염성이 제일 높은 시기</li> </ul> </li> <li>• 발작기(paroxysmal stage) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발작성 기침 있으며, whooping cough, 기침 후 구토, 무호흡 등 증상이 나타남</li> <li>- 최근 확진환자들은 전형적인 백일해 임상 증상이 뚜렷하지 않고 가벼운 기침으로 발견되는 경우가 많았음</li> </ul> </li> <li>• 회복기(convalescent stage) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발작성 기침의 횟수나 정도가 호전</li> <li>- 회복은 천천히 진행되고 2~3주 후 기침은 소실되지만 비발작성 기침은 수주간 지속될 수 있음</li> </ul> </li> </ul>
예방	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예방접종 받기: 해당 대상자는 접종 시기에 맞춰 조속히 접종하기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생후 2, 4, 6, 15~18개월, 만4~6세에 DTaP 백신으로 접종 후 만 11~12세에 Tdap 백신으로 추가접종, 이후 Td 또는 Tdap 백신으로 매 10년마다 추가접종 실시</li> </ul> </li> <li>○ 발열 및 호흡기 증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기</li> <li>○ 올바른 손씻기의 생활화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기.</li> <li>- 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등</li> </ul> </li> <li>○ 기침예절 실천 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기</li> <li>- 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기, 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천</li> </ul> </li> <li>○ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기</li> </ul>

2024. 6. 17.

전주용흥초등학교장