



유아가 중심이 되고 놀이가 살아나는 유치원

장수한사랑유치원
제2024 - 4호

백일해 발생 증가에 따른 예방관리

보건실
☎ 353-8832

학부모님 안녕하세요?

백일해 감염병(2급 법정감염병)이 발생하는 가운데, 학교에서는 감염병 예방 수칙을 준수하여 확산 방지를 위해 각별한 주의를 기울이며, 학생들 건강관리에 최선을 다하고 있습니다. 가정에서도 주요 증상과 예방 수칙을 확인하시고, 자녀들이 생활 속 예방 수칙을 실천할 수 있도록 협조 부탁드립니다.


1. 백일해란?

전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병(2급 법정 감염병)으로 백일해균 감염에 의한 급성 호흡기 질환입니다.

1. 백일해는 어떻게 전파되나요?

- 감염된 사람의 기침, 재채기로 인한 비말 전파가 가능합니다.
- 유증상 감염자의 침, 콧물 등이 묻은 물건을 통해서도 간접적 전파가 가능합니다.

3. 백일해의 증상은? 잠복기는 일반적으로 7-10일(최소4일-최장 21일)입니다. 증상은 다양하지만 3단계로 진행되고 발열은 심하지 않습니다.

카타르기 (1-2주)		<ul style="list-style-type: none">· 일반적 감기와 비슷하고 전염력이 가장 높음.· 콧물, 재채기, 가벼운 기침이지만 점점 심해짐.
경해기 (4주이상)		<ul style="list-style-type: none">· 매우 심한 기침, 발작성 기침으로 밤에 더 흔하고, 하루평균 15회이상 발생.· 숨을 들이쉴 때 높은 소리의 흠(Whoop)소리 나는 특징.· 소아나 아기는 기침을 하는 동안 얼굴이 파래질 수 있고, 구토를 하거나 탈진이 발생할 수 있음.· 기침 발작 사이엔 아파보이지 않음.
회복기 (2-3주)		<ul style="list-style-type: none">· 발작성 기침이 서서히 줄면서 2-3주 내 사라짐.

4. 백일해 감염되면 어떻게 해야하나요?

- ① 전파 차단을 위해 전염기간 동안 **등교중지**하고 집에서 격리합니다.
- ② 등교 중지 기간
 - (적정 항생제 복용 시) 투여 후 5일까지 격리
(증상에 대한 별도 치료가 필요할 수 있으니 의료기관과 상담후 등교 결정)
 - (치료받지 않는 경우) 기침 멈출 때까지 최소 3주 이상 격리
- ③ 백일해 환자와 접촉한 사람은 의료기관 방문·상담 후 예방적 항생제 치료를 고려할 수 있습니다.

백일해 예방법은?



예방접종

접종일정에 맞춘 예방접종이
가장 중요합니다!



기초접종

1차
DTaP

생후 2개월

2차
DTaP

생후 4개월

3차
DTaP

생후 6개월



추가접종

4차
DTaP

생후 15~18개월

5차
DTaP

4~6세

6차
Tdap

11~12세

백일해, 인플루엔자(독감) 마이코플라스마 폐렴균 등
호흡기 질환 예방법



올바른 손씻기의 생활화

흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기



기침예절 실천

휴지나 옷소매로 입과 코를 가리기



실내에서는 자주 환기하기

하루 최소 3회, 매회 10분 이상



**씻지 않은 손으로
눈, 코, 입 만지지 않기**



**기침 증상이 있는 경우 마스크 착용하고
의료기관 방문하여 진료받기**

2024. 11. 19.

장 수 한 사 랑 유 치 원 장