



학부모님

가정에 평안과 행복이 가득하길 바랍니다.

질병관리청에서 현재 신종감염병증후군으로 대응 중인 원숭이 두창에 대한 위기 경보 수준을 **5월 31일 '관심' 단계**로 발령하고 **6월 8일 법정감염병(2급)**으로 지정하였습니다.

※ 현재 우리나라의 감염병 위기 경보는 관심→주의→경계→심각 등 4단계로 나누어 적용하고 있으며, 관심은 해외 신종 감염병의 '발생과 유행'시, 발령하는 조치

※ 2급 감염병:코로나19, 결핵, 수두 등 22종, 24시간 이내 신고, 확진자는 격리병상 치료

원숭이두창은 아프리카 풍토병이었으나 5월 7일 영국에서 첫 감염 사례가 나온 이후 유럽, 북미, 중동 등 각국으로 확산되고 있습니다.. 세계보건기구(WHO)에 따르면 6월 5일 기준 비풍토병 지역 27개국에서 780건의 원숭이두창 감염 사례가 확인되었습니다.

※ 원숭이 두창 발생 국가(총 24개국, 531일 09시 기준): 영국, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 미국, 캐나다, 벨기에, 이탈리아, 프랑스, 독일, 네덜란드, 이스라엘, 스위스, 호주, 덴마크, 오스트리아, 체코, 아르헨티나, 슬로베니아, 핀란드, 아일랜드, 몰타, 멕시코, 아랍에미리트

1. 전파경로 : 주로 **병변, 체액 등 오염물질과의 접촉**(공기 중 전파 사례는 흔치 않음)
2. 잠복기 : 통상 6~13일(21일까지)
3. 증상 : **발열(38도 이상), 오한, 두통, 림프절 부종, 수포성 발진(수두와 유사)**
(2~4주간 지속되다 대부분 자연회복)
4. 치명률 : 3~6%(의료체계 수준이 높은 지역에서는 치명률이 높지 않으며. 세계보건기구(WHO)는 현재까지 비풍토 지역에서 사망 보고는 없었다고 밝혔습니다.
5. 예방접종 : 정부는 현재 생물테러나 국가 공중보건 위기 상황에 대비해 1세대, 2세대 두창 백신 3천502만명분 비축되어 있고, 효과성이 입증된 3세대 두창 백신 도입 추진
※ 두창 백신은 원숭이 두창에 대해 약 85% 예방효과



6. 예방수칙

□ 일반적인 감염병 예방수칙 준수

- 마스크 착용 및 개인적인 위생(손 씻기 등) 수칙 준수
- 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가하기

□ 원숭이 두창 발생국가 방문 시 주의사항

- 방문 전, 원숭이 두창 발생지역 확인, 유증상자 및 설치류 등 야생동물과의 접촉 피하기
- 원숭이 두창 발생지역에서 귀국 후 21일 이내 **38도 이상 발열, 오한, 수포성 발진** 등 의심증상* 발생 시 의료기관 방문 전 질병관리청 콜센터(☎ 1339) 문의

2022 . 6 . 9 .

정 우 초 등 학 교 장