



백일해 감염병 예방 안내

학부모님 안녕하십니까?

백일해 환자가 급격히 확산되고 있는 상황으로 백일해 감염예방법을 안내합니다.

아래 내용을 참고하셔서 자녀들이 건강한 생활을 할 수 있도록 지도해 주시기 바랍니다

▷ 백일해란?



어떻게 전파되나요?

전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병(2급)으로 처음에는 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 기침이 점진적으로 심해져서 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타납니다. 이후 심한 기침 발작 후 좁아진 성대를 통해 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 ‘웁(Whoop)’소리가 발생합니다.

백일해는 호흡기 분비물 등의 비말 등을 통하여 호흡기로 감염되므로 손씻기 등 개인위생 수칙을 준수하고, 기침 증상이 있는 사람과의 접촉을 피하시기 바랍니다. 또한 기침 증상이 있는 사람의 경우에는 의료기관이나 보건소에 방문하실 때 반드시 마스크를 착용하시기 바랍니다.

▷ 예방접종의 중요성



예방접종

접종일정에 맞춘 예방접종이 가장 중요합니다!

백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)을 접종받도록 합니다.

☞ **접종 기준: 기본접종 3회(생후 2, 4, 6개월) 추가접종 3회(생후 15-18개월, 4-6세, 11-12세)**

▷ 자녀가 백일해에



걸렸거나 의심될 경우

- 백일해에 걸렸거나 의심될 경우 의료기관이나 보건소에 내원하여 **진료 및 검사**를 받도록 합니다.
※ 진단검사는 비인두 흡인액 등을 채취하여 백일해를 신속히 진단 및 치료하고, 추가 전파를 차단하기 위해 필요합니다.
- 백일해를 진단받은 경우 **학교(담임교사)**에 **알립니다**.
- 백일해 **항생제 치료 중인 경우에는 치료 5일 후까지**(치료를 받지 않은 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리)는 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 **등교중지** 하고 자택 격리치료 또는 입원치료를 받도록 합니다.
- 손 씻기를 자주하고 기침이나 재채기 할 때에는 반드시 휴지를 사용하거나 손수건이나 옷으로 가리도록 합니다.
- 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용합니다.

2024년 7월 23일

전 주 중 인 초 등 학 교 장