

 한국전통문화고등학교	<div>“창의적인 전통문화 인재 육성”</div> <div>가정통신문</div>	<div>새롭게 빛나는 전북교육</div> <div>제2023 -36호</div> <div>발송일: 2023.04.17.</div> <div>발송처: 한국전통문화고등학교</div> <div>관인생략</div>																							
제 목	감염병(엡폭스) 예방 안내문																								
<p>학부모님 안녕하십니까?</p> <p>질병관리청에 의하면 최근 국내의 엡폭스 환자가 증가함에 따라 금일부터 위기 경보 수준을 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 격상한다고 발표하였다. 이에 우리 아이들의 안전한 학교생활을 위해 감염병(엡폭스) 예방 방법을 안내하오니 세심한 지도를 부탁드립니다.</p> <p>▶감염병(엡폭스)의 질병 개요</p> <table><tr><td>구 분</td><td>내 용</td></tr><tr><td>정의</td><td>원숭이두창 바이러스(Monkeypox virus) 감염에 의한 급성 발열 발진성 질환</td></tr><tr><td>발생현황</td><td><ul style="list-style-type: none">제2급감염병2022년 6월 국내 첫 확진 사례가 보고됨</td></tr><tr><td>병원체</td><td><ul style="list-style-type: none">원숭이두창 바이러스(Monkeypox virus)</td></tr><tr><td>감염경로</td><td><ul style="list-style-type: none">원숭이두창 바이러스에 감염된 동물(쥐, 다람쥐, 프레리도그와 같은 설치류 및 원숭이 등) (피부병변 부산물) 감염된 동물·사람의 혈액, 체액, 피-부 직·간접 접촉 (매개물) 감염 환자의 체액, 병변이 묻은 매개체 접촉을 통한 전파 (비말) 코, 구강, 인두, 점막 있는 감염 비말에 의한 사람 간 직접 전파</td></tr><tr><td>잠 복 기</td><td><ul style="list-style-type: none">5~21일(평균 6~13일)</td></tr><tr><td>증상</td><td><ul style="list-style-type: none">발열, 오한, 림프절 부종, 피로, 근육통 및 요통, 두통, 호흡기 증상(인후통, 코막힘, 기침 등) 등과 같은 증상이 나타나며, 보통 1~4일 후에 발진 증상이 나타남발진은 얼굴, 입, 손, 발, 가슴, 생식기 에서 나타남 (반점→구진→수포(물집)→농포(고름)→가피(딱지))로 진행되며 초통증과 가려움증 동반하기도 함</td></tr><tr><td>진 단</td><td><ul style="list-style-type: none">검체(피부병변액, 피부병변조직, 가피, 구인두도말, 혈액 등)에서 검출</td></tr><tr><td>치 료</td><td><ul style="list-style-type: none">대증치료필요시, 국가 비축 항바이러스제(테코비리마트) 치료 시행</td></tr><tr><td>환자 관리</td><td><ul style="list-style-type: none">표준주의, 접촉주의, 비말주의 준수환자: 감염력이 소실될 때까지(피부병변의 가피가 탈락되고 새로운 피부형성) 1인실 격리 입원·치료의사환자: 1인실 격리병상 배정 후 검체 채취(검사결과 시까지 격리유지)</td></tr><tr><td>예 방</td><td colspan="2"><ul style="list-style-type: none">예방접종 FDA(미국)과 EMA(유럽)에서 두창과 엡폭스 백신으로 3세대 백신을 승인한 바 있음예방을 위한 주의사항<ul style="list-style-type: none">① 감염된(감염의 위험이 있는) 사람 또는 동물과의 직·간접적 접촉 피하기② 감염된 환자가 사용한 물품(린넨과 같은 침구류 등)과의 접촉 피하기③ 의심되는 사람, 동물 또는 물건과 접촉을 한 경우, 비누와 물로 손을 씻거나 알코올 성분의 손 소독제를 이용하여 깨끗이 하기④ 엡폭스 발생국(장소)을 여행하는 경우, 바이러스를 보유할 수 있는 동물과의 접촉 피하기</td></tr></table>			구 분	내 용	정의	원숭이두창 바이러스(Monkeypox virus) 감염에 의한 급성 발열 발진성 질환	발생현황	<ul style="list-style-type: none">제2급감염병2022년 6월 국내 첫 확진 사례가 보고됨	병원체	<ul style="list-style-type: none">원숭이두창 바이러스(Monkeypox virus)	감염경로	<ul style="list-style-type: none">원숭이두창 바이러스에 감염된 동물(쥐, 다람쥐, 프레리도그와 같은 설치류 및 원숭이 등) (피부병변 부산물) 감염된 동물·사람의 혈액, 체액, 피-부 직·간접 접촉 (매개물) 감염 환자의 체액, 병변이 묻은 매개체 접촉을 통한 전파 (비말) 코, 구강, 인두, 점막 있는 감염 비말에 의한 사람 간 직접 전파	잠 복 기	<ul style="list-style-type: none">5~21일(평균 6~13일)	증상	<ul style="list-style-type: none">발열, 오한, 림프절 부종, 피로, 근육통 및 요통, 두통, 호흡기 증상(인후통, 코막힘, 기침 등) 등과 같은 증상이 나타나며, 보통 1~4일 후에 발진 증상이 나타남발진은 얼굴, 입, 손, 발, 가슴, 생식기 에서 나타남 (반점→구진→수포(물집)→농포(고름)→가피(딱지))로 진행되며 초통증과 가려움증 동반하기도 함	진 단	<ul style="list-style-type: none">검체(피부병변액, 피부병변조직, 가피, 구인두도말, 혈액 등)에서 검출	치 료	<ul style="list-style-type: none">대증치료필요시, 국가 비축 항바이러스제(테코비리마트) 치료 시행	환자 관리	<ul style="list-style-type: none">표준주의, 접촉주의, 비말주의 준수환자: 감염력이 소실될 때까지(피부병변의 가피가 탈락되고 새로운 피부형성) 1인실 격리 입원·치료의사환자: 1인실 격리병상 배정 후 검체 채취(검사결과 시까지 격리유지)	예 방	<ul style="list-style-type: none">예방접종 FDA(미국)과 EMA(유럽)에서 두창과 엡폭스 백신으로 3세대 백신을 승인한 바 있음예방을 위한 주의사항<ul style="list-style-type: none">① 감염된(감염의 위험이 있는) 사람 또는 동물과의 직·간접적 접촉 피하기② 감염된 환자가 사용한 물품(린넨과 같은 침구류 등)과의 접촉 피하기③ 의심되는 사람, 동물 또는 물건과 접촉을 한 경우, 비누와 물로 손을 씻거나 알코올 성분의 손 소독제를 이용하여 깨끗이 하기④ 엡폭스 발생국(장소)을 여행하는 경우, 바이러스를 보유할 수 있는 동물과의 접촉 피하기	
구 분	내 용																								
정의	원숭이두창 바이러스(Monkeypox virus) 감염에 의한 급성 발열 발진성 질환																								
발생현황	<ul style="list-style-type: none">제2급감염병2022년 6월 국내 첫 확진 사례가 보고됨																								
병원체	<ul style="list-style-type: none">원숭이두창 바이러스(Monkeypox virus)																								
감염경로	<ul style="list-style-type: none">원숭이두창 바이러스에 감염된 동물(쥐, 다람쥐, 프레리도그와 같은 설치류 및 원숭이 등) (피부병변 부산물) 감염된 동물·사람의 혈액, 체액, 피-부 직·간접 접촉 (매개물) 감염 환자의 체액, 병변이 묻은 매개체 접촉을 통한 전파 (비말) 코, 구강, 인두, 점막 있는 감염 비말에 의한 사람 간 직접 전파																								
잠 복 기	<ul style="list-style-type: none">5~21일(평균 6~13일)																								
증상	<ul style="list-style-type: none">발열, 오한, 림프절 부종, 피로, 근육통 및 요통, 두통, 호흡기 증상(인후통, 코막힘, 기침 등) 등과 같은 증상이 나타나며, 보통 1~4일 후에 발진 증상이 나타남발진은 얼굴, 입, 손, 발, 가슴, 생식기 에서 나타남 (반점→구진→수포(물집)→농포(고름)→가피(딱지))로 진행되며 초통증과 가려움증 동반하기도 함																								
진 단	<ul style="list-style-type: none">검체(피부병변액, 피부병변조직, 가피, 구인두도말, 혈액 등)에서 검출																								
치 료	<ul style="list-style-type: none">대증치료필요시, 국가 비축 항바이러스제(테코비리마트) 치료 시행																								
환자 관리	<ul style="list-style-type: none">표준주의, 접촉주의, 비말주의 준수환자: 감염력이 소실될 때까지(피부병변의 가피가 탈락되고 새로운 피부형성) 1인실 격리 입원·치료의사환자: 1인실 격리병상 배정 후 검체 채취(검사결과 시까지 격리유지)																								
예 방	<ul style="list-style-type: none">예방접종 FDA(미국)과 EMA(유럽)에서 두창과 엡폭스 백신으로 3세대 백신을 승인한 바 있음예방을 위한 주의사항<ul style="list-style-type: none">① 감염된(감염의 위험이 있는) 사람 또는 동물과의 직·간접적 접촉 피하기② 감염된 환자가 사용한 물품(린넨과 같은 침구류 등)과의 접촉 피하기③ 의심되는 사람, 동물 또는 물건과 접촉을 한 경우, 비누와 물로 손을 씻거나 알코올 성분의 손 소독제를 이용하여 깨끗이 하기④ 엡폭스 발생국(장소)을 여행하는 경우, 바이러스를 보유할 수 있는 동물과의 접촉 피하기																								

2023. 2. 22.

질병관리청

엡폭스

예방및행동수칙

대국민용



엡폭스 예방수칙

- ✓ **손 씻기 등 개인적인 위생 수칙 준수**
* 의심증상자 접촉 후 비누와 물 사용 손씻기 또는 알코올 성분 손 소독제 사용
- ✓ **오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가**
- ✓ **엡폭스 의심증상자 피부병변(발진이나 딱지 등) 접촉 삼가**
- ✓ **엡폭스 의심증상자 사용 물품(침구류, 수건, 의복, 세면대 등)접촉 삼가**
- ✓ **엡폭스 의심증상자와 부득이한 접촉 시 적절한 개인보호구 착용**
- ✓ **아프거나 죽은 동물과의 직접 접촉 및 사용 물품 주의**
- ✓ **아프리카 수입 야생동물 및 반려동물 접촉 주의**



엡폭스 의심증상(발진 등) 발생 시 행동요령

- ✓ **실거주지 관할 보건소로 즉시 신고하여 방역 당국의 조치사항 안내에 따름**
- ✓ **엡폭스 진단 전까지 동거인을 비롯한 주위사람들과의 접촉 삼가**
* 침구, 식기, 컵 등 물품을 별도로 사용하고 가능하면 생활공간을 분리
- ✓ **철저한 손위생 및 가족, 동거인 등 보호하기 위해 개인보호구 사용**
* 피부병변을 긴 소매 및 바지 등으로 감싸 노출 최소화, 마스크 착용, 일회용 장갑 등
- ✓ **의심증상자의 쓰레기 및 침구는 별도로 분리하여 관리**
* 확진되면 쓰레기는 폐기물로 별도 분리 배출하고 침구도 별도 세탁 시행
- ✓ **애완동물을 포함한 기타 동물과의 접촉 삼가**

2023. 4. 17

한국전통문화고등학교장 송택상 드림