





## 성홍열 예방 안내

교무실 535-2983  
행정실 535-2973  
<http://kyoam.es.kr>

안녕하세요?

학부모님 가정에 건강과 행운이 함께하기를 기원합니다.

최근 전국적으로 성홍열 환자가 증가하고 있어 안내드리니 손씻기, 기침예절 지키기 등 예방수칙을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다.

병원체	<ul style="list-style-type: none"> <li>A군 베타용혈성 연쇄구균</li> </ul>
전파 경로	<ul style="list-style-type: none"> <li>환자와 보균자의 <u>호흡기 분비물과 직접 접촉</u></li> <li>환자와 보균자의 <u>호흡기 분비물과 손이나 물건을 통한 간접 접촉</u></li> </ul>
호발대상	<ul style="list-style-type: none"> <li>5~15세에 주로 발생</li> </ul>
잠복기	<ul style="list-style-type: none"> <li>1~7일, 평균 2~5일</li> </ul>
주요증상	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>인후통에 동반되는 갑작스런 발열, 두통, 식욕부진, 구토, 인두염, 복통 등</b></li> <li><b>발진:</b> 1~2일 후 작은 좁쌀 크기로 입주위 및 손발바닥을 제외한 전신에 나타나지만 발진은 병의 첫 징후로 나타나기도 함. 발진은 3~4일 후 사라지기 시작하며 간혹 손톱 끝, 손바닥, 발바닥 주위로 피부 껍질이 벗겨지기도 함.</li> <li><b>붉은 얼굴:</b> 얼굴은 홍조가 나타나나 입 주위는 창백</li> <li><b>혀:</b> 처음에는 회백색이 덮이고 돌기가 현저히 두드러지는 모양에 발병 후 2~3일 지나면 붉은색을 띠고 돌기가 붉은 딸기 모양으로 새빨간 혀가 됨</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>초기, 회백색으로 덮인 돌기가 두드러진 흰 딸기혀</span> <span>이후, 붉고, 돌기가 붉은 딸기혀</span> </p>
예방수칙	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>올바른 손씻기:</b> 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기</li> <li><b>기침 예절:</b> 기침이나 재채기는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코 가리고 하기</li> <li><b>발열 및 호흡기 증상이 있으면 마스크 쓰기</b></li> <li><b>수건, 물컵, 식기구 등 개인용품 공유하지 않기</b></li> <li><b>예방 백신 없음.</b></li> </ul>
성홍열이 의심될 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>의심증상이 있는 경우 빠른 시일 내에 의료기관에서 진료를 받습니다.</li> <li>성홍열로 진단을 받으면 담임교사에게 알립니다.</li> <li>환자의 빠른 회복과 학교에서의 집단발병을 예방하기 위해 <b>항생제 치료 시작 후 최소 24시간까지</b> 등교하지 않습니다.</li> </ul>
등교중지 시 출석인정	<ul style="list-style-type: none"> <li>등교중지 기간은 의사의 소견에 따릅니다.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>항생제 치료 시작 후 최소 24시간까지</li> </ul> </li> <li>등교 시 <b>의사소견서 또는 진료 확인서 또는 진단서 중 1가지를</b> 제출하면 출석으로 인정됩니다</li> </ul>

2025. 6. 11.  
교암초등학교장