



백일해 유행 및 예방

발행처 군산미장초등학교

담당자 교사 최영옥

군산미장초등학교를 사랑해 주시는 학부모 여러분 안녕하십니까?

최근 일부 시·도에서 백일해의 집단 감염이 발생하고 있는 바, (전북 9명/전국480명. 2018.8.12. 기준, 의사환자 포함) 개학을 맞이하여 백일해에 대한 정보 및 예방에 대해 안내하니 건강관리에 도움이 되시기 바랍니다.

1. 백일해란?

백일해는 보르데텔라(*Bordetella pertussis*)라 불리는 균에 의해 발생하는 호흡기 질환으로 백일해가 가지고 있는 독소(pertussis toxin) 등이 기도 내 염증과 심한 기침을 유발하여 가족 내 2차 발병률이 80%에 달하는 전염력이 높은 질환입니다. 환자와의 직접적인 접촉, 기침, 재채기 등에 의한 호흡기 전파에 의해 감염됩니다. (제 2군 법정감염병, 등교중지 대상)

2. 백일해의 임상적 특성은 어떤가요?

잠복기는 일반적으로 7-10(4-21)일이며, 초기에는 콧물, 결막염, 눈물, 경미한 기침, 발열 등의 가벼운 상기도 감염 증세가 나타나다가 기침이 점차 심해져 기침 끝에 '윽' 하는 소리를 들을 수 있습니다. 또한 기침이 심해지면서 얼굴이 빨개지고 눈이 충혈되며, 기침 끝에 구토가 동반되고, 끈끈한 가래가 나오기도 합니다. 회복기에 들어서면서 기침의 정도와 횟수 및 구토가 점차 감소합니다. 증상발생 시 마스크를 착용하고 의료기관에 바로 방문해 주세요.

3. 백일해 치료는 어떻게 하나요?

대증적 치료와 임상적으로 백일해가 의심되면 항생제 요법을 실시합니다.

4. 백일해 예방접종은 언제 해야 하나요?


모든 영유아는 예방접종 대상자이며, 표준접종시기는 아래와 같습니다.

구 분		표준접종시기	백일해 포함 백신
기초접종	1차	생후 2개월	DTaP (DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib)
	2차	생후 4개월	DTaP (DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib)
	3차	생후 6개월	DTaP (DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib)
추가접종	4차	생후 15~18개월	DTaP
	5차	만 4~6세	DTaP (DTaP-IPV)
	6차	만 11~12세	Tdap 혹은 Td
	7차 이후	매 10년마다	Tdap 혹은 Td


⇒뒷면을 보세요.(기침예절 및 손씻기 안내)

기침 예절 및 손씻기 포스터

기침할 때 옷소매로 입과 코를 가리고!





[올바른 기침예절]



흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기!

[올바른 손씻기 6단계]



보통물 2018.3.21

2018.8.24.

군산미장초등학교장