

수능특강 수학영역 미적분

정답과 풀이

한눈에 보는 정답

▶▶ 수능특강 수학영역 미적분

01 수열의 극한

유제

본문 5~9쪽

- 1 ④ 2 ③ 3 ④ 4 ② 5 ①
6 ④

Level 1 기초 연습

본문 10~11쪽

- 1 ② 2 ⑤ 3 ③ 4 ② 5 ③
6 ② 7 ③ 8 ④

Level 2 기본 연습

본문 12~13쪽

- 1 ② 2 ② 3 ① 4 ⑤ 5 ④
6 ① 7 ④ 8 ⑤

Level 3 실력 완성

본문 14쪽

- 1 ③ 2 ③ 3 17

02 급수

유제

본문 17~21쪽

- 1 ① 2 ③ 3 ③ 4 16 5 ④
6 ①

Level 1 기초 연습

본문 22쪽

- 1 ③ 2 ⑤ 3 ④ 4 ②

Level 2 기본 연습

본문 23~24쪽

- 1 ④ 2 ④ 3 ④ 4 ① 5 ③
6 ⑤ 7 ①

Level 3 실력 완성

본문 25~26쪽

- 1 ③ 2 ⑤ 3 ② 4 ①

03 여러 가지 함수의 미분

유제

본문 29~37쪽

- 1 ⑤ 2 ⑤ 3 ③ 4 ⑤ 5 ④
6 ④ 7 4 8 ② 9 ⑤ 10 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 38~39쪽

- 1 ③ 2 ① 3 20 4 ③ 5 ②
6 ④ 7 ② 8 ① 9 ② 10 ②

Level 2 기본 연습

본문 40~41쪽

- 1 ④ 2 24 3 ③ 4 ③ 5 3
6 ① 7 ③ 8 ④

Level 3 실력 완성

본문 42쪽

- 1 ④ 2 11 3 ②

04 여러 가지 미분법

유제

본문 45~53쪽

- 1 ③ 2 ② 3 ③ 4 ③ 5 15
6 ④ 7 ③ 8 ② 9 ⑤ 10 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 54~55쪽

- 1 ③ 2 ③ 3 ⑤ 4 ③ 5 ②
6 ⑤ 7 ① 8 ① 9 ⑤

Level 2 기본 연습 본문 56~57쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ② | 2 ③ | 3 ① | 4 ⑤ | 5 ① |
| 6 ③ | 7 ② | 8 ③ | | |

Level 3 실력 완성 본문 58쪽

| | | |
|-----|------|-----|
| 1 ⑤ | 2 12 | 3 ⑤ |
|-----|------|-----|

05 도함수의 활용

유제 본문 61~69쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 ⑤ | 2 ⑤ | 3 ⑤ | 4 8 | 5 10 |
| 6 ③ | 7 7 | 8 ⑤ | 9 ④ | |

Level 1 기초 연습 본문 70~71쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ② | 2 ② | 3 ① | 4 ⑤ | 5 ② |
| 6 ② | 7 ② | 8 ④ | 9 ④ | |

Level 2 기본 연습 본문 72~73쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ② | 2 ② | 3 ④ | 4 ④ | 5 ③ |
| 6 ③ | 7 ② | 8 ⑤ | | |

Level 3 실력 완성 본문 74쪽

| | | |
|-----|------|-----|
| 1 ④ | 2 41 | 3 ② |
|-----|------|-----|

06 여러 가지 적분법

유제 본문 77~81쪽

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 1 ① | 2 ③ | 3 ③ | 4 ② | 5 ① |
| 6 14 | | | | |

Level 1 기초 연습 본문 82~83쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ③ | 2 ⑤ | 3 ⑤ | 4 ② | 5 ④ |
| 6 ① | 7 ③ | 8 ④ | | |

Level 2 기본 연습 본문 84~85쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ② | 2 ④ | 3 ③ | 4 ④ | 5 ② |
| 6 ① | 7 ③ | | | |

Level 3 실력 완성 본문 86쪽

| | | |
|-----|------|-----|
| 1 ① | 2 24 | 3 ③ |
|-----|------|-----|

07 정적분의 활용

유제 본문 89~97쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 1 ④ | 2 ② | 3 ② | 4 ③ | 5 ④ |
| 6 ③ | 7 4 | 8 ① | 9 14 | |

Level 1 기초 연습 본문 98~99쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 1 ③ | 2 ① | 3 4 | 4 ② | 5 ① |
| 6 ① | 7 ③ | 8 ⑤ | 9 12 | |

Level 2 기본 연습 본문 100~101쪽

| | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 ⑤ | 2 ④ | 3 ③ | 4 ① | 5 ③ |
| 6 ④ | 7 19 | 8 ④ | | |

Level 3 실력 완성 본문 102쪽

| | | |
|-----|-----|-----|
| 1 ② | 2 ① | 3 ④ |
|-----|-----|-----|

정답과 풀이

01 수열의 극한

유제

본문 5~9쪽

- 1 ④ 2 ③ 3 ④ 4 ② 5 ①
6 ④

1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2a_n + 1} = 2$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n + 1}{3} = \frac{1}{2}$$

그러므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \left(\frac{2a_n + 1}{3} - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(4a_n + k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} (4a_n + k) \\ &= \frac{1}{4} \left(4 \times \frac{1}{4} + k \right) \\ &= \frac{1}{4} (1 + k) \end{aligned}$$

따라서 $\frac{1}{4}(1+k) = 1$ 에서

$$k = 3$$

답 ④

2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n + b_n} = -1$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{b_n}{a_n + b_n} \right) \\ &= 1 - (-1) = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{a_n + b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_n + b_n} - \frac{b_n}{a_n + b_n} \right) \\ &= 2 - (-1) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{a_n + b_n}{a_n - b_n} \times (a_n - b_n) \right\} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \{ (a_n + b_n) + (a_n - b_n) \} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} + \frac{9}{4} \right) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

답 ③

참고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + b_n} = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \frac{3}{4} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{a_n}{a_n + b_n} \times (a_n + b_n) \right\} \\ &= 2 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{bn + 3} = \frac{1}{2}$ 에서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{bn + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{b + \frac{3}{n}} = \frac{a}{b + 0} = \frac{a}{b} \text{이므로}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2} \text{에서 } b = 2a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a+b)n^2 + 3n}{n^2 + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a+b + \frac{3}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{a+b+0}{1+0} = a+b \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } a+b=2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a = \frac{2}{3}, b = \frac{4}{3}$$

따라서

$$ab = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{8}{9}$$

답 ④

4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2} + \sqrt{n}}{2(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1}{2\left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1\right)}$$

$$= \frac{1+1}{2(1+1)} = \frac{1}{2}$$

답 ②

5 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \times 3^{n+1} + 4^{-n}}{3^{n-1} + (-2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a \times 3^n + \left(\frac{1}{4}\right)^n}{\frac{1}{3} \times 3^n + (-2)^n}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a + \left(\frac{1}{12}\right)^n}{\frac{1}{3} + \left(-\frac{2}{3}\right)^n} \\ &= \frac{3a + 0}{\frac{1}{3} + 0} = 9a \end{aligned}$$

따라서 $9a = \frac{3}{4}$ 에서

$$a = \frac{1}{12}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 6 \quad a_n &= \overline{OA_n} \\ &= \sqrt{(2^n)^2 + (3^{n-1})^2} \\ &= \sqrt{4^n + 9^{n-1}} \\ b_n &= \overline{A_n A_{n+1}} \\ &= \sqrt{(2^{n+1} - 2^n)^2 + (3^n - 3^{n-1})^2} \\ &= \sqrt{4^n + 4 \times 9^{n-1}} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n + 4 \times 9^{n-1}}{4^n + 9^{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \times \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} + 4}{4 \times \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} + 1} \\ &= \frac{0 + 4}{0 + 1} = 4 \end{aligned}$$

답 ④

Level 1 기초 연습

본문 10~11쪽

- 1 ② 2 ⑤ 3 ③ 4 ② 5 ③
6 ② 7 ③ 8 ④

$$\begin{aligned} 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (3a_n - 2) &= 4 \text{이므로} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \{(3a_n - 2) + 2\} \\ &= \frac{1}{3}(4 + 2) = 2 \\ \text{따라서} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(a_n + 2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2) \\ &= 2 \times (2 + 2) = 8 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= 4, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = -2 \text{이므로} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \{(a_n)^2 + (b_n)^2\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{(a_n + b_n)^2 - 2a_n b_n\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \times \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) - 2 \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n \\ &= 4 \times 4 - 2 \times (-2) = 20 \\ \text{따라서} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_n}{a_n} + \frac{a_n}{b_n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n)^2 + (b_n)^2}{a_n b_n} = \frac{20}{-2} = -10 \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned} 3 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{3n + \sqrt{4n^2 + 2n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{n}}{3 + \sqrt{4 + \frac{2}{n}}} \\ &= \frac{2-0}{3+2} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned} 4 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 4n} - \sqrt{n^2 + 1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 4n} + \sqrt{n^2 + 1}}{(n^2 + 4n) - (n^2 + 1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 4n} + \sqrt{n^2 + 1}}{4n - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{4}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}}{4 - \frac{1}{n}} \\ &= \frac{1+1}{4-0} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned} 5 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{2n+5} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2 + \frac{5}{n}} \\ &= \frac{a}{2+0} = \frac{a}{2} \\ \text{이므로 } \frac{a}{2} &= \frac{3}{8} \text{에서 } a = \frac{3}{4} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b \times 3^{n+1}}{3^n + 2^n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3b}{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} \\ &= \frac{3b}{1+0} = 3b \\ \text{이므로 } 3b &= \frac{3}{4} \text{에서 } b = \frac{1}{4} \\ \text{따라서} \\ a + b &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \end{aligned}$$

답 ③

정답과 풀이

6 모든 자연수 n 에 대하여 $2n-1 > 0$ 이므로 부등식

$$n+2 < a_n < n+3$$

의 각 변을 $2n-1$ 로 나누면

$$\frac{n+2}{2n-1} < \frac{a_n}{2n-1} < \frac{n+3}{2n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{2}{n}}{2-\frac{1}{n}} = \frac{1+0}{2-0} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{3}{n}}{2-\frac{1}{n}} = \frac{1+0}{2-0} = \frac{1}{2}$$

그러므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{2n-1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{a_n}{2n-1} = b_n \text{으로 놓으면 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2} \text{이고,}$$

$$\frac{a_{n+1}}{2n+1} = b_{n+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{(2n-1)(2n+1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n b_{n+1} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 ②

$$7 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{4 \times \left(\frac{1}{6}\right)^n + 3 \times \left(\frac{1}{9}\right)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{6}\right)^n}{4 \times \left(\frac{1}{6}\right)^n + 3 \times \left(\frac{1}{9}\right)^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{6}\right)^n \times 6^n}{4 \times \left(\frac{1}{6}\right)^n \times 6^n + 3 \times \left(\frac{1}{9}\right)^n \times 6^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{3}}{4 + 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

$$= \frac{\frac{2}{3}}{4+0} = \frac{1}{6}$$

답 ③

8 등비수열 $\{r^n\}$ 이 수렴하려면 $-1 < r \leq 1$ 이어야 하므로

$$\text{수열 } \left\{ \left(\frac{x^2+x+2}{8} \right)^n \right\} \text{이 수렴하려면}$$

$$-1 < \frac{x^2+x+2}{8} \leq 1$$

이어야 한다. 이때

$$x^2+x+2 = \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} > 0$$

이므로 $\frac{x^2+x+2}{8} \leq 1$ 이면 수열 $\left\{ \left(\frac{x^2+x+2}{8} \right)^n \right\}$ 은 수렴한다.

$$x^2+x+2 \leq 8 \text{에서}$$

$$x^2+x-6 \leq 0, (x+3)(x-2) \leq 0$$

$$-3 \leq x \leq 2$$

따라서 수열 $\left\{ \left(\frac{x^2+x+2}{8} \right)^n \right\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의

값은 $-3, -2, -1, 0, 1, 2$ 이고, 그 개수는 6이다.

답 ④

Level 2 기본 연습

본문 12~13쪽

1 ②

2 ②

3 ①

4 ⑤

5 ④

6 ①

7 ④

8 ⑤

$$\begin{aligned} 1 \quad a_n &= n^{p-10} \left(n^2 + \frac{1}{n} \right)^2 \\ &= n^{p-10} \left(n^4 + 2n + \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{n^{10-p}} \times \frac{n^6 + 2n^3 + 1}{n^2} \\ &= \frac{n^6 + 2n^3 + 1}{n^{12-p}} \end{aligned}$$

이므로

$$12-p < 6 \text{이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

$$12-p = 6 \text{이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

$$12-p > 6 \text{이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하려면 $12-p \geq 6$, 즉 $p \leq 6$ 이므로 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하도록 하는 자연수 p 의 값은 1, 2, 3, 4, 5, 6이고, 그 합은 21이다.

답 ②

$$2 \quad \frac{3-a_n}{a_n+2} = b_n \text{으로 놓으면 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{2}{3} \text{이고,}$$

$$3-a_n = b_n(a_n+2) \text{에서}$$

$$(b_n+1)a_n = 3-2b_n \quad \dots\dots ㉠$$

이때 $b_n = -1$ 이면

$$0 \times a_n = 3-2, \text{ 즉 } 0=5 \text{가 되어 모순이다.}$$

그러므로 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \neq -1$ 이고 ㉠에서

$$a_n = \frac{3-2b_n}{b_n+1}$$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-2b_n}{b_n+1} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (3-2b_n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n+1)} \\ &= \frac{3-2 \times \frac{2}{3}}{\frac{2}{3}+1} = 1\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n+2)(3-a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n+2) \times \lim_{n \rightarrow \infty} (3-a_n) \\ &= (1+2) \times (3-1) \\ &= 6\end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned}3 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} nb_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ (2n+1)b_n \times \frac{n}{2n+1} \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)b_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} \\ &= 8 \times \frac{1}{2} = 4\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} na_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{n(a_n+b_n) - nb_n\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n+b_n) - \lim_{n \rightarrow \infty} nb_n \\ &= 3-4 = -1\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (4n-1)a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(na_n \times \frac{4n-1}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} na_n \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-1}{n} \\ &= -1 \times 4 = -4\end{aligned}$$

답 ①

$$4 \quad x_n = \frac{3 \times 3a_{n+1} - 1 \times 2a_n}{3-1} = \frac{9}{2}a_{n+1} - a_n$$

이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ (α 는 상수)로 놓으면

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} &= \alpha \text{ 이므로} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{9}{2}a_{n+1} - a_n \right) \\ &= \frac{9}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= \frac{9}{2}\alpha - \alpha = \frac{7}{2}\alpha\end{aligned}$$

따라서 $\frac{7}{2}\alpha = \frac{7}{8}$ 에서 $\alpha = \frac{1}{4}$

즉, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{4}$

답 ⑤

$$\begin{aligned}5 \quad & \sqrt{n^2+2n} + \sqrt{4n^2+an} - 3n \\ &= (\sqrt{n^2+2n}-n) + (\sqrt{4n^2+an}-2n) \\ & \text{이고} \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+2n}-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+2n}+n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1} \\ &= \frac{2}{1+1} = 1 \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2+an}-2n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an}{\sqrt{4n^2+an}+2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\sqrt{4+\frac{a}{n}}+2} \\ &= \frac{a}{2+2} = \frac{a}{4}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+2n} + \sqrt{4n^2+an} - 3n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{ (\sqrt{n^2+2n}-n) + (\sqrt{4n^2+an}-2n) \} \\ &= 1 + \frac{a}{4}\end{aligned}$$

$1 + \frac{a}{4} = \frac{7}{6}$ 에서 $\frac{a}{4} = \frac{1}{6}$

따라서 $a = \frac{2}{3}$

답 ④

6 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d ($d \neq 0$)이라 하면

$$a_{n+1} = 1 + nd, \quad a_{2n+1} = 1 + 2nd$$

$$S_n = \frac{n\{2 + (n-1)d\}}{2} = \frac{dn^2 + (2-d)n}{2}$$

이므로

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{a_{n+1}a_{2n+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{dn^2 + (2-d)n}{2(dn+1)(2dn+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d + \frac{2-d}{n}}{2\left(d + \frac{1}{n}\right)\left(2d + \frac{1}{n}\right)} \\ &= \frac{d+0}{2(d+0)(2d+0)} = \frac{1}{4d}\end{aligned}$$

$\frac{1}{4d} = \frac{1}{2}$ 에서 $d = \frac{1}{2}$

따라서

$$a_5 = 1 + 4d = 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 3$$

답 ①

정답과 풀이

$$7 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n \times r^{n+1}}{2^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r \times \left(\frac{3r}{2}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{2}{3} \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ r \times \left(\frac{3r}{2}\right)^n \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{r \times \left(\frac{3r}{2}\right)^n}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n} \times \left\{ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} \right]$$

$$= \frac{2}{3} \times (1+0) = \frac{2}{3}$$

등비수열 $\left\{ \left(\frac{3r}{2}\right)^n \right\}$ 이 0이 아닌 수 α 에 수렴하면 $\alpha=1$ 이고
공비는 1이다.

$$\text{그러므로 } \frac{3r}{2}=1 \text{에서 } r=\frac{2}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \{(r^n + s^n) - r^n\}$$

$$= 1 - 0 = 1$$

따라서 $s=1$ 이므로

$$r+s=\frac{2}{3}+1=\frac{5}{3}$$

답 ④

참고

등비수열 $\{r^n\}$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n=0$ 또는 $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n=1$ 이고

① $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n=0$ 이면 $-1 < r < 1$ 이다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n=1$ 이면 $r=1$ 이다.

$$8 \quad S_n = \frac{\frac{1}{4} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right\}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} = \frac{1}{2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}$ 이므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 6^{n+k}}{20 \times 4^n + 8 \times 6^n} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 6^{n+k}}{20 \times 4^n + 8 \times 6^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 6^k}{20 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 8}$$

$$= \frac{0 + 6^k}{0 + 8} = \frac{6^k}{8}$$

$$\frac{6^k}{8} = \frac{1}{2} \text{에서 } 6^k = 4$$

따라서

$$k = \log_6 4 = 2 \log_6 2$$

답 ⑤

Level 3 실력 완성

본문 14쪽

1 ③ 2 ③ 3 17

1 $f(0)=0$ 이므로

$f(x)=px^2+qx$ ($p \neq 0$, p, q 는 상수)로 놓으면

$$a_n = f(2n) = 4pn^2 + 2qn$$

$$b_n = n^3 f\left(\frac{1}{n}\right) = n^3 \left(\frac{p}{n^2} + \frac{q}{n}\right) = qn^2 + pn$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{7n + 4}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4pn^2 + 2qn) + (qn^2 + pn)}{7n + 4}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4p+q)n^2 + (p+2q)n}{7n + 4}$$

에서

$$4p+q > 0 \text{이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{7n + 4} = \infty$$

$$4p+q < 0 \text{ 이면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{7n + 4} = -\infty$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{7n + 4} = 2$ 이려면 $4p+q=0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } q = -4p \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n}{7n + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(p+2q)n}{7n + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p+2q}{7 + \frac{4}{n}}$$

$$= \frac{p+2q}{7+0} = \frac{p-8p}{7}$$

$$= -p$$

이므로 $-p=2$ 에서 $p=-2$

$p=-2$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $q=8$

따라서 $f(x)=-2x^2+8x$ 이므로

$$f(1)=6$$

답 ③

2 조건 (가)에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} p^n=0$ 이므로 $0 < p < 1$ 이다.

(i) $0 < p < \frac{1}{2}$ 일 때

$$\frac{1}{2} < 1-p < 1 \text{이므로}$$

$$0 < \frac{p}{1-p} < 1, 0 < \frac{1}{2(1-p)} < 1, 0 < \frac{1}{4(1-p)} < 1$$

그러므로 조건 (나)에서 좌변의 분모, 분자를 $(1-p)^n$

으로 나누면

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^n + 4(1-p)^{n+1} + \left(\frac{1}{4}\right)^n}{2p^{n+1} + 5(1-p)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{p}{1-p}\right)^n + 4(1-p) + \left\{\frac{1}{4(1-p)}\right\}^n}{2p\left(\frac{p}{1-p}\right)^n + 5 + \left\{\frac{1}{2(1-p)}\right\}^n} \\ &= \frac{0 + 4(1-p) + 0}{0 + 5 + 0} \\ &= \frac{4}{5}(1-p) \\ \frac{4}{5}(1-p) &= \frac{2}{3} \text{에서 } 1-p = \frac{5}{6} \\ \text{따라서 } p &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

(ii) $p = \frac{1}{2}$ 일 때

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^n + 4(1-p)^{n+1} + \left(\frac{1}{4}\right)^n}{2p^{n+1} + 5(1-p)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \left(\frac{1}{4}\right)^n}{2\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 5\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{4}\right)^n}{7\left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{3}{7} + \frac{1}{7}\left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} \\ &= \frac{3}{7} + 0 = \frac{3}{7} \end{aligned}$$

이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $\frac{1}{2} < p < 1$ 일 때

$$0 < 1-p < \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$0 < \frac{1-p}{p} < 1, 0 < \frac{1}{2p} < 1, 0 < \frac{1}{4p} < 1$$

그러므로 조건 (나)에서 좌변의 분모, 분자를 p^n 으로 나누면

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^n + 4(1-p)^{n+1} + \left(\frac{1}{4}\right)^n}{2p^{n+1} + 5(1-p)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 4(1-p)\left(\frac{1-p}{p}\right)^n + \left(\frac{1}{4p}\right)^n}{2p + 5\left(\frac{1-p}{p}\right)^n + \left(\frac{1}{2p}\right)^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1+0+0}{2p+0+0} \\ &= \frac{1}{2p} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2p} = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } p = \frac{3}{4}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 두 조건 (가), (나)를 만족시키는 실수

p 의 값은 $\frac{1}{6}, \frac{3}{4}$ 이므로 모든 p 의 값의 합은

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{11}{12}$$

답 ③

3 삼각형 $A_n B_n C_n$ 은 $\angle C_n = 90^\circ$ 인 직각삼각형이므로

$$\overline{A_n C_n} = \sqrt{(2n)^2 - (\sqrt{3n-1})^2} = \sqrt{4n^2 - 3n + 1}$$

두 직각삼각형 $B_n C_n H_n$, $B_n A_n C_n$ 이 서로 닮음이므로

$$\overline{B_n H_n} : \overline{B_n C_n} = \overline{B_n C_n} : \overline{B_n A_n} \text{에서}$$

$$\overline{B_n H_n} = \frac{\overline{B_n C_n}^2}{\overline{B_n A_n}} = \frac{3n-1}{2n}$$

$$\overline{A_n D_n} = \overline{A_n C_n} = \sqrt{4n^2 - 3n + 1}$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{B_n D_n} &= \overline{A_n B_n} - \overline{A_n D_n} \\ &= 2n - \sqrt{4n^2 - 3n + 1} \end{aligned}$$

그러므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\overline{B_n D_n} \times \overline{B_n H_n})$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ (2n - \sqrt{4n^2 - 3n + 1}) \times \frac{3n-1}{2n} \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - \sqrt{4n^2 - 3n + 1}) \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{2n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{2n + \sqrt{4n^2 - 3n + 1}} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{2n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{2 + \sqrt{4 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{1}{n}}{2}$$

$$= \frac{3-0}{2+2} \times \frac{3-0}{2}$$

$$= \frac{3}{4} \times \frac{3}{2}$$

$$= \frac{9}{8}$$

따라서 $p=8$, $q=9$ 이므로

$$p+q=17$$

답 17

정답과 풀이

02 급수

유제

본문 17~21쪽

- 1 ① 2 ③ 3 ③ 4 16 5 ④
6 ①

1 $a_n = \frac{3n}{2n+1}$ 에서 $a_1=1$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) \\ &= (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + (a_4 - a_3) + \cdots + (a_{n+1} - a_n) \\ &= a_{n+1} - a_1 \\ &= \frac{3n+3}{2n+3} - 1 \\ &= \frac{n}{2n+3} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 + \frac{3}{n}} = \frac{1}{2+0} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 ①

2 $a_1 = S_1 = \frac{a+b}{4} = 1$ 이므로

$$a+b=4 \quad \text{..... ㉠}$$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 제 n 항까지의 부분합이 S_n 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an+b}{3n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{n}}{3 + \frac{1}{n}} = \frac{a+0}{3+0} = \frac{a}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{a}{3} = 2 \text{에서 } a=6$$

$$\text{㉠에서 } b=4-a=4-6=-2 \text{이므로}$$

$$S_n = \frac{6n-2}{3n+1}$$

따라서

$$a_2 = S_2 - S_1 = \frac{10}{7} - 1 = \frac{3}{7}$$

답 ③

3 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(na_n \times \frac{1}{n^2} \right) = 0$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+1)a_n+3n}{3n+\sqrt{4n^2+9n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n + \frac{a_n}{n} + 3}{3 + \sqrt{4 + \frac{9}{n}}} \\ &= \frac{0+0+3}{3+2} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

답 ③

4 모든 자연수 n 에 대하여 $b_{2n-1} = b_{2n}$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_{2n-1}) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_{2n}) = 4$$

그러므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \{ (a_n + b_{2n}) - b_{2n} \} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_{2n}) - \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} \\ &= 4 - 1 = 3 \end{aligned}$$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = p \text{이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = p \text{이다.}$$

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (b_{2k-1} + b_{2k}) = \sum_{k=1}^{2n} 2b_{2k} \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n b_{2k} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} = 2 \times 1 = 2$$

$$\text{그러므로 } p=2, \text{ 즉 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = 2$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (4a_n + pb_n) &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} a_n + 2 \sum_{n=1}^{\infty} b_n \\ &= 4 \times 3 + 2 \times 2 = 16 \end{aligned}$$

답 16

참고

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} = 1 \text{에서 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - b_{2n}) = 2 - 0 = 2$$

5 $a_1 = S_1 = 2 - 4 = -2$

$n \geq 2$ 일 때,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (2^{2-n} - 4) - (2^{3-n} - 4) = -2^{2-n}$$

$$a_1 = -2^{2-1} = -2 \text{이므로}$$

$$a_n = -2^{2-n} = -2 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

즉, 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 -2 이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열이다.

수열 $\{a_n a_{n+1}\}$ 에서

$$a_1 a_2 = -2 \times (-1) = 2$$

$$\frac{a_{n+1} a_{n+2}}{a_n a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \times \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

이므로 수열 $\{a_n a_{n+1}\}$ 은 첫째항이 2 이고 공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비수열이다.

따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} = \frac{2}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{8}{3}$$

답 ④

6 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공비를 각각 r , s 라 하자.

두 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 모두 수렴하므로

$$-1 < r < 1, -1 < s < 1 \text{이다.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1-r} = 5 \text{에서 } 1-r = \frac{1}{5}, r = \frac{4}{5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{2}{1-s} = 4 \text{에서 } 1-s = \frac{1}{2}, s = \frac{1}{2}$$

이므로 수열 $\{a_n b_n\}$ 은 첫째항이

$$a_1 b_1 = 1 \times 2 = 2$$

이고, 공비가

$$rs = \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$$

인 등비수열이다.

따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{a_1 b_1}{1-rs} = \frac{2}{1-\frac{2}{5}} = \frac{10}{3}$$

답 ①

Level 1 기초 연습

본문 22쪽

1 ③ 2 ⑤ 3 ④ 4 ②

1 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots \\ &\quad + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n + \frac{1}{n(n+1)} \right\} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= 4 - 1 = 3 \end{aligned}$$

답 ③

2 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \frac{2n}{n+1} \right)$ 이 수렴하므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n - \frac{2n}{n+1} \right) = 0 \text{이다.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{2}{1+0} = 2$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(a_n - \frac{2n}{n+1} \right) + \frac{2n}{n+1} \right\} \\ &= 0 + 2 = 2 \end{aligned}$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n + 3n}{4n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 3}{4 - \frac{1}{n}} = \frac{2+3}{4-0} = \frac{5}{4}$$

답 ⑤

3 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n) = 12$, $\sum_{n=1}^{\infty} (2a_n - b_n) = 9$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5} \{ (a_n + 2b_n) + 2(2a_n - b_n) \} \\ &= \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + 2b_n) + \frac{2}{5} \sum_{n=1}^{\infty} (2a_n - b_n) \\ &= \frac{1}{5} \times 12 + \frac{2}{5} \times 9 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} b_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \{ 2a_n - (2a_n - b_n) \} \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} (2a_n - b_n) \\ &= 2 \times 6 - 9 = 3 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \\ &= 6 + 3 = 9 \end{aligned}$$

답 ④

4 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+a} + 3^{n-1}}{6^n}$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ 2^a \times \left(\frac{1}{3} \right)^n + \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\}$$

정답과 풀이

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[2^a \times \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] \\
 &= 2^a \times \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{1}{3} \times \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} \\
 &= 2^{a-1} + \frac{1}{3} \\
 &\text{이므로 } 2^{a-1} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \text{에서} \\
 &2^{a-1} = 2 \\
 &\text{따라서 } a = 2
 \end{aligned}$$

답 ②

Level 2 기본 연습

본문 23~24쪽

- 1 ④ 2 ④ 3 ④ 4 ① 5 ③
6 ⑤ 7 ①

1 $a_1 = b_1 = a$ 라 하면
 $a_n = a \times 2^{n-1}$, $b_n = a \times 3^{n-1}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 S_n &= \frac{3^n \times a \times 2^{n-1} + 2^n \times a \times 3^{n-1}}{6^{n+1} + 3^{n+1}} \\
 &= \frac{\frac{a}{2} \times 6^n + \frac{a}{3} \times 6^n}{6^{n+1} + 3^{n+1}} \\
 &= \frac{\frac{5}{6}a \times 6^n}{6^{n+1} + 3^{n+1}} \\
 \sum_{n=1}^{\infty} c_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{6}a \times 6^n}{6^{n+1} + 3^{n+1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{6}a}{6 + 3 \times \left(\frac{1}{2} \right)^n} \\
 &= \frac{\frac{5}{6}a}{6 + 0} \\
 &= \frac{5}{36}a
 \end{aligned}$$
 따라서 $\frac{5}{36}a = \frac{5}{9}$ 에서
 $a = 4$

답 ④

2 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right)$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right) \\
 &= -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) + \dots \\
 &\quad + (-1)^n \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \\
 &= -\frac{1}{2} + (-1)^n \frac{1}{n+2}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 r &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ -\frac{1}{2} + (-1)^n \frac{1}{n+2} \right\} \\
 &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} r^{n+1} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^{n+1} \\
 &= \frac{\frac{1}{4}}{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)} = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

답 ④

3 두 직선 $x - ay + 2a = 0$, $y = n + 2$ 가 만나는 점의 y 좌표는 $n + 2$ 이므로 x 좌표를 구하면

$$\begin{aligned}
 x - a(n+2) + 2a &= 0 \text{에서 } x = an \\
 \text{즉, } x_n &= an, y_n = n + 2 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n y_n}$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k y_k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{ak(k+2)} \\
 &= \frac{1}{2a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\
 &= \frac{1}{2a} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right. \\
 &\quad \left. + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{2a} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n y_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2a} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2a} \times \frac{3}{2}$$

$$= \frac{3}{4a}$$

따라서 $\frac{3}{4a} = \frac{1}{8}$ 에서
 $a = 6$

답 ④

4 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공비를 r 라 하면 $-1 < r < 1$ 이다.

수열 $\{a_n b_n\}$ 은 첫째항이 $a_1 b_1 = 8$, 공비가 r^2 인 등비수열이고 $r^2 < 1$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{a_1 b_1}{1 - r^2} = \frac{8}{1 - r^2} = 9 \text{에서}$$

$$1 - r^2 = \frac{8}{9}, r^2 = \frac{1}{9}$$

$$r = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } r = \frac{1}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1 - r} = 3 \text{에서}$$

$$a_1 = 3(1 - r)$$

$$r = -\frac{1}{3} \text{이면 } a_1 = 3\left(1 + \frac{1}{3}\right) = 4$$

$$a_1 b_1 = 8 \text{에서 } 4b_1 = 8, b_1 = 2$$

$$r = \frac{1}{3} \text{이면 } a_1 = 3\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2$$

$$a_1 b_1 = 8 \text{에서 } 2b_1 = 8, b_1 = 4$$

$$\text{그러므로 } (a_1)^2 + (b_1)^2 = 20$$

따라서 두 수열 $\{(a_n)^2\}$, $\{(b_n)^2\}$ 은 첫째항이 각각 $(a_1)^2$,

$(b_1)^2$ 이고 공비가 모두 $r^2 = \frac{1}{9}$ 인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \{(a_n)^2 + (b_n)^2\} = \frac{(a_1)^2}{1 - r^2} + \frac{(b_1)^2}{1 - r^2} = \frac{(a_1)^2 + (b_1)^2}{1 - r^2}$$

$$= \frac{20}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{45}{2}$$

답 ①

5 $(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(a^n)$

$$= \frac{1}{(a^n)^2} = \frac{1}{a^{2n}} = \left(\frac{1}{a^2}\right)^n$$

이므로 수열 $\{(f \circ g)(n)\}$ 은 첫째항이 $\frac{1}{a^2}$ 이고 공비가 $\frac{1}{a^2}$ 인 등비수열이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (f \circ g)(n) = \frac{9}{7} \text{이므로}$$

$$0 < \frac{1}{a^2} < 1, \text{ 즉 } a^2 > 1 \text{이고}$$

$$\frac{\frac{1}{a^2}}{1 - \frac{1}{a^2}} = \frac{9}{7} \text{에서 } \frac{1}{a^2 - 1} = \frac{9}{7}$$

$$a^2 - 1 = \frac{7}{9}, a^2 = \frac{16}{9}$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = \frac{4}{3}$$

$$(f \circ g)\left(\frac{n}{2}\right) = f\left(a^{\frac{n}{2}}\right) = \frac{1}{\left(a^{\frac{n}{2}}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

에서 수열 $\left\{(f \circ g)\left(\frac{n}{2}\right)\right\}$ 은 첫째항이 $\frac{3}{4}$ 이고 공비가 $\frac{3}{4}$ 인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} (f \circ g)\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 3$$

$$\text{즉, } b = 3$$

$$\text{따라서 } ab = \frac{4}{3} \times 3 = 4$$

답 ③

6 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \{(2a_n - b_n) + (a_n + b_n)\}$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (2a_n - b_n) + \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$$

$$= \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{3} \times 7 = 3$$

$$\text{이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1 - \frac{1}{2}} = 2a_1 = 3 \text{에서 } a_1 = \frac{3}{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \{(a_n + b_n) - a_n\}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) - \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$= 7 - 3 = 4$$

$$\text{이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{b_1}{1 - \frac{2}{3}} = 3b_1 = 4 \text{에서 } b_1 = \frac{4}{3}$$

따라서 수열 $\{(-1)^{n+1} a_n b_n\}$ 은 첫째항이

$$(-1)^2 \times a_1 b_1 = 1 \times \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = 2$$

이고, 공비가

$$-1 \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n b_n = \frac{2}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{3}{2}$$

답 ⑤

정답과 풀이

7 점 B_1 의 y 좌표는 $\frac{2}{3} \times 4 = \frac{8}{3}$ 이므로

$$\overline{A_1B_1} = 6 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$$

선분 A_1B_1 의 중점을 D_1 이라 하면

$$\overline{C_1D_1} = \frac{1}{2} \overline{A_1B_1} = \frac{5}{3} \text{이므로}$$

$$c_1 = 4 + \frac{5}{3} = \frac{17}{3}$$

점 A_2 의 x 좌표는 $\frac{3}{2}x = \frac{8}{3}$ 에서 $x = \frac{16}{9}$ 이므로

점 A_2 의 좌표는 $(\frac{16}{9}, \frac{8}{3})$ 이다.

점 B_2 의 y 좌표는 $\frac{2}{3} \times \frac{16}{9} = \frac{32}{27}$ 이므로

$$\overline{A_2B_2} = \frac{8}{3} - \frac{32}{27} = \frac{40}{27}$$

선분 A_2B_2 의 중점을 D_2 라 하면

$$\overline{C_2D_2} = \frac{1}{2} \overline{A_2B_2} = \frac{20}{27} \text{이므로}$$

$$c_2 = \frac{16}{9} + \frac{20}{27} = \frac{68}{27}$$

점 A_3 의 x 좌표는 $\frac{3}{2}x = \frac{32}{27}$ 에서 $x = \frac{64}{81}$ 이므로

점 A_3 의 좌표는 $(\frac{64}{81}, \frac{32}{27})$ 이다.

점 B_3 의 y 좌표는 $\frac{2}{3} \times \frac{64}{81} = \frac{128}{243}$ 이므로

$$\overline{A_3B_3} = \frac{32}{27} - \frac{128}{243} = \frac{160}{243}$$

선분 A_3B_3 의 중점을 D_3 이라 하면

$$\overline{C_3D_3} = \frac{1}{2} \overline{A_3B_3} = \frac{80}{243} \text{이므로}$$

$$c_3 = \frac{64}{81} + \frac{80}{243} = \frac{272}{243}$$

⋮

그러므로 수열 $\{c_n\}$ 은 $\frac{17}{3}, \frac{68}{27}, \frac{272}{243}, \dots$ 이고,

$$\frac{c_2}{c_1} = \frac{c_3}{c_2} = \dots = \frac{c_{n+1}}{c_n} = \dots = \frac{4}{9}$$

이다.

따라서 수열 $\{c_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{17}{3}$ 이고 공비가 $\frac{4}{9}$ 인 등비수열이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{\frac{17}{3}}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{51}{5}$$

참고

점 A_n 의 x 좌표를 a_n 이라 하면 점 A_n 의 y 좌표는 $\frac{3}{2}a_n$.

점 B_n 의 x 좌표는 a_n , 점 B_n 의 y 좌표는 $\frac{2}{3}a_n$.

점 A_{n+1} 의 x 좌표는 a_{n+1} , 점 A_{n+1} 의 y 좌표는 $\frac{2}{3}a_{n+1}$ 이므로

$$\frac{2}{3}a_n = \frac{3}{2}a_{n+1} \text{에서 } a_{n+1} = \frac{4}{9}a_n$$

즉, 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $a_1 = 4$ 이고 공비가 $\frac{4}{9}$ 인 등비수열이다.

선분 A_nB_n 의 중점을 D_n 이라 하면 삼각형 $A_nD_nC_n$ 이 직각 이등변삼각형이므로

$$\overline{C_nD_n} = \overline{A_nD_n} = \frac{1}{2} \overline{A_nB_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2}a_n - \frac{2}{3}a_n \right) = \frac{5}{12}a_n$$

따라서 점 C_n 의 x 좌표는

$$c_n = a_n + \overline{C_nD_n} = a_n + \frac{5}{12}a_n = \frac{17}{12}a_n$$

이므로 수열 $\{c_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{17}{12}a_1 = \frac{17}{3}$ 이고 공비가 $\frac{4}{9}$ 인 등비수열이다.

Level 3 실력 완성

본문 25~26쪽

1 ③ 2 ⑤ 3 ② 4 ①

$$1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+3} = a_5 + a_7 + a_9 + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p}{(2n+3)(2n+5)}$$

에서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+3}$ 의 제 n 항까지의 부분합을 S_n 이라 하면

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{p}{(2k+3)(2k+5)} \\ &= \frac{p}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k+3} - \frac{1}{2k+5} \right) \\ &= \frac{p}{2} \left[\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{9} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+5} \right) \right] \\ &= \frac{p}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2n+5} \right) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2n+5} \right) \\ &= \frac{p}{2} \left(\frac{1}{5} - 0 \right) = \frac{p}{10} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+4} = a_6 + a_8 + a_{10} + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-2n-4} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{4} \right)^n \right]$$

답 ①

에서 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+4}$ 는 첫째항이 $\frac{1}{64}$ 이고 공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비
급수이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+4} = \frac{\frac{1}{64}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{48}$$

급수 $\sum_{n=5}^{\infty} a_n$ 의 제 n 항까지의 부분합을 T_n 이라 하면

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (a_{2k+3} + a_{2k+4}) \\ &= \frac{p}{10} + \frac{1}{48} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (T_{2n} - a_{2n+4}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n} - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n+4} \\ &= \frac{p}{10} + \frac{1}{48} - 0 \\ &= \frac{p}{10} + \frac{1}{48} \end{aligned}$$

이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \frac{1}{12}$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_{2n-1} = \frac{1}{12}$ 이므로

$$\frac{p}{10} + \frac{1}{48} = \frac{1}{12}, \quad \frac{p}{10} = \frac{1}{16}$$

따라서 $p = \frac{5}{8}$

답 ③

2 조건 (가)에서

$$a_1 - a_2 < b_1$$

$$a_2 - a_3 < b_2$$

$$a_3 - a_4 < b_3$$

⋮

$$a_n - a_{n+1} < b_n$$

이므로 $\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) < \sum_{k=1}^n b_k$ 이다.

$$\begin{aligned} &\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) \\ &= (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_n - a_{n+1}) \\ &= a_1 - a_{n+1} \\ &= 2 - \frac{n+4}{3n+2} \\ &= \frac{5n}{3n+2} \end{aligned}$$

이고 $\sum_{k=1}^n b_k = T_n$ 이므로 $\frac{5n}{3n+2} < T_n$

그러므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n}{3n+2} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$$

이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n}{3n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{3 + \frac{2}{n}} = \frac{5}{3}.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = p$ 이므로

$$\frac{5}{3} \leq p \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = p$$

이므로 조건 (나)에서 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (T_n + T_{n+1}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{30n^2 + 52n + 15}{9n^2 + 15n + 4}$$

$$2p \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{30 + \frac{52}{n} + \frac{15}{n^2}}{9 + \frac{15}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{10}{3}$$

$$p \leq \frac{5}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

따라서 ㉠, ㉡에 의하여

$$p = \frac{5}{3}$$

답 ⑤

3 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n} - \frac{2n+3}{n+1} \right) = 1$ 이므로

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{n} - \frac{2n+3}{n+1} \right) = 0$ 이다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = 2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{a_n}{n} - \frac{2n+3}{n+1} \right) + \frac{2n+3}{n+1} \right\} \\ &= 0 + 2 = 2 \end{aligned}$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 p 라 하면 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = pn + q \quad (q \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다. 이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{pn+q}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(p + \frac{q}{n} \right) = p$$

이므로 $p = 2$ 이다.

그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n} - \frac{2n+3}{n+1} \right) = 1$ 에서

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+q}{n} - \frac{2n+3}{n+1} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(2 + \frac{q}{n} \right) - \left(2 + \frac{1}{n+1} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{q}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

이때 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{q}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{q-1}{n} \right)$ 이고

정답과 풀이

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q-1}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{q-1}{n} \right) - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \right\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{q-1}{n} \right) - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

이때 $q \neq 1$ 이면

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{q-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{q-1}{n} = \frac{1}{q-1} \times 0 = 0$$

이 되어 모순이므로 $q=1$ 이다.

따라서 $a_n = 2n+1$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = \sum_{n=1}^{10} (2n+1) = \frac{10(3+21)}{2} = 120$$

답 ②

4




그림 R_1 에서 원 G_1 의 중심을 G_1 이라 하자.

$$\overline{A_1D_1} = \overline{A_1F_1} = \frac{1}{2} \overline{A_1C_1} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$\text{이므로 } \overline{D_1B_1} = 2 - \sqrt{2}$$

사각형 $D_1B_1E_1G_1$ 은 정사각형이므로

$$\overline{G_1D_1} = \overline{G_1E_1} = 2 - \sqrt{2}$$

즉, 원 G_1 의 반지름의 길이가 $2 - \sqrt{2}$ 이다.

그러므로 원 G_1 의 호 D_1E_1 과 선분 D_1E_1 로 둘러싸인 부분

의 넓이는 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 $G_1D_1E_1$ 의 넓이에

서 삼각형 $G_1D_1E_1$ 의 넓이를 뺀 값과 같으므로

$$\frac{1}{2} \times (2 - \sqrt{2})^2 \times \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \times (2 - \sqrt{2})^2$$

$$= \frac{3}{2}\pi - \sqrt{2}\pi - 3 + 2\sqrt{2}$$

부채꼴 $A_1D_1F_1$ 의 호 D_1F_1 과 선분 D_1F_1 로 둘러싸인 부분의 넓이는 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 인 부채꼴 $A_1D_1F_1$ 의 넓이에


$$\frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \times \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \times (\sqrt{2})^2 \times \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

부채꼴 $C_1E_1F_1$ 의 호 E_1F_1 과 선분 E_1F_1 로 둘러싸인 부분의 넓이도 같은 방법으로 구하면

$$\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

그러므로

$$\begin{aligned} S_1 &= \left(\frac{3}{2}\pi - \sqrt{2}\pi - 3 + 2\sqrt{2} \right) + 2 \times \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= (2 - \sqrt{2})\pi - 3 + \sqrt{2} \end{aligned}$$



R_2

그림 R_2 에서 선분 A_2C_2 의 길이는 원 G_1 의 지름의 길이와 같다. 즉, $\overline{A_2C_2} = 2(2 - \sqrt{2})$ 이므로

$$\overline{OA_2} = 2(2 - \sqrt{2}) \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 2$$

두 정사각형 $OA_1B_1C_1$, $OA_2B_2C_2$ 의 넓음비는

$$2 : (2\sqrt{2} - 2) = 1 : (\sqrt{2} - 1)$$

이므로 넓이의 비는

$$1^2 : (\sqrt{2} - 1)^2 = 1 : (3 - 2\sqrt{2})$$

이다. 같은 방법으로 하면 두 정사각형 $OA_nB_nC_n$,

$OA_{n+1}B_{n+1}C_{n+1}$ 의 넓이의 비는 $1 : (3 - 2\sqrt{2})$ 이므로

$r = 3 - 2\sqrt{2}$ 로 놓으면 $0 < r < 1$ 이고

$$S_n = S_1 + rS_1 + r^2S_1 + \cdots + r^{n-1}S_1$$

이다. 즉, S_n 은 첫째항이 S_1 이고 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다. 따라서

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_1(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{S_1}{1 - r} \\ &= \frac{(2 - \sqrt{2})\pi - 3 + \sqrt{2}}{1 - (3 - 2\sqrt{2})} = \frac{(2 - \sqrt{2})\pi - 3 + \sqrt{2}}{2\sqrt{2} - 2} \\ &= \frac{\{(2 - \sqrt{2})\pi - (3 - \sqrt{2})\}(\sqrt{2} + 1)}{2(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} \\ &= \frac{\sqrt{2}\pi - 2\sqrt{2} - 1}{2} = \frac{\sqrt{2}(\pi - 2) - 1}{2} \end{aligned}$$

답 ①

03 여러 가지 함수의 미분

유제

본문 29~37쪽

- 1 ⑤ 2 ⑤ 3 ③ 4 ⑤ 5 ④
6 ④ 7 4 8 ② 9 ⑤ 10 ⑤

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{4^x - 2^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x} - e^x}{x} \times \frac{x}{4^x - 2^x} \right) \dots\dots ㉠$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 1) - (e^x - 1)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x} - 1}{2x} \times 2 - \frac{e^x - 1}{x} \right)$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$= 2 \times 1 - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 2^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4^x - 1) - (2^x - 1)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4^x - 1}{x} - \frac{2^x - 1}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x}$$

$$= \ln 4 - \ln 2 = \ln 2$$

이므로 ㉠에서

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{4^x - 2^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{2x} - e^x}{x} \times \frac{x}{4^x - 2^x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{4^x - 2^x}{x}}$$

$$= 1 \times \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$$

다른 풀이

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{4^x - 2^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^x - 1)}{2^x(2^x - 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{e}{2} \right)^x \times \frac{e^x - 1}{2^x - 1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{e}{2} \right)^x \times \frac{e^x - 1}{x} \times \frac{x}{2^x - 1} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{e}{2} \right)^x \times \frac{e^x - 1}{x} \times \frac{1}{\frac{2^x - 1}{x}} \right\}$$

$$= 1 \times 1 \times \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$$

답 ⑤

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(ax+1)}{\sqrt{3x+b}-2} = 8$ 에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고 0이

아닌 극한값이 존재하므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{3x+b}-2) = 0$ 에서 $\sqrt{b}=2$, $b=4$

한편 $a=0$ 이면 $\ln(ax+1)=0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(ax+1)}{\sqrt{3x+b}-2} = 0$$
이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

그러므로 $a \neq 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(ax+1)}{\sqrt{3x+b}-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(ax+1)}{\sqrt{3x+4}-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+ax)}{ax} \times ax \times \frac{\sqrt{3x+4}+2}{(\sqrt{3x+4}-2)(\sqrt{3x+4}+2)} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+ax)}{ax} \times ax \times \frac{\sqrt{3x+4}+2}{3x} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+ax)}{ax} \times (\sqrt{3x+4}+2) \times \frac{a}{3} \right\}$$

$$= 1 \times 4 \times \frac{a}{3} = \frac{4}{3}a$$

즉, $\frac{4}{3}a=8$ 에서 $a=6$

따라서

$$a+b=6+4=10$$

답 ⑤

3 $f(x) = (x-1)e^x$ 에서

$$f'(x) = (x-1)' \times e^x + (x-1) \times (e^x)'$$

$$= e^x + (x-1)e^x$$

$$= xe^x$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x^2-a^2} = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times \frac{1}{x+a} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x+a}$$

$$= f'(a) \times \frac{1}{2a}$$

$$= ae^a \times \frac{1}{2a} = \frac{e^a}{2}$$

한편 $f(a) = (a-1)e^a$ 이므로

$$(a-1)e^a = \frac{e^a}{2}, \left(a - \frac{3}{2}\right)e^a = 0$$

$e^a > 0$ 이므로 $a - \frac{3}{2} = 0$ 에서 $a = \frac{3}{2}$

답 ③

정답과 풀이

4 $f(x) = \log_3 9x \times \log_3 3x$
 $= (\log_3 9 + \log_3 x)(\log_3 3 + \log_3 x)$
 $= (2 + \log_3 x)\left(\frac{1}{2} + \log_3 x\right)$
 이므로
 $f'(x) = (2 + \log_3 x)' \times \left(\frac{1}{2} + \log_3 x\right)$
 $\quad + (2 + \log_3 x) \times \left(\frac{1}{2} + \log_3 x\right)'$
 $= \frac{1}{x \ln 3} \times \left(\frac{1}{2} + \log_3 x\right) + (2 + \log_3 x) \times \frac{1}{x \ln 9}$
 따라서
 $f'(3) = \frac{1}{3 \ln 3} \times \left(\frac{1}{2} + \log_3 3\right) + (2 + \log_3 3) \times \frac{1}{3 \ln 9}$
 $= \frac{1}{3 \ln 3} \times \left(\frac{1}{2} + 1\right) + (2 + 1) \times \frac{1}{3 \times 2 \ln 3}$
 $= \frac{1}{3 \ln 3} + \frac{1}{2 \ln 3}$
 $= \frac{5}{6 \ln 3}$

답 ⑤

5 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 이고 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이므로
 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$
 $= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}$
 $= \frac{2\sqrt{2}}{3}$
 $\cos \beta = \frac{1}{3}$ 이고 $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 이므로
 $\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta}$
 $= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}$
 $= \frac{2\sqrt{2}}{3}$
 따라서 삼각함수의 덧셈정리에 의하여
 $\cos(\beta - \alpha) = \cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha$
 $= \frac{1}{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{1}{3}$
 $= \frac{4\sqrt{2}}{9}$

답 ④

6 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 에서
 $0 < \alpha + \beta < \pi$ 이고, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{\sqrt{5}}{5} < 0$ 이므로
 $\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta < \pi$

$$\sin^2(\alpha + \beta) = 1 - \cos^2(\alpha + \beta)$$

$$= 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\pi}{2} < \alpha + \beta < \pi \text{에서 } \sin(\alpha + \beta) > 0 \text{ 이므로}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = -2$$

$$\text{한편 } -\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}, \sin(\alpha - \beta) = \frac{3}{5} > 0 \text{ 이므로}$$

$$0 < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2} \text{ 이고}$$

$$\cos^2(\alpha - \beta) = 1 - \sin^2(\alpha - \beta) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$0 < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2} \text{에서 } \cos(\alpha - \beta) > 0 \text{ 이므로}$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \frac{4}{5}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha - \beta)} = \frac{3}{4}$$

$$\text{따라서 삼각함수의 덧셈정리에 의하여}$$

$$\tan 2\alpha = \tan\{(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta)\}$$

$$= \frac{\tan(\alpha + \beta) + \tan(\alpha - \beta)}{1 - \tan(\alpha + \beta) \times \tan(\alpha - \beta)}$$

$$= \frac{-2 + \frac{3}{4}}{1 - (-2) \times \frac{3}{4}} = -\frac{1}{2}$$

답 ④

7 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos^3 x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{(1 - \cos x)(1 + \cos x + \cos^2 x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x \sin x}{1 - \cos x} \times \frac{1}{1 + \cos x + \cos^2 x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{x \sin x (1 + \cos x)}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} \times \frac{1}{1 + \cos x + \cos^2 x} \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x \sin x}{\sin^2 x} \times \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x + \cos^2 x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \times \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x + \cos^2 x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x + \cos^2 x}$$

$$= \frac{1}{1} \times \frac{1 + 1}{1 + 1 + 1} = \frac{2}{3}$$

$$\text{따라서 } 6 \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos^3 x} = 6 \times \frac{2}{3} = 4$$

답 4

- 8 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 에서 두 점 A, B의 좌표는 $A(t, \tan 2t)$, $B(t, \sin t)$ 이고, 두 직선 OA, OB가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 $\alpha(t)$, $\beta(t)$ 라 하면

$$\tan \alpha(t) = \frac{\tan 2t}{t}, \tan \beta(t) = \frac{\sin t}{t} \text{ 이고}$$

$$\begin{aligned} \tan \theta(t) &= |\tan \{\alpha(t) - \beta(t)\}| \\ &= \left| \frac{\tan \alpha(t) - \tan \beta(t)}{1 + \tan \alpha(t) \times \tan \beta(t)} \right| \\ &= \left| \frac{\frac{\tan 2t}{t} - \frac{\sin t}{t}}{1 + \frac{\tan 2t}{t} \times \frac{\sin t}{t}} \right| \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\tan 2t}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin 2t}{2t} \times \frac{1}{\cos 2t} \times 2 \right) \\ &= 1 \times 1 \times 2 \\ &= 2 \end{aligned}$$


이므로

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \tan \theta(t) &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left| \frac{\frac{\tan 2t}{t} - \frac{\sin t}{t}}{1 + \frac{\tan 2t}{t} \times \frac{\sin t}{t}} \right| \\ &= \left| \frac{2-1}{1+2 \times 1} \right| \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

답 ②

참고

$0 < x < \frac{\pi}{4}$ 에서 두 함수 $y = \tan 2x$, $y = \sin x$ 의 그래프는 그림과 같다.



이때 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 에서 $\tan 2t > \sin t$ 는 다음과 같이 보일 수 있다.

$$\begin{aligned} \tan 2t - \sin t &= \frac{\sin 2t}{\cos 2t} - \sin t \\ &= \frac{2 \sin t \cos t - \sin t \cos 2t}{\cos 2t} \\ &= \frac{\sin t (2 \cos t - \cos 2t)}{\cos 2t} \quad \dots\dots ⑦ \end{aligned}$$

에서

$$\begin{aligned} 2 \cos t - \cos 2t &= 2 \cos t - (2 \cos^2 t - 1) \\ &= -2 \cos^2 t + 2 \cos t + 1 \\ &= -2 \left(\cos t - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

이고, $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 에서 $\frac{\sqrt{2}}{2} < \cos t < 1$ 이므로

$$1 < 2 \cos t - \cos 2t < \sqrt{2}$$

또 $0 < 2t < \frac{\pi}{2}$ 에서 $0 < \cos 2t < 1$ 이므로

⑦에서 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 일 때

$$\tan 2t - \sin t > 0$$

따라서 $\tan 2t > \sin t$ 이다.

- 9 $f(x) = e^x \cos x$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= (e^x)' \times \cos x + e^x \times (\cos x)' \\ &= e^x \times \cos x + e^x \times (-\sin x) \\ &= e^x (\cos x - \sin x) \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f'(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos x - e^x (\cos x - \sin x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^x \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &= 1 \times 1 = 1 \end{aligned}$$

답 ⑤

- 10 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축이 만나는 점 P의 x 좌표를 α 라 하자.

$f(\alpha) = 0$ 에서

$$\sin \alpha - 2 \cos \alpha = 0, \sin \alpha = 2 \cos \alpha \quad \dots\dots ⑦$$

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 에 ⑦을 대입하면

$$(2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1, 5 \cos^2 \alpha = 1, \cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$$

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\cos \alpha > 0$ 이므로 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$

$$\text{⑦에서 } \sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

따라서 $f'(x) = \cos x + 2 \sin x$ 이므로 구하는 접선의 기울기는

$$\begin{aligned} f'(\alpha) &= \cos \alpha + 2 \sin \alpha \\ &= \frac{\sqrt{5}}{5} + \frac{4\sqrt{5}}{5} \\ &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

답 ⑤

정답과 풀이

Level 1 기초 연습

본문 38~39쪽

- | | | | | |
|-----|-----|------|-----|------|
| 1 ③ | 2 ① | 3 20 | 4 ③ | 5 ② |
| 6 ④ | 7 ② | 8 ① | 9 ② | 10 ② |

$$\begin{aligned}
 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 2^{2x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 1) - (2^{2x} - 1)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{(e^{2x} - 1) - (2^{2x} - 1)}{2x} \times 2 \right\} \\
 &= 2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{2x} - 1}{2x} \right) \\
 &= 2(1 - \ln 2) \\
 &= 2 - 2 \ln 2
 \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 2 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x^2 + 2x + a)}{b(x+1)^2} &= \frac{1}{4} \text{에서 } x \rightarrow -1 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \\
 &\text{이고 극한값이 존재하므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이어야 한다.} \\
 \text{즉, } \lim_{x \rightarrow -1} \ln(x^2 + 2x + a) &= \ln(a - 1) = 0 \text{에서 } a = 2 \\
 \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln(x^2 + 2x + 2)}{b(x+1)^2} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln\{1 + (x^2 + 2x + 1)\}}{b(x+1)^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln\{1 + (x+1)^2\}}{b(x+1)^2} \\
 (x+1)^2 &= t \text{로 놓으면 } x \rightarrow -1 \text{일 때 } t \rightarrow 0+ \text{이므로} \\
 \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\ln\{1 + (x+1)^2\}}{b(x+1)^2} &= \frac{1}{b} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{b} \\
 \text{따라서 } \frac{1}{b} &= \frac{1}{4} \text{에서 } b = 4 \text{이므로} \\
 a + b &= 2 + 4 = 6
 \end{aligned}$$

답 ①

$$\begin{aligned}
 3 \quad f(x) &= (x^2 - 4x - 4)e^x \text{에서} \\
 f'(x) &= (2x - 4)e^x + (x^2 - 4x - 4)e^x \\
 &= (x^2 - 2x - 8)e^x \\
 f'(x) &= 0 \text{에서} \\
 (x^2 - 2x - 8)e^x &= 0 \\
 \text{모든 실수 } x \text{에 대하여 } e^x > 0 \text{이므로} \\
 x^2 - 2x - 8 &= 0, (x+2)(x-4) = 0 \\
 x &= -2 \text{ 또는 } x = 4 \\
 \text{따라서} \\
 a^2 + b^2 &= (-2)^2 + 4^2 \\
 &= 20
 \end{aligned}$$

답 20

$$\begin{aligned}
 4 \quad \text{방정식 } f(x) &= 2, \text{ 즉 } e^x(e^x - 1) = 2 \text{에서} \\
 (e^x)^2 - e^x - 2 &= 0, (e^x + 1)(e^x - 2) = 0 \\
 \text{모든 실수 } x \text{에 대하여 } e^x + 1 > 0 \text{이므로} \\
 e^x &= 2, x = \ln 2 \\
 \text{즉, 곡선 } y &= f(x) \text{와 직선 } y = 2 \text{가 만나는 점 P의 좌표는} \\
 (\ln 2, 2) \text{이다.} \\
 f'(x) &= e^x(e^x - 1) + e^x \times e^x = e^x(2e^x - 1) \\
 \text{이므로 점 P에서의 접선의 기울기는} \\
 f'(\ln 2) &= e^{\ln 2}(2e^{\ln 2} - 1) \\
 &= 2 \times 3 = 6
 \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 5 \quad f(x) &= x \ln kx = x(\ln k + \ln x) \text{이므로} \\
 f'(x) &= (\ln k + \ln x) + x \times \frac{1}{x} \\
 &= \ln k + \ln x + 1 \\
 \text{한편} \\
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+h) - f(e-h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+h) - f(e) - \{f(e-h) - f(e)\}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(e+h) - f(e)}{h} + \frac{f(e-h) - f(e)}{-h} \right\} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e+h) - f(e)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(e-h) - f(e)}{-h} \\
 &= f'(e) + f'(e) \\
 &= 2f'(e) \\
 \text{즉, } 2f'(e) &= 2 \text{에서 } f'(e) = 1 \\
 \text{이때 } f'(e) &= \ln k + \ln e + 1 = \ln k + 2 \text{이므로} \\
 \ln k + 2 &= 1 \text{에서 } \ln k = -1 \\
 \text{따라서 } k &= \frac{1}{e}
 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned}
 6 \quad \sin \alpha &= \frac{1}{3} \text{이므로} \\
 \cos^2 \alpha &= 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9} \\
 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{에서 } \cos \alpha > 0 \text{이므로 } \cos \alpha &= \frac{2\sqrt{2}}{3} \\
 \text{따라서 삼각함수의 성질과 삼각함수의 덧셈정리에 의하여} \\
 \cos\left(\frac{5}{3}\pi + \alpha\right) &= \cos\left\{\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) + \alpha\right\} \\
 &= \cos\left\{2\pi - \left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)\right\} \\
 &= \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \cos \frac{\pi}{3} \times \cos \alpha + \sin \frac{\pi}{3} \times \sin \alpha \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

답 ④

- 7 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\tan \alpha + \tan \beta = -a$, $\tan \alpha \tan \beta = -2$
삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{-a}{1 - (-2)} = -\frac{a}{3}$$

$$\text{따라서 } -\frac{a}{3} = \frac{2}{3} \text{에서 } a = -2$$

답 ②

$$\begin{aligned} 8 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x + \sin 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{2x + \sin 2x}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + \frac{\sin 2x}{2x} \times 2} \\ &= \frac{1}{2 + 1 \times 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

답 ①

$$9 \quad \tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \frac{\sin x \times (1 - \cos x)}{\cos x}$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln(1+x^3)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{\ln(1+x^3)} \times \sin x \times (1 - \cos x) \times \frac{1}{\cos x} \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{x^3}{\ln(1+x^3)} \times \frac{\sin x}{x} \times \frac{1 - \cos x}{x^2} \times \frac{1}{\cos x} \right\} \end{aligned}$$

이때

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\ln(1+x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+x^3)}{x^3}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2 x}{x^2} \times \frac{1}{1 + \cos x} \right) \\ &= 1^2 \times \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\ln(1+x^3)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\ln(1+x^3)} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \\ &\quad \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \\ &= 1 \times 1 \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

답 ②

- 10 $f(x) = a \sin x + b \cos x$ 라 하자.

곡선 $y = f(x)$ 가 점 $\left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$ 을 지나므로 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$ 에서

$$a \sin \frac{\pi}{2} + b \cos \frac{\pi}{2} = 3, \text{ 즉 } a = 3$$

$$f(x) = 3 \sin x + b \cos x \text{에서}$$

$$f'(x) = 3 \cos x - b \sin x$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $\left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$ 에서의 접선의 기울기가 1이

$$\text{므로 } f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \text{에서}$$

$$3 \cos \frac{\pi}{2} - b \sin \frac{\pi}{2} = 1, \text{ 즉 } b = -1$$

$$\text{따라서 } a + b = 3 + (-1) = 2$$

답 ②

Level 2 기본 연습

본문 40~41쪽

| | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 ④ | 2 24 | 3 ③ | 4 ③ | 5 3 |
| 6 ① | 7 ③ | 8 ④ | | |

- 1 $f(x) \ln(1+2x) = 4 - ae^{-x}$

위 등식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$0 = 4 - a, \quad a = 4$$

$x \neq 0$ 이면 $\ln(1+2x) \neq 0$ 이므로

$$f(x) = \frac{4(1 - e^{-x})}{\ln(1+2x)} \quad \left(x > -\frac{1}{2}, x \neq 0\right)$$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=0$ 에서도 연속이다.

그러므로

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4(1 - e^{-x})}{\ln(1+2x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{4e^{-x}(e^x - 1)}{x} \times \frac{2x}{\ln(1+2x)} \times \frac{1}{2} \right\} \end{aligned}$$

정답과 풀이

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 2e^{-x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \times \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{2x}}$$

$$= 2 \times 1 \times \frac{1}{1} = 2$$

따라서 $a \times f(0) = 4 \times 2 = 8$

답 ④

2 조건 (가)에 의하여

$$f(x) = 3x^2 + ax + b \quad (a, b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\{1+f(x)\}}{2x} = 3 \text{에서 } x \rightarrow 0 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극}$$

한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} \ln\{1+f(x)\} = 0 \text{에서 } \ln\{1+f(0)\} = 0$$

$$1+f(0)=1, f(0)=0 \text{이므로 } b=0$$

그러므로 $f(x) = 3x^2 + ax$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\{1+f(x)\}}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2+ax)}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+3x^2+ax)}{3x^2+ax} \times \frac{3x^2+ax}{2x} \right\} \quad \dots\dots ⑦$$

⑦에서 $3x^2+ax=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2+ax)}{3x^2+ax} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

또

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2+ax}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+a}{2} = \frac{0+a}{2} = \frac{a}{2}$$

그러므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+3x^2+ax)}{3x^2+ax} \times \frac{3x^2+ax}{2x} \right\} = 1 \times \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$$

조건 (나)에 의하여

$$\frac{a}{2} = 3, a = 6$$

따라서 $f(x) = 3x^2 + 6x$ 이므로

$$f(2) = 3 \times 2^2 + 6 \times 2 = 24$$

답 24

3 $f(x) = \frac{4^{-x}}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 이므로

$$f'(x) = \frac{1}{\ln 2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^x \times \ln \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \times \left(\frac{1}{4}\right)^x \times (-2 \ln 2)$$

$$= -2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^x$$

따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'(n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ -2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n \right\} = -2 \times \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$= -2 \times \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$$

답 ③

4 $|\ln 3x| = \begin{cases} -\ln 3x & (0 < x < \frac{1}{3}) \\ \ln 3x & (x \geq \frac{1}{3}) \end{cases}$

직선 $y=x-t$ 가 함수 $y=|\ln 3x|$ 의 그래프와 접할 때, 접점의 x 좌표를 구해 보자.

$x \geq \frac{1}{3}$ 일 때, $y = \ln 3x$ 에서

$$y' = (\ln 3 + \ln x)' = \frac{1}{x}$$

이므로 곡선 $y = \ln 3x$ 위의 점 $(a, \ln 3a)$ 에서의 접선의 기울기가 1이 되도록 하는 a 의 값은

$$\frac{1}{a} = 1, a = 1$$

즉, 직선 $y=x-t$ 가 곡선 $y = \ln 3x$ ($x \geq \frac{1}{3}$) 위의

점 $(1, \ln 3)$ 에서 접하므로

$$\ln 3 = 1 - t \text{에서 } t = 1 - \ln 3$$


한편 $0 < x < \frac{1}{3}$ 일 때, $y = -\ln 3x$ 에서

$$y' = (-\ln 3x)' = (-\ln 3 - \ln x)' = -\frac{1}{x} < 0$$

이므로 접선의 기울기가 1이 되도록 하는 곡선

$y = -\ln 3x$ ($0 < x < \frac{1}{3}$) 위의 점은 존재하지 않는다.

그러므로 실수 t 의 값의 범위에 따른 함수 $f(t)$ 는 다음과 같다.



(i) $t < 1 - \ln 3$ 일 때

직선 $y=x-t$ 는 함수 $y=|\ln 3x|$ 의 그래프와 한 점에서 만나므로

$$f(t) = 1$$

(ii) $t = 1 - \ln 3$ 일 때

직선 $y = x - t$ 는 함수 $y = |\ln 3x|$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나므로

$$f(1 - \ln 3) = 2$$

(iii) $1 - \ln 3 < t < \frac{1}{3}$ 일 때

직선 $y = x - t$ 는 함수 $y = |\ln 3x|$ 의 그래프와 서로 다른 세 점에서 만나므로

$$f(t) = 3$$

(iv) $t = \frac{1}{3}$ 일 때

직선 $y = x - t$ 는 함수 $y = |\ln 3x|$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나므로

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$$

(v) $t > \frac{1}{3}$ 일 때

직선 $y = x - t$ 는 함수 $y = |\ln 3x|$ 의 그래프와 한 점에서 만나므로

$$f(t) = 1$$

(i) ~ (v)에 의하여 함수 $f(t)$ 는 다음과 같다.

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (t < 1 - \ln 3 \text{ 또는 } t > \frac{1}{3}) \\ 2 & (t = 1 - \ln 3 \text{ 또는 } t = \frac{1}{3}) \\ 3 & (1 - \ln 3 < t < \frac{1}{3}) \end{cases}$$

따라서 $\lim_{t \rightarrow a+} f(t) \neq \lim_{t \rightarrow a-} f(t)$ 를 만족시키는 a 의 값은

$$a = 1 - \ln 3 \text{ 또는 } a = \frac{1}{3} \text{ 이므로 그 합은}$$

$$(1 - \ln 3) + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} - \ln 3$$

답 ③

5 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y = g(x)$ 라 하면

$$g(x) = f(x - a)$$

$$= 2 \sin(x - a) + \cos(x - a)$$

함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 점 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 을 지나므로

$$2 \sin\left(\frac{\pi}{4} - a\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $0 < a < \frac{\pi}{2}$ 에서 $-\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{4} - a < \frac{\pi}{4}$ 이므로

$\cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) > 0$ 이고, $\textcircled{1}$ 의 양변을 $\cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right)$ 로 나누면

$$2 \tan\left(\frac{\pi}{4} - a\right) + 1 = 0, \tan\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = -\frac{1}{2}$$

삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan a}{1 + \tan \frac{\pi}{4} \times \tan a} = \frac{1 - \tan a}{1 + \tan a}$$

이므로

$$\frac{1 - \tan a}{1 + \tan a} = -\frac{1}{2}, 2 - 2 \tan a = -1 - \tan a$$

따라서 $\tan a = 3$

답 3

6 원 C 는 반지름의 길이가 2이고, x 축에 접하는 원이므로 원 C 의 중심을 C 라 하면 점 C 의 좌표를 $(a, 2)$ ($a > 0$)으로 놓을 수 있다.

점 C 와 직선 $y = \frac{4}{3}x$, 즉 $4x - 3y = 0$ 사이의 거리가 원 C 의

반지름의 길이인 2와 같으므로


$$\frac{|4 \times a - 3 \times 2|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 2, |4a - 6| = 10$$

$$4a - 6 = 10 \text{에서 } a = 4$$

$$4a - 6 = -10 \text{에서 } a = -1$$

$a > 0$ 이므로 $a = 4$

그러므로 점 C 의 좌표는 $(4, 2)$ 이다.



한편 두 직선 $y = \frac{4}{3}x$, $y = mx$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는

각의 크기를 각각 α , β 라 하면 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, $\tan \beta = m$ 이고

삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\begin{aligned} \tan(\alpha - \beta) &= \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \\ &= \frac{\frac{4}{3} - m}{1 + \frac{4}{3} \times m} = \frac{4 - 3m}{3 + 4m} \end{aligned}$$

이때 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{4}$, 즉 $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ 이므로

$$\frac{4 - 3m}{3 + 4m} = 1, 4 - 3m = 3 + 4m, m = \frac{1}{7}$$

점 C 에서 선분 PQ 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 선분 CH 의 길이는 점 C 와 직선 $y = \frac{1}{7}x$, 즉 $x - 7y = 0$ 사이의 거리

와 같으므로

정답과 풀이

$$\overline{CH} = \frac{|4 - 7 \times 2|}{\sqrt{1^2 + (-7)^2}} = \frac{10}{5\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

직각삼각형 CPH에서


$$\overline{PH} = \sqrt{\overline{CP}^2 - \overline{CH}^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}$$

이므로 $\overline{PQ} = 2\overline{PH} = 2\sqrt{2}$

따라서 $\overline{PQ}^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$

답 ①

7



그림과 같이 직선 $y = (\tan t)x$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $\alpha(t)$, 직선 $y = (\tan t)x$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $\beta(t)$ 라 하면

$$\tan \alpha(t) = \sin t, \quad \tan \beta(t) = \tan t,$$

$$\angle POQ = \beta(t) - \alpha(t)$$

삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\tan(\angle POQ) = \tan\{\beta(t) - \alpha(t)\}$$

$$= \frac{\tan \beta(t) - \tan \alpha(t)}{1 + \tan \beta(t) \times \tan \alpha(t)}$$

$$= \frac{\tan t - \sin t}{1 + \tan t \times \sin t}$$

$\overline{OP} = t$ 이고, 원 위의 점 P에서 그은 접선은 선분 OP와 수직이므로 직각삼각형 POQ에서

$$\overline{PQ} = \overline{OP} \times \tan(\angle POQ) = \frac{t(\tan t - \sin t)}{1 + \tan t \times \sin t}$$

그러므로

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{PQ}}{t^4} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left\{ \frac{1}{t^4} \times \frac{t(\tan t - \sin t)}{1 + \tan t \times \sin t} \right\} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{\tan t - \sin t}{t^3} \times \frac{1}{1 + \tan t \times \sin t} \right) \end{aligned} \quad \dots\dots ㉠$$

이고

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\tan t - \sin t}{t^3} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\frac{\sin t}{\cos t} - \sin t}{t^3} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin t \times (1 - \cos t)}{t^3 \cos t} \end{aligned}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sin t \times (1 - \cos t) \times (1 + \cos t)}{t^3 \cos t \times (1 + \cos t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \left\{ \left(\frac{\sin t}{t} \right)^3 \times \frac{1}{\cos t} \times \frac{1}{1 + \cos t} \right\}$$

$$= 1^3 \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

따라서 ㉠에서

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{PQ}}{t^4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1+0} = \frac{1}{2}$$

답 ③

참고

$$\begin{aligned} \tan t - \sin t &= \frac{\sin t}{\cos t} - \sin t = \frac{\sin t - \sin t \cos t}{\cos t} \\ &= \frac{(1 - \cos t) \sin t}{\cos t} \quad \dots\dots ㉡ \end{aligned}$$

$0 < t < \frac{\pi}{2}$ 에서

$$0 < 1 - \cos t < 1, \quad 0 < \sin t < 1, \quad 0 < \cos t < 1$$

따라서 ㉡에서 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 일 때 $\tan t - \sin t > 0$ 이므로

$\tan t > \sin t$ 이다.

8 $f(x) = x \sin x$ 에서 $f'(x) = \sin x + x \cos x$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x) - f(x)}{2x - \pi}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(x \sin x + x^2 \cos x) - x \sin x}{2x - \pi}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x^2 \cos x}{2x - \pi}$$

이때 $x - \frac{\pi}{2} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{xf'(x) - f(x)}{2x - \pi} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x^2 \cos x}{2x - \pi} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\pi}{2} + t \right)^2 \cos \left(\frac{\pi}{2} + t \right)}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + t \right)^2 \times \left(-\frac{\sin t}{2t} \right) \right\} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{\pi}{2} + t \right)^2 \times \left(-\frac{1}{2} \right) \times \frac{\sin t}{t} \right\} \\ &= \frac{\pi^2}{4} \times \left(-\frac{1}{2} \right) \times 1 = -\frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$


답 ④

Level 3 실력 완성

본문 42쪽

1 ④ 2 11 3 ②

- 1 $\log_2 x = t$ 에서 $x = 2^t$ 이므로 $P(2^t, t)$
 $\log_a x = t$ 에서 $x = a^t$ 이므로 $Q(a^t, t)$
 실수 t 의 값의 부호에 따라 두 점 P, Q를 좌표평면 위에 나타내면 그림과 같다.



[$t > 0$ 인 경우]

[$t < 0$ 인 경우]

그러므로 실수 t 에 대하여 함수 $f(t)$ 는 다음과 같다.

$$f(t) = \begin{cases} 2^t - a^t & (t > 0) \\ a^t - 2^t & (t < 0) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(2t) - f(t)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(2^{2t} - a^{2t}) - (2^t - a^t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(2^{2t} - 2^t) - (a^{2t} - a^t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2^t(2^t - 1) - a^t(a^t - 1)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \left(2^t \times \frac{2^t - 1}{t} \right) - \lim_{t \rightarrow 0+} \left(a^t \times \frac{a^t - 1}{t} \right) \\ &= 1 \times \ln 2 - 1 \times \ln a = \ln \frac{2}{a} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \ln \frac{2}{a} = 3 \ln 2$$

$$\frac{2}{a} = 8, \quad a = \frac{1}{4}$$

그러므로 함수 $f(t)$ 는 다음과 같다.

$$f(t) = \begin{cases} 2^t - \left(\frac{1}{4}\right)^t & (t > 0) \\ \left(\frac{1}{4}\right)^t - 2^t & (t < 0) \end{cases}$$

이때 함수 $f(t)$ 의 도함수 $f'(t)$ 는

$t > 0$ 일 때,

$$f'(t) = 2^t \ln 2 - \left(\frac{1}{4}\right)^t \ln \frac{1}{4} = 2^t \ln 2 + \left(\frac{1}{4}\right)^t \ln 4$$

$t < 0$ 일 때,

$$f'(t) = \left(\frac{1}{4}\right)^t \ln \frac{1}{4} - 2^t \ln 2 = -\left(\frac{1}{4}\right)^t \ln 4 - 2^t \ln 2$$

따라서


$$f'(1) - f'(-1)$$

$$= \left(2 \ln 2 + \frac{1}{4} \ln 4 \right) - \left(-4 \ln 4 - \frac{1}{2} \ln 2 \right)$$

$$\begin{aligned} &= \left(2 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 \right) + \left(8 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 2 \right) \\ &= 11 \ln 2 \end{aligned}$$

답 ④

2



반원에 대한 원주각의 크기는 $\frac{\pi}{2}$ 이므로 $\angle CED = \frac{\pi}{2}$

$\angle EDC = \alpha$ 라 하면 직각삼각형 DCE에서 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ 이므로

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4}{3}$$

그러므로 $\overline{CD} = 5k$, $\overline{EC} = 4k$, $\overline{DE} = 3k$ ($k > 0$ 인 상수)로 놓을 수 있다.

한편 점 E에서 선분 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\angle ECH = \frac{\pi}{2} - \angle ECD = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \angle EDC \right) = \angle EDC$$

즉, $\angle ECH = \alpha$ 이므로 직각삼각형 ECH에서

$$\overline{CH} = \overline{EC} \cos \alpha = 4k \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}k$$

$$\overline{EH} = \overline{EC} \sin \alpha = 4k \times \frac{4}{5} = \frac{16}{5}k$$

$\angle EBH = \beta$ 라 하면 직각삼각형 EBH에서

$$\overline{BH} = \overline{BC} + \overline{CH} = 5k + \frac{12}{5}k = \frac{37}{5}k \text{ 이므로}$$

$$\tan \beta = \frac{\overline{EH}}{\overline{BH}} = \frac{\frac{16}{5}k}{\frac{37}{5}k} = \frac{16}{37}$$

이때 $\angle BEC = \theta$ 라 하면 $\angle EBC + \angle BEC = \angle ECH$ 이므로 $\beta + \theta = \alpha$ 에서 $\theta = \alpha - \beta$

그러므로 삼각함수의 덧셈정리에 의하여

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \\ &= \frac{\frac{4}{3} - \frac{16}{37}}{1 + \frac{4}{3} \times \frac{16}{37}} = \frac{148 - 48}{111 + 64} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

즉, $\tan(\angle BEC) = \frac{4}{7}$ 이므로 $p = 7$, $q = 4$

따라서 $p + q = 7 + 4 = 11$

답 11

$$\begin{aligned}
 &= \tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{\cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)} \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \\
 &= -\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} \\
 &= -\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

답 ②

3 $f(x) = \sin \pi x$ 에서
 $f'(x) = \cos \pi x \times (\pi x)' = \pi \cos \pi x$ 이므로
 $f'\left(\frac{1}{3}\right) = \pi \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$

답 ③

4 $f(x) = \ln(e^x + 1)$ 에서
 $f'(x) = \frac{(e^x + 1)'}{e^x + 1} = \frac{e^x}{e^x + 1}$
 $= \frac{(e^x + 1) - 1}{e^x + 1} = 1 - \frac{1}{e^x + 1} \quad \dots\dots (*)$

x 의 값이 증가하면 $e^x + 1$ 의 값이 증가하고 $\frac{1}{e^x + 1}$ 의 값은 감소하므로 $f'(x)$ 는 증가한다.
 그러므로 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 함수 $f'(x)$ 는 $x=a$ 에서 최대이고 최댓값은

$$f'(a) = \frac{e^a}{e^a + 1} = \frac{4}{5}$$

$$5e^a = 4e^a + 4, e^a = 4$$

$$\text{따라서 } a = \ln 4 = 2 \ln 2$$


답 ③

참고

(*)에서 $e^x = t (t > 0)$ 으로 놓으면

$$1 - \frac{1}{e^x + 1} = 1 - \frac{1}{t + 1}$$

이므로 유리함수 $y = 1 - \frac{1}{t + 1} (t > 0)$ 의 그래프를 이용하여 $f'(x)$ 가 증가함을 보일 수 있다.



5 $x = (t+1)\sqrt{t} = t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}$ 에서
 $\frac{dx}{dt} = \frac{3}{2}t^{\frac{3}{2}-1} + \frac{1}{2}t^{\frac{1}{2}-1} = \frac{3}{2}t^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}}$
 $= \frac{3}{2}\sqrt{t} + \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{3t+1}{2\sqrt{t}}$

$$y = t + \frac{1}{t} = t + t^{-1} \text{에서}$$

$$\frac{dy}{dt} = 1 + (-1) \times t^{-1-1} = 1 - t^{-2} = 1 - \frac{1}{t^2} = \frac{t^2 - 1}{t^2}$$

이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{t^2 - 1}{t^2}}{\frac{3t+1}{2\sqrt{t}}} = \frac{2\sqrt{t}(t^2 - 1)}{t^2(3t+1)}$$

따라서 $t=4$ 에서의 $\frac{dy}{dx}$ 의 값 m 은

$$m = \frac{4 \times 15}{16 \times 13} = \frac{15}{52}$$

이므로

$$52m = 15$$

답 15

6 $x = \cos^3 \theta + \cos \theta$ 에서
 $\frac{dx}{d\theta} = 3 \cos^2 \theta \times (-\sin \theta) - \sin \theta$
 $= -3 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin \theta$
 $y = \sin^2 \theta \cos \theta$ 에서
 $\frac{dy}{d\theta} = 2 \sin \theta \times \cos \theta \times \cos \theta + \sin^2 \theta \times (-\sin \theta)$
 $= 2 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin^3 \theta$

이므로

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin^3 \theta}{-3 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin \theta} \\
 &= \frac{2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{-3 \cos^2 \theta - 1} \\
 &= \frac{2 \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta)}{-3 \cos^2 \theta - 1} \\
 &= \frac{3 \cos^2 \theta - 1}{-3 \cos^2 \theta - 1}
 \end{aligned}$$

점 P에서의 접선의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$\frac{3 \cos^2 \theta - 1}{-3 \cos^2 \theta - 1} = \frac{1}{2}$$

$$6 \cos^2 \theta - 2 = -3 \cos^2 \theta - 1, \cos^2 \theta = \frac{1}{9}$$

정답과 풀이

$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \text{에서 } \cos \theta < 0 \text{이므로 } \cos \theta = -\frac{1}{3}$$

따라서 점 P의 y좌표는

$$\begin{aligned} y &= \sin^2 \theta \cos \theta \\ &= (1 - \cos^2 \theta) \cos \theta \\ &= \frac{8}{9} \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{8}{27} \end{aligned}$$

답 ④

- 7 $x + \tan y = 2$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(\tan y) = \frac{d}{dx}(2)$$

함성함수의 미분법에 의하여

$$\frac{d}{dx}(\tan y) = \sec^2 y \times \frac{dy}{dx}$$

이므로

$$1 + \sec^2 y \times \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sec^2 y} = -\cos^2 y$$

따라서 점 $\left(1, \frac{\pi}{4}\right)$ 에서의 접선의 기울기는

$$-\cos^2 \frac{\pi}{4} = -\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2}$$

답 ③

- 8 곡선 $x + \log_2(x+y) = y$ 가 직선 $y = x+2$ 와 점 P에서 만나므로 점 P의 x좌표를 구하면

$$x + \log_2(x+x+2) = x+2 \text{에서}$$

$$\log_2(2x+2) = 2$$

$$2x+2=4, x=1$$

$$x=1 \text{을 } y=x+2 \text{에 대입하면 } y=3$$

그러므로 P(1, 3)이다.

$x + \log_2(x+y) = y$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}\{\log_2(x+y)\} = \frac{d}{dx}(y) \quad \dots\dots ㉠$$

함성함수의 미분법에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}\{\log_2(x+y)\} &= \frac{d}{dx}\left\{\frac{\ln(x+y)}{\ln 2}\right\} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \times \frac{d}{dx}\{\ln(x+y)\} \\ &= \frac{1}{\ln 2} \times \frac{\frac{d}{dx}(x+y)}{x+y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\ln 2} \times \frac{1 + \frac{dy}{dx}}{x+y} \\ &= \frac{1}{(x+y) \ln 2} + \frac{1}{(x+y) \ln 2} \times \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

이므로 ㉠에서

$$1 + \frac{1}{(x+y) \ln 2} + \frac{1}{(x+y) \ln 2} \times \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

$$(x+y) \ln 2 + 1 + \frac{dy}{dx} = (x+y) \ln 2 \times \frac{dy}{dx}$$

$$\{(x+y) \ln 2 - 1\} \frac{dy}{dx} = (x+y) \ln 2 + 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x+y) \ln 2 + 1}{(x+y) \ln 2 - 1} \quad \left(\text{단, } x+y \neq \frac{1}{\ln 2}\right)$$

따라서 점 P(1, 3)에서의 접선의 기울기는

$$\frac{4 \ln 2 + 1}{4 \ln 2 - 1}$$

답 ②

- 9 $h(x) = \{g(x)\}^2$ 에서 $h'(x) = 2g(x)g'(x)$ 이므로

$$h'(1) = 2g(1)g'(1) \quad \dots\dots ㉠$$

$g(1) = a$ 라 하면 $f(a) = 1$ 에서

$$f(a) = \frac{2}{1+e^{a+1}} = 1$$

$$1+e^{a+1}=2, e^{a+1}=1$$

$$a+1=0, \text{ 즉 } a=-1$$

그러므로 $g(1) = -1$ 이고 $f(-1) = 1$ 이다. $\dots\dots ㉡$

$$f(x) = \frac{2}{1+e^{x+1}} = 2(1+e^{x+1})^{-1} \text{에서}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2(1+e^{x+1})^{-2} \times (1+e^{x+1})' \\ &= \frac{-2e^{x+1}}{(1+e^{x+1})^2} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f'(-1) = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

㉠과 역함수의 미분법에 의하여

$$g'(1) = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2 \quad \dots\dots ㉢$$

㉠, ㉡, ㉢에서

$$h'(1) = 2g(1)g'(1) = 2 \times (-1) \times (-2) = 4$$

답 ⑤

- 10 $f(x) = x \sin 2x$ 에서

$$f'(x) = (x)' \times \sin 2x + x \times (\sin 2x)'$$

$$= \sin 2x + x \cos 2x \times (2x)'$$

$$= \sin 2x + 2x \cos 2x$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \cos 2x \times (2x)' + (2x)' \times \cos 2x \\ &\quad + 2x \times (-\sin 2x) \times (2x)' \end{aligned}$$

$$= 2 \cos 2x + 2 \cos 2x - 4x \sin 2x$$

$$= 4 \cos 2x - 4x \sin 2x$$

따라서

$$f''\left(\frac{3}{4}\pi\right) = 0 - 3\pi \times (-1) = 3\pi$$

답 ⑤

Level 1 기초 연습

본문 54~55쪽

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ③ | 2 ③ | 3 ⑤ | 4 ③ | 5 ② |
| 6 ⑤ | 7 ① | 8 ① | 9 ⑤ | |

$$1 \quad f'(x) = \frac{(x^2-2x)' \times (x+1) - (x^2-2x) \times (x+1)'}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{(2x-2)(x+1) - (x^2-2x)}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{x^2+2x-2}{(x+1)^2}$$

이므로

$$f'(1) = \frac{1}{4}$$

답 ③

$$2 \quad (g \circ f)(x) = e^{2x} \text{에서 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$g'(f(x))f'(x) = 2e^{2x}$$

$$x=0 \text{을 대입하면}$$

$$g'(f(0))f'(0) = 2$$

$$f(0)=1, f'(0)=2 \text{이므로}$$

$$g'(1) \times 2 = 2$$

$$\text{따라서 } g'(1) = 1$$

답 ③

$$3 \quad f(x) = 2 \sin^2 x - \cos^4 x \text{에서}$$

$$f'(x) = 2 \times 2 \sin x \times \cos x - 4 \cos^3 x \times (-\sin x)$$

$$= 4 \sin x \cos x + 4 \sin x \cos^3 x$$

$$\text{이므로}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2\sqrt{2}}{8} = 3$$

답 ⑤

$$4 \quad x = \ln 2t \text{에서 } \frac{dx}{dt} = \frac{(2t)'}{2t} = \frac{2}{2t} = \frac{1}{t}$$

$$y = t^2 - 6t \text{에서 } \frac{dy}{dt} = 2t - 6 \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t-6}{\frac{1}{t}}$$

$$= 2t^2 - 6t = 2\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{2} \quad (t > 0)$$

따라서 $\frac{dy}{dx}$ 는 $t = \frac{3}{2}$ 에서 최소이고 최소값은 $-\frac{9}{2}$ 이다.

답 ③

$$5 \quad x\left(y + \frac{1}{2}\right) = e^y \text{에서 } xy + \frac{1}{2}x = e^y$$

$$y \text{를 } x \text{의 함수로 보고 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$\frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}x\right) = \frac{d}{dx}(e^y)$$

$$y + x \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2} = e^y \frac{dy}{dx}$$

$$(e^y - x) \frac{dy}{dx} = y + \frac{1}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + \frac{1}{2}}{e^y - x} = \frac{2y + 1}{2(e^y - x)} \quad (\text{단, } e^y \neq x)$$

$$\text{따라서 점 } (2, 0) \text{에서의 접선의 기울기는 } -\frac{1}{2}$$

답 ②

$$6 \quad f(x) = \tan \frac{x}{2} \text{에서}$$

$$f'(x) = \sec^2 \frac{x}{2} \times \left(\frac{x}{2}\right)'$$

$$= \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2}$$

$$\text{따라서}$$

$$g'\left(f\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{1}{f'\left(\frac{\pi}{3}\right)} = \frac{1}{\frac{1}{2} \sec^2 \frac{\pi}{6}}$$

$$= 2 \cos^2 \frac{\pi}{6} = 2 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$= \frac{3}{2}$$

답 ⑤

$$7 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 5 \text{에서 } x \rightarrow 2 \text{일 때 (분모)} \rightarrow 0 \text{이고 극한값}$$

$$\text{이 존재하므로 (분자)} \rightarrow 0 \text{이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 2} \{f(x) - 3\} = 0 \text{이므로 } f(2) = 3$$

$$\text{또한 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = 5$$

$$f(2) = 3, f'(2) = 5 \text{이므로 } g(3) = 2 \text{이고}$$

정답과 풀이

$$g'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{5}$$

따라서

$$g(3) + g'(3) = 2 + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}$$

답 ①

$$\begin{aligned} 8 \quad f(x) &= (x+1)e^x \text{에서} \\ f'(x) &= (x+1)' \times e^x + (x+1) \times (e^x)' \\ &= e^x + (x+1)e^x \\ &= (x+2)e^x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= (x+2)' \times e^x + (x+2) \times (e^x)' \\ &= e^x + (x+2)e^x \\ &= (x+3)e^x \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(1-h) - f'(1)}{h} &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(1-h) - f'(1)}{-h} \\ &= -f''(1) \\ &= -4e \end{aligned}$$

답 ①

$$9 \quad f(x) = ax^2 + \sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right) \text{에서}$$

$$f'(x) = 2ax + 4 \cos\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$f''(x) = 2a - 16 \sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$$

이므로

$$\begin{aligned} f''\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 2a - 16 \sin\left(\frac{4}{3}\pi + \frac{\pi}{6}\right) \\ &= 2a - 16 \sin \frac{3}{2}\pi \\ &= 2a + 16 \end{aligned}$$

따라서 $2a + 16 = 20$ 에서

$$a = 2$$

답 ⑤

Level 2 기본 연습

본문 56~57쪽

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ② | 2 ③ | 3 ① | 4 ⑤ | 5 ① |
| 6 ③ | 7 ② | 8 ③ | | |

$$\begin{aligned} 1 \quad g(x) &= 4^{x^2+1} = (2^2)^{x^2+1} = (2^{x^2+1})^2 = \{f(x)\}^2 \text{에서} \\ g'(x) &= 2f(x)f'(x) \text{이므로} \\ \frac{g'(n)}{f'(n)} &= \frac{2f(n)f'(n)}{f'(n)} = 2f(n) = 2 \times 2^{n^2+1} = 2^{n^2+2} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } \log_2 \frac{g'(n)}{f'(n)} = n^2 + 2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^5 \log_2 \frac{g'(n)}{f'(n)} &= \sum_{n=1}^5 (n^2 + 2) \\ &= \frac{5 \times 6 \times 11}{6} + 2 \times 5 \\ &= 55 + 10 = 65 \end{aligned}$$

답 ②

참고

$$\begin{aligned} f(x) &= 2^{x^2+1} \text{에서} \\ f'(x) &= 2^{x^2+1} \ln 2 \times (x^2+1)' \\ &= 2x \times 2^{x^2+1} \ln 2 \\ &= x \times 2^{x^2+2} \ln 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= 4^{x^2+1} \text{에서} \\ g'(x) &= 4^{x^2+1} \ln 4 \times (x^2+1)' \\ &= 2x \times 4^{x^2+1} \times 2 \ln 2 \\ &= x \times 4^{x^2+2} \ln 2 \\ &= x \times 2^{2(x^2+2)} \ln 2 \end{aligned}$$

$$\frac{g'(n)}{f'(n)} = \frac{n \times 2^{2(n^2+2)} \ln 2}{n \times 2^{n^2+2} \ln 2} = 2^{n^2+2}$$

2 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=0$ 에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이므로 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 에서

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \times x \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \times \lim_{x \rightarrow 0} x \\ &= 1 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

이때

$$\begin{aligned} f'(a) &= f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+x^2)}{x} - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = 1 \end{aligned}$$

이므로 $b = f'(a) = 1$

$x \neq 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left\{ \frac{\ln(1+x^2)}{x} \right\}' \\ &= \frac{\{\ln(1+x^2)\}' \times x - \ln(1+x^2) \times (x)'}{x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{(1+x^2)'}{1+x^2} \times x - \ln(1+x^2) \times 1}{x^2} \\ &= \frac{\frac{2x^2}{1+x^2} - \ln(1+x^2)}{x^2} \\ &= \frac{2}{1+x^2} - \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \end{aligned}$$

이므로

$$f'(b) = f'(1) = 1 - \ln 2$$

답 ③

3 $t=t_1$ ($t_1>0$)에 대응하는 점의 좌표를 $(b, -2)$ 라 하면

$$b = \frac{2}{3}t_1\sqrt{t_1}, -2 = \frac{1}{2}t_1^2 + at_1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x = \frac{2}{3}t\sqrt{t} = \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \text{에서 } \frac{dx}{dt} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{2}t^{\frac{3}{2}-1} = t^{\frac{1}{2}} = \sqrt{t},$$

$$y = \frac{1}{2}t^2 + at \text{에서 } \frac{dy}{dt} = t + a \text{이므로}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t+a}{\sqrt{t}} \quad (\text{단, } t>0)$$

$t=t_1$ 에 대응하는 점에서의 접선이 직선 $y=-2$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = 0 \text{에서}$$

$$\frac{t_1+a}{\sqrt{t_1}} = 0, \text{ 즉 } t_1 = -a$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } -2 = \frac{1}{2} \times (-a)^2 + a \times (-a) = -\frac{1}{2}a^2$$

$$a^2 = 4$$

이때 $t_1 = -a > 0$ 에서 $a < 0$ 이므로 $a = -2, t_1 = 2$

$$b = \frac{2}{3} \times 2\sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{따라서 } ab = -\frac{8\sqrt{2}}{3}$$

답 ①

4 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 $|\tan x - 1| = 0$, 즉 $\tan x = 1$ 이라면

$$x = \frac{\pi}{4}$$

열린구간 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$g(x) = (x-a)(\tan x - 1)$ 이라 하면

$$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{4} \text{에서 } f(x) = -g(x)$$

$$\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{에서 } f(x) = g(x)$$

그러므로 함수 $f(x)$ 가 $x = \frac{\pi}{4}$ 에서 미분가능하면

$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 미분 가능하다.

함수 $g(x)$ 는 미분가능한 함수이고 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = g\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^-} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^-} \frac{-\left\{g(x) - g\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\}}{x - \frac{\pi}{4}} \\ &= -g'\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \frac{g(x) - g\left(\frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}} \\ &= g'\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 가 $x = \frac{\pi}{4}$ 에서 미분가능하려면

$$-g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = g'\left(\frac{\pi}{4}\right), \text{ 즉 } g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$$g'(x) = (\tan x - 1) + (x - a) \sec^2 x \text{이므로}$$

$$g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 + \left(\frac{\pi}{4} - a\right) \times 2 = 0 \text{에서 } a = \frac{\pi}{4}$$

$$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{4} \text{에서}$$

$$f(x) = \left(x - \frac{\pi}{4}\right) |\tan x - 1| = -\left(x - \frac{\pi}{4}\right) (\tan x - 1)$$

이고

$$f'(x) = -(\tan x - 1) - \left(x - \frac{\pi}{4}\right) \times \sec^2 x$$

따라서

$$f'(-a) = f'\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 2 + \frac{\pi}{2} \times 2 = \pi + 2$$

답 ⑤

5 $f(x) = e^{2x} - e^{-2x} + 1$ 에 대하여

$$f'(x) = 2e^{2x} + 2e^{-2x}$$

모든 실수 x 에 대하여 $2e^{2x} > 0, 2e^{-2x} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$f'(x) = 2e^{2x} + 2e^{-2x} \geq 2\sqrt{2e^{2x} \times 2e^{-2x}} = 4$$

(단, 등호는 $2e^{2x} = 2e^{-2x}$, 즉 $x=0$ 일 때 성립)

즉, $f'(x) \geq f'(0) = 4$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 역함수

$y = g(x)$ 에 대하여

$$g'(x) = \frac{1}{f'(y)} \leq \frac{1}{f'(0)} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 $f(0) = 1$ 에서 $g(1) = 0$ 이므로

$$f'(0) = \frac{1}{g'(1)} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

정답과 풀이

㉠, ㉡에서

$$g'(x) \leq \frac{1}{f'(0)} = g'(1)$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > f'(0)$ 을 만족시키므로 역함수 $g(x)$ 는 $x \neq 1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x) < g'(1)$ 이다.

따라서 $a=1$ 이고

$$g'(a) = g'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{4}$$

이므로

$$a + g'(a) = \frac{5}{4}$$

답 ①

6 함수 $f(x) = \cos 3x - 2 \sin 3x$ 에서

$$f'(x) = -3 \sin 3x - 6 \cos 3x$$

$$f''(x) = -9 \cos 3x + 18 \sin 3x$$

$$f(x) = f''(x) \text{에서}$$

$$\cos 3x - 2 \sin 3x = -9 \cos 3x + 18 \sin 3x$$

$$\cos 3x = 2 \sin 3x$$

이때 $\cos 3x = 0$ 이면 $\sin 3x = 0$ 이고

$\sin^2 3x + \cos^2 3x \neq 1$ 이 되어 모순이다.

그러므로 $\cos 3x \neq 0$ 이다.

$\cos 3x = 2 \sin 3x$ 의 양변을 $\cos 3x$ 로 나누면


$$\tan 3x = \frac{1}{2}$$

$3x = X$ 라 하면 $0 \leq X \leq 3\pi$ 이고 함수 $y = \tan X$ 의 주기가 π 이므로 그림과 같이 함수 $y = \tan X$ 의 그래프와 직선

$y = \frac{1}{2}$ 이 서로 다른 세 점에서 만난다. 이때 $\tan 3x = \frac{1}{2}$ 의

세 실근이 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 이므로 $\tan X = \frac{1}{2}$ 의 세 실근은 $3\alpha_1,$

$3\alpha_2, 3\alpha_3$ 이다.



$\tan X = \frac{1}{2}$ 에서

$$\frac{\sin X}{\cos X} = \frac{1}{2}, \text{ 즉 } \cos X = 2 \sin X$$

$$\sin^2 X + \cos^2 X = 1 \text{에서 } \sin^2 X + 4 \sin^2 X = 1$$

$$\sin^2 X = \frac{1}{5} \text{이므로 } \sin X = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ 또는 } \sin X = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$0 < 3\alpha_1 < \frac{\pi}{2} \text{이고 } 3\alpha_2 = 3\alpha_1 + \pi, 3\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\pi \text{이므로}$$

$$\sin(3\alpha_1) = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\sin(3\alpha_2) = \sin(3\alpha_1 + \pi) = -\sin(3\alpha_1) = -\frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\sin(3\alpha_3) = \sin(3\alpha_1 + 2\pi) = \sin(3\alpha_1) = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

따라서

$$\sin(3\alpha_1) - \sin(3\alpha_2) + \sin(3\alpha_3) = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

답 ③

$$7 \quad g(x) = \frac{f(x)+1}{\sin^2(\pi x)+1} \text{에서}$$

$$g'(x)$$

$$= \frac{f'(x)\{\sin^2(\pi x)+1\} - \{f(x)+1\} \times 2\pi \sin(\pi x) \cos(\pi x)}{\{\sin^2(\pi x)+1\}^2}$$

..... ㉠

조건 (가)의 양변을 미분하면

$$-g'(-x) = -g'(x), \text{ 즉 } g'(-x) = g'(x) \quad \text{..... ㉡}$$

조건 (가)에서 모든 실수 x 에 대하여 $g(-x) = -g(x)$, 즉 $g(x) = -g(-x)$ 이므로

$$\frac{f(x)+1}{\sin^2(\pi x)+1} = -\frac{f(-x)+1}{\sin^2(-\pi x)+1}$$

$$f(x)+1 = -f(-x)-1$$

$$\text{즉, } f(x)+f(-x) = -2$$

..... ㉢

㉢에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)+f(0) = -2 \text{에서 } f(0) = -1$$

$$\text{조건 (나)에서 } f(-1) = f(0) + 4 = 3$$

$$\text{㉢에 } x=1 \text{을 대입하면 } f(1)+f(-1) = -2 \text{에서}$$

$$f(1) = -5$$

㉠에서 $g'(1) = g'(-1)$ 이고 ㉠에서 $g'(-1) = f'(-1)$ 이므로

$$g'(1) = f'(-1)$$

..... ㉣

$$\text{조건 (나)에서 } f'(-1) = f(1) + 3 = -2$$

..... ㉤

$$\text{㉣, ㉤에서 } g'(1) = -2$$

답 ②

8 직선 $y = -2x + t$ 가 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 두 점의 x 좌표가 각각 $\alpha(t), \beta(t)$ ($\alpha(t) > 0, \beta(t) < 0$)이므로

$$\log_2 \{\alpha(t)+1\} = -2\alpha(t)+t \quad \text{..... ㉠}$$

$$\{\beta(t)\}^2 = -2\beta(t)+t \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\log_2 \{\alpha(t)+1\} + 2\alpha(t) = \{\beta(t)\}^2 + 2\beta(t) \quad \text{..... ㉢}$$

$\alpha(k) = 3$ 이라 하면 구하는 기울기는 $t = k$ 일 때

$\frac{dy}{dx} = \frac{\beta'(t)}{\alpha'(t)}$ 의 값, 즉 $\frac{\beta'(k)}{\alpha'(k)}$ 이다.

㉔에서 $\{\beta(k)\}^2 + 2\beta(k) - 8 = 0$

$\{\beta(k) + 4\}\{\beta(k) - 2\} = 0$

$\beta(k) < 0$ 이므로 $\beta(k) = -4$

㉕의 양변을 미분하면

$$\frac{\alpha'(t)}{\{\alpha(t) + 1\} \ln 2} = -2\alpha'(t) + 1$$

이 식에 $t = k$ 를 대입하면 $\alpha(k) = 3$ 이므로

$$\frac{\alpha'(k)}{4 \ln 2} = -2\alpha'(k) + 1, \text{ 즉 } \alpha'(k) = \frac{4 \ln 2}{8 \ln 2 + 1}$$

㉔의 양변을 미분하면 $2\beta(t)\beta'(t) = -2\beta'(t) + 1$

이 식에 $t = k$ 를 대입하면 $\beta(k) = -4$ 이므로

$$-8\beta'(k) = -2\beta'(k) + 1, \text{ 즉 } \beta'(k) = -\frac{1}{6}$$

따라서 구하는 기울기는

$$\begin{aligned} \frac{\beta'(k)}{\alpha'(k)} &= \beta'(k) \times \frac{1}{\alpha'(k)} = -\frac{1}{6} \times \frac{8 \ln 2 + 1}{4 \ln 2} \\ &= -\frac{8 \ln 2 + 1}{24 \ln 2} \end{aligned}$$

답 ③

Level 3 실력 완성

본문 58쪽

1 ⑤ 2 12 3 ⑤

1 조건 (가)에서 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$g(x) = \ln |f(x) + 1|$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + 1 \neq 0$ 이다.

이때 조건 (나)에서 $1 \leq f(2) < 10$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) > -1 \quad \dots\dots ㉑$$

$$g(x) = \ln |f(x) + 1| = \ln \{f(x) + 1\}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = 4$ 에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$ 이므로 $g(1) = 0$

$g(1) = \ln \{f(1) + 1\} = 0$ 에서 $f(1) + 1 = 1$ 이므로

$$f(1) = 0 \quad \dots\dots ㉒$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x-1} = g'(1) = 4$$

이고 $g(x) = \ln \{f(x) + 1\}$ 에서 $g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x) + 1}$

$$g'(1) = \frac{f'(1)}{f(1) + 1} = \frac{f'(1)}{0 + 1} = f'(1) \text{이므로}$$

$$f'(1) = 4 \quad \dots\dots ㉓$$

㉒, ㉓에서 $f(1) = 0$, $f'(1) \neq 0$ 이므로 이차함수 $f(x)$ 를 $f(x) = a(x-1)(x-b)$ (a, b 는 상수, $a \neq 0, b \neq 1$)

로 놓을 수 있다.

이때 ㉑을 만족시키려면 $a > 0$ 이어야 한다.

$$f'(x) = a\{(x-b) + (x-1)\}$$

㉓에서 $f'(1) = a(1-b) = 4$ 이므로

$$b = 1 - \frac{4}{a} \quad \dots\dots ㉔$$

곡선 $y = f(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표는 $\frac{1+b}{2}$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 최솟값은

$$f\left(\frac{1+b}{2}\right) = a \times \frac{b-1}{2} \times \frac{1-b}{2} = \frac{a}{4} \times \left(-\frac{4}{a}\right) \times \frac{4}{a} = -\frac{4}{a}$$

㉕에서 $-\frac{4}{a} > -1$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a > 4$

$$f(2) = a \times 1 \times \left(1 + \frac{4}{a}\right) = a + 4 > 8$$

이고 조건 (나)에서 $f(2)$ 는 10보다 작은 자연수이므로

$$f(2) = 9$$

$$\text{즉, } f(2) = a + 4 = 9 \text{에서 } a = 5$$

$$\text{㉔에서 } b = \frac{1}{5}$$

따라서 $f(x) = 5(x-1)\left(x - \frac{1}{5}\right) = (x-1)(5x-1)$ 이고

$g(x) = \ln \{(x-1)(5x-1) + 1\}$ 이므로

$$g(3) = \ln (2 \times 14 + 1) = \ln 29$$

답 ⑤

2 $f(x) = (x^2 + a)e^{-2x}$ 에서

$$f'(x) = 2xe^{-2x} - 2(x^2 + a)e^{-2x} = -2(x^2 - x + a)e^{-2x}$$

$f^{-1}(c) = k$ 라 하면 $f(k) = c$ 이고,

$$f'(k) \neq 0 \text{이면 } (f^{-1})'(c) = \frac{1}{f'(k)} \text{이므로 조건 (가)를 만}$$

족시키지 않는다.

그러므로 조건 (가)를 만족시키려면 $f'(k) = 0$ 이고

$f'(x) = 0$ 인 x 가 $x = k$ 뿐이어야 한다.

$$f'(x) = -2(x^2 - x + a)e^{-2x} = 0 \text{에서 } x^2 - x + a = 0$$

이차방정식 $x^2 - x + a = 0$ 의 실근이 $x = k$ 뿐이어야 하므로

$$x^2 - x + a = (x-k)^2 = x^2 - 2kx + k^2$$

$$2k = 1 \text{이고 } a = k^2$$

$$k = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{4}$$

이때

$$f(x) = \left(x^2 + \frac{1}{4}\right)e^{-2x},$$

$$f'(x) = -2\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right)e^{-2x} = -2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 e^{-2x}$$

정답과 풀이

$$c=f(k)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)e^{-1}=\frac{1}{2e}$$

$$g(x)=x^3+bx \text{에서 } g'(x)=3x^2+b$$

$$h=f \circ g \text{에서 } h^{-1}=(f \circ g)^{-1}=g^{-1} \circ f^{-1} \text{이고}$$

$$g(0)=0 \text{에서 } g^{-1}(0)=0 \text{이므로}$$

$$h^{-1}(f(0))=g^{-1}(f^{-1}(f(0))) \\ =g^{-1}(0)=0$$

그러므로

$$(h^{-1})'(f(0))=\frac{1}{h'(h^{-1}(f(0)))} \\ =\frac{1}{h'(0)}=\frac{1}{f'(g(0))g'(0)} \\ =\frac{1}{f'(0)g'(0)}=\frac{1}{-\frac{1}{2} \times b}=-12e$$

$$\text{에서 } b=\frac{1}{6e}$$

$$\text{따라서 } \frac{c}{ab}=\frac{\frac{1}{2e}}{\frac{1}{4} \times \frac{1}{6e}}=12$$

참고

$$\text{두 함수 } f(x)=\left(x^2+\frac{1}{4}\right)e^{-2x}, g(x)=x^3+\frac{1}{6e}x \text{는}$$


모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x)=-2\left(x-\frac{1}{2}\right)e^{-2x} \leq 0, g'(x)=3x^2+\frac{1}{6e} > 0$$

이므로 각각 역함수가 존재한다.

3. ㄱ. 함수 $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}}=8$ 이다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 점 $(t, f(t))$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선 중 $x \geq t$ 인 부분을 나타내면 그림과 같다.



이때 $t > 0$ 에서 함수 $g(t)$ 는

$$0 < t < 2 \text{일 때, } t_1=4-t \text{이므로 } g(t)=4-2t$$

$$2 \leq t < 6 \text{일 때, } t_1=12-t \text{이므로 } g(t)=12-2t$$

⋮

이때

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} g(t)=0, \lim_{t \rightarrow 2^+} g(t)=8, g(2)=8$$

$$\text{이므로 } \alpha_1=2, g(\alpha_1)=g(2)=8 \text{에서}$$

$$\alpha_1+g(\alpha_1)=10 \text{ (참)}$$


$$\text{ㄴ. } 0 < t < 2 \text{일 때, } g(t)=4-2t$$

$$4n-2 \leq t < 4n+2 \ (n=1, 2, 3, \dots) \text{일 때,}$$

$$\frac{t+t_1}{2}=4n+2 \text{에서 } t_1=8n+4-t \text{이므로}$$

$$g(t)=t_1-t=8n+4-2t$$

함수 $y=g(t)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$$\alpha_k=4k-2 \ (k=1, 2, 3, \dots) \text{이므로}$$

모든 자연수 k 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow \alpha_k^-} g(t)=\lim_{t \rightarrow (4k-2)^-} g(t)=0,$$

$$g(\alpha_k)=g(4k-2)=8$$

$$\text{이므로 } g(\alpha_k)-\lim_{t \rightarrow \alpha_k^-} g(t)=8 \text{ (참)}$$

$$\text{ㄷ. } h(t)=g(\sqrt{t}) \text{라 하면}$$

$$0 < t < 2^2 \text{일 때, } h(t)=g(\sqrt{t})=4-2\sqrt{t} \text{이고}$$

$$h'(t)=-2 \times \frac{1}{2\sqrt{t}}=-\frac{1}{\sqrt{t}} \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$(4n-2)^2 \leq t < (4n+2)^2 \ (n=1, 2, 3, \dots) \text{일 때,}$$

$$h(t)=g(\sqrt{t})=8n+4-2\sqrt{t} \text{이고}$$

$$h'(t)=-2 \times \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{t}} \text{ (단, } t \neq (4n-2)^2) \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$0 < \alpha_1=2 < 2^2$ 이고, $\alpha_k=4k-2 \ (k=2, 3, 4, \dots)$ 는 모든 자연수 n 에 대하여

$$\alpha_k=4k-2 \neq (4n-2)^2$$

이므로 ㉑, ㉒에서

$$h'(\alpha_k)=-\frac{1}{\sqrt{\alpha_k}} \ (k=1, 2, 3, \dots)$$

그러므로

$$\lim_{t \rightarrow \alpha_k} \frac{t-\alpha_k}{g(\sqrt{t})-g(\sqrt{\alpha_k})}=\lim_{t \rightarrow \alpha_k} \frac{1}{\frac{h(t)-h(\alpha_k)}{t-\alpha_k}}$$

$$=\frac{1}{h'(\alpha_k)}=-\sqrt{\alpha_k}$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{10} \left\{ \lim_{t \rightarrow \alpha_k} \frac{t-\alpha_k}{g(\sqrt{t})-g(\sqrt{\alpha_k})} \right\}^2 = \sum_{k=1}^{10} (-\sqrt{\alpha_k})^2 = \sum_{k=1}^{10} (4k-2) \\ = \frac{10(2+38)}{2} = 200 \text{ (참)}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ⑤

05 도함수의 활용

유제

본문 61~69쪽

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 ⑤ | 2 ⑤ | 3 ⑤ | 4 8 | 5 10 |
| 6 ③ | 7 7 | 8 ⑤ | 9 ④ | |

- 1 $f(x) = \cos 2x + 1$ 에서 $f'(x) = -2 \sin 2x$
 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{2} + 1 = 1$
 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2 \sin \frac{\pi}{2} = -2$
 그러므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\left(\frac{\pi}{4}, 1\right)$ 에서의 접선의 방정식은
 $y-1 = -2\left(x-\frac{\pi}{4}\right), y = -2x + \frac{\pi}{2} + 1$
 이 직선이 점 $\left(\frac{1}{2}, a\right)$ 를 지나므로
 $a = -1 + \frac{\pi}{2} + 1 = \frac{\pi}{2}$

답 ⑤

- 2 곡선 $x^2 - xy - 2y^2 = a^2$ 에 $y=0$ 을 대입하면 $x^2 = a^2$
 $x=a$ 또는 $x=-a$
 그러므로 두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(-a, 0), (a, 0)$ 이다.
 $x^2 - xy - 2y^2 = a^2$ 에서 y 를 x 의 함수로 보고 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $\frac{d}{dx}(x^2) - \frac{d}{dx}(xy) - \frac{d}{dx}(2y^2) = \frac{d}{dx}(a^2)$
 $2x - \left(y + x \frac{dy}{dx}\right) - 4y \frac{dy}{dx} = 0$
 $(x+4y) \frac{dy}{dx} = 2x-y$
 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-y}{x+4y}$ (단, $x \neq -4y$)
 $a \neq 0$ 이므로 두 점 $(-a, 0), (a, 0)$ 에서의 접선의 기울기는 각각
 $\frac{-2a-0}{-a+0} = 2, \frac{2a-0}{a+0} = 2$
 두 점 $(-a, 0), (a, 0)$ 에서의 두 접선 l_1, l_2 의 방정식은 각각
 $y=2(x+a), y=2(x-a)$
 즉, $y=2x+2a, y=2x-2a$

평행한 두 직선 $y=2x+2a, y=2x-2a$ 사이의 거리는 점 $(-a, 0)$ 과 직선 $y=2x-2a$ 사이의 거리와 같다. 즉, 점 $(-a, 0)$ 과 직선 $2x-y-2a=0$ 사이의 거리가 4이므로

$$\frac{|2 \times (-a) - 1 \times 0 - 2a|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 4$$


$$a > 0 \text{이므로 } 4a = 4\sqrt{5}$$

$$\text{따라서 } a = \sqrt{5}$$

답 ⑤

- 3 $f(x) = ax^2 + \cos x$ 에서
 $f'(x) = 2ax - \sin x, f''(x) = 2a - \cos x$
 변곡점 P의 x 좌표가 $\frac{2}{3}\pi$ 이므로
 $f''\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 2a - \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$
 에서 $a = -\frac{1}{4}$
 점 P에서의 접선의 기울기는
 $f'\left(\frac{2}{3}\pi\right) = 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times \frac{2}{3}\pi - \sin \frac{2}{3}\pi$
 $= -\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{6}$

점 P에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점 A, B에 대하여 $\frac{\overline{OB}}{\overline{OA}}$ 는 직선 AB의 기울기의 절댓값과 같으므로



$$\frac{\overline{OB}}{\overline{OA}} = \left| f'\left(\frac{2}{3}\pi\right) \right| = \frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{6}$$

답 ⑤

참고


$f''(x) = -\frac{1}{2} - \cos x$ 에서 $x = \frac{2}{3}\pi$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 점 P는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

- 4 $f(x) = x + \frac{4}{x^2} = x + 4x^{-2}$ 에서
 $f'(x) = 1 - 8x^{-3} = \frac{x^3 - 8}{x^3} = \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{x^3}$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 2$

정답과 풀이

$1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| | | | | | |
|---------|---|------------|---|------------|----------------|
| x | 1 | ... | 2 | ... | 3 |
| $f'(x)$ | | - | 0 | + | |
| $f(x)$ | 5 | \searrow | 3 | \nearrow | $\frac{31}{9}$ |




따라서 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 최대이고 최댓값 $M=5$, $x=2$ 에서 최소이고 최솟값 $m=3$ 이므로 $M+m=8$

답 8

- 5 $f(x)=x^2e^{-x}$ 에서
 $f'(x)=2xe^{-x}+x^2 \times e^{-x} \times (-1)=2xe^{-x}-x^2e^{-x}$
 $=x(2-x)e^{-x}$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$
 그러므로 $g(0)=0$, $g(2)=0$
 $t \neq 0$, $t \neq 2$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (t, t^2e^{-t}) 에서의 접선의 방정식은
 $y=t(2-t)e^{-t}(x-t)+t^2e^{-t}$
 $y=t(2-t)e^{-t}x+t^2(t-1)e^{-t}$
 이므로 이 접선의 x 절편은
 $g(t)=\frac{t^2-t}{t-2}$ (단, $t \neq 0$, $t \neq 2$)
 이때 $g(0)=0$ 이므로
 $g(t)=\begin{cases} \frac{t^2-t}{t-2} & (t \neq 2) \\ 0 & (t=2) \end{cases}$
 $g'(t)=\frac{(2t-1)(t-2)-(t^2-t)}{(t-2)^2}=\frac{t^2-4t+2}{(t-2)^2}$ ($t \neq 2$)
 $g'(t)=0$ 에서 $t^2-4t+2=0$, $t=2 \pm \sqrt{2}$
 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 함수 $g(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| | | | | | |
|---------|----------------|------------|---------------|------------|---|
| t | -1 | ... | $2-\sqrt{2}$ | ... | 1 |
| $g'(t)$ | | + | 0 | - | |
| $g(t)$ | $-\frac{2}{3}$ | \nearrow | $3-2\sqrt{2}$ | \searrow | 0 |



닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $g(t)$ 는 $t=2-\sqrt{2}$ 에서 최대이고 최댓값은 $3-2\sqrt{2}$, $t=-1$ 에서 최소이고 최솟값은 $-\frac{2}{3}$ 이다.

따라서 최댓값과 최솟값의 합은

$$3-2\sqrt{2}+\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{7}{3}-2\sqrt{2}$$

$$\text{이므로 } m=\frac{7}{3}, n=-2$$

따라서


$$30(m+n)=30\left\{\frac{7}{3}+(-2)\right\}=10$$

답 10

- 6 $e^x > 0$ 이므로 방정식 $x+ke^{-x}=0$ 의 실근은 방정식 $xe^x+k=0$ 의 실근과 같다.
 $xe^x=-k$ 에서 $f(x)=xe^x$ 이라 하면 방정식 $x+ke^{-x}=0$ 의 실근이 존재하기 위해서는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=-k$ 가 만나야 한다.
 $f'(x)=e^x+xe^x=(1+x)e^x$
 $f'(x)=0$ 에서 $x=-1$
 실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| | | | |
|---------|------------|----------------|------------|
| x | ... | -1 | ... |
| $f'(x)$ | - | 0 | + |
| $f(x)$ | \searrow | $-\frac{1}{e}$ | \nearrow |

이때 $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x=0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^x=\infty$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 방정식 $x+ke^{-x}=0$ 의 실근이 존재하려면

$$-k \geq -\frac{1}{e}, \text{ 즉 } k \leq \frac{1}{e}$$

이므로 k 의 최댓값은 $\frac{1}{e}$ 이다.

답 ③

7 $\tan x - \sqrt{3} \geq 4x - k$ 에서 $4x - \tan x + \sqrt{3} - k \leq 0$

$f(x) = 4x - \tan x + \sqrt{3} - k$ 라 하면

$$f'(x) = 4 - \sec^2 x = 4 - \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$= \frac{(2 \cos x + 1)(2 \cos x - 1)}{\cos^2 x}$$

$0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $\cos x = \frac{1}{2}$, $x = \frac{\pi}{3}$

$0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| x | 0 | ... | $\frac{\pi}{3}$ | ... | $(\frac{\pi}{2})$ |
|---------|----------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| $f'(x)$ | | + | 0 | - | |
| $f(x)$ | $\sqrt{3} - k$ | \nearrow | $\frac{4}{3}\pi - k$ | \searrow | |

$0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$4x - \tan x + \sqrt{3} - k \leq 0$ 이 성립하려면

$$\frac{4}{3}\pi - k \leq 0$$

$k \geq \frac{4}{3}\pi$ 이므로 k 의 최솟값은 $\frac{4}{3}\pi$ 이다.

따라서 $p = 3$, $q = 4$ 이므로

$$p + q = 3 + 4 = 7$$

답 7

8 $x = t + \sin t$ 에서 $\frac{dx}{dt} = 1 + \cos t$, $\frac{d^2x}{dt^2} = -\sin t$

$y = \cos 2t$ 에서 $\frac{dy}{dt} = -2 \sin 2t$, $\frac{d^2y}{dt^2} = -4 \cos 2t$

이므로 시각 t 에서의 점 P의 가속도의 크기는

$$\sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{(-\sin t)^2 + (-4 \cos 2t)^2}$$

$$= \sqrt{\sin^2 t + 16 \cos^2 2t}$$

따라서 $t = \frac{\pi}{2}$ 에서의 점 P의 가속도의 크기는

$$\sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

답 ⑤

9 $x = at - \ln t$ 에서 $\frac{dx}{dt} = a - \frac{1}{t}$

$y = \ln t$ 에서 $\frac{dy}{dt} = \frac{1}{t}$

이므로 시각 t ($t > 0$)에서의 점 P의 속력은

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{\left(a - \frac{1}{t}\right)^2 + \left(\frac{1}{t}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{t^2} - \frac{2a}{t} + a^2}$$

$$= \sqrt{2\left(\frac{1}{t} - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{2}}$$

따라서 $\frac{1}{t} = \frac{a}{2}$, 즉 $t = \frac{2}{a}$ 에서 점 P의 속력은 최소이고 최솟값은

$$\sqrt{\frac{a^2}{2}} = 2$$

$$a^2 = 8$$

$a > 0$ 이므로 $a = 2\sqrt{2}$

답 ④

Level 1 기초 연습

본문 70~71쪽

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 ② | 2 ② | 3 ① | 4 ⑤ | 5 ② |
| 6 ② | 7 ② | 8 ④ | 9 ④ | |

1 $f(x) = \ln x$ 라 하면 $f'(x) = \frac{1}{x}$

곡선 $y = \ln x$ 위의 점 $(t, \ln t)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - \ln t = f'(t)(x - t)$$

$$y - \ln t = \frac{1}{t}(x - t)$$

$$y = \frac{1}{t}x - 1 + \ln t$$

이 직선이 $y = mx$ 와 같으려면

$$m = \frac{1}{t}, -1 + \ln t = 0$$

$$-1 + \ln t = 0 \text{에서 } t = e$$

$$\text{따라서 } m = \frac{1}{e}$$

답 ②

2 $x = e^{t-1}$ 에서 $\frac{dx}{dt} = e^{t-1}$

$$y = e^{-2t} + t \text{에서 } \frac{dy}{dt} = -2e^{-2t} + 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2e^{-2t} + 1}{e^{t-1}}$$

정답과 풀이

$t=0$ 일 때

$$x=e^{0-1}=\frac{1}{e}, y=e^0+0=1,$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-2e^0+1}{e^{0-1}}=-e$$

이므로 점 $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-1=-e\left(x-\frac{1}{e}\right)$$

$$y=-ex+2$$

이 직선이 점 $(1, a)$ 를 지나므로

$$a=-e+2$$

답 ②

3 $f(x)=x+\frac{4}{x}=x+4x^{-1}$ 에서

$$f'(x)=1-4x^{-2}$$

$$=\frac{x^2-4}{x^2}=\frac{(x+2)(x-2)}{x^2}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-2 \text{ 또는 } x=2$$

$x \neq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| x | ... | -2 | ... | (0) | ... | 2 | ... |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|
| $f'(x)$ | + | 0 | - | | - | 0 | + |
| $f(x)$ | ↗ | -4 | ↘ | | ↘ | 4 | ↗ |


따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극대이고 극댓값

$a=-4$, $x=2$ 에서 극소이고 극솟값 $\beta=4$ 이므로

$$a-\beta=-4-4=-8$$

답 ①

참고



4 $f(x)=e^{\sin 3x+kx}$ 에서

$$f'(x)=e^{\sin 3x+kx} \times (\sin 3x+kx)'$$

$$=e^{\sin 3x+kx} \times (3 \cos 3x+k)$$

$$e^{\sin 3x+kx} > 0 \text{이므로 } f'(x)=0 \text{에서}$$

$$3 \cos 3x+k=0$$

$-3 \leq 3 \cos 3x \leq 3$ 이고, 함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하려면 $3 \cos 3x+k=0$ 을 만족시키는 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌어야 하므로

$$-3 < -k < 3, \text{ 즉 } -3 < k < 3$$

이어야 한다.

따라서 정수 k 는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 이고 그 개수는 5이다.

답 ⑤

5 $f(x)=\frac{1}{x^2+1}=(x^2+1)^{-1}$ 이라 하면

$$f'(x)=-(x^2+1)^{-2} \times 2x=-\frac{2x}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x)=-\frac{2(x^2+1)^2-2x \times 2(x^2+1) \times 2x}{(x^2+1)^4}$$

$$=-\frac{2(x^2+1)-8x^2}{(x^2+1)^3}$$

$$=\frac{2(\sqrt{3}x+1)(\sqrt{3}x-1)}{(x^2+1)^3}$$

$$f''(x)=0 \text{에서 } x=-\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 또는 } x=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

이때 $x < -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $x > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 에서 $f''(x) > 0$ 이고,

$-\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ 에서 $f''(x) < 0$ 이다.

또한 $f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{3}{4}$ 이므로 두 변곡점 A, B의 좌표는

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$$

따라서 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

답 ②

6 $f(x)=\cos x+x \sin x$ 에서

$$f'(x)=-\sin x+(\sin x+x \cos x)=x \cos x$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } \cos x=0$$

$$0 < x < 2\pi \text{에서 } \cos x=0 \text{이라면 } x=\frac{\pi}{2} \text{ 또는 } x=\frac{3\pi}{2}$$

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| x | 0 | ... | $\frac{\pi}{2}$ | ... | $\frac{3\pi}{2}$ | ... | 2π |
|---------|---|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|--------|
| $f'(x)$ | | + | 0 | - | 0 | + | |
| $f(x)$ | 1 | ↗ | $\frac{\pi}{2}$ | ↘ | $-\frac{3\pi}{2}$ | ↗ | 1 |

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=\frac{\pi}{2}$ 에서 극대이고

극댓값은 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$ 에서 극소이고 극솟값은

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right)=-\frac{3}{2}\pi$$

또한 $f(0)=1$, $f(2\pi)=1$ 이다.

따라서 최댓값 $M=\frac{\pi}{2}$, 최솟값 $m=-\frac{3}{2}\pi$ 이므로

$$M \times m = -\frac{3}{4}\pi^2$$

답 ②

7 $x=\ln 3x+k$ 에서 $x-\ln 3x=k$

$f(x)=x-\ln 3x$ 라 하면 방정식 $x=\ln 3x+k$ 가 오직 하나의 실근을 가지려면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1이어야 한다.

$$f'(x)=1-\frac{3}{3x}=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$$


$$f'(x)=0 \text{에서 } x=1$$

$x>0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| x | (0) | ... | 1 | ... |
|---------|-----|------------|-----------|------------|
| $f'(x)$ | | - | 0 | + |
| $f(x)$ | | \searrow | $1-\ln 3$ | \nearrow |

이때 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x-\ln 3x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (x-\ln 3x) = \infty$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수가 1이려면

$$k=1-\ln 3=\ln e-\ln 3=\ln \frac{e}{3}$$

답 ②

8 $ke^{x-2} \geq x$ 에서 $k \geq xe^{2-x}$

$f(x)=xe^{2-x}$ 이라 하면

$$f'(x)=e^{2-x}+x \times e^{2-x} \times (-1)$$

$$=(1-x)e^{2-x}$$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=1$$

실수 전체의 집합에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| | | | |
|---------|------------|-----|------------|
| x | \cdots | 1 | \cdots |
| $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ |
| $f(x)$ | \nearrow | e | \searrow |

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이면서 최대이고 최댓값은

$$f(1)=e$$

이므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $ke^{x-2} \geq x$, 즉

$k \geq xe^{2-x}$ 이 성립하려면 k 는 $f(x)$ 의 최댓값보다 크거나 같아야 한다. 즉,

$$k \geq f(1)=e$$

따라서 실수 k 의 최솟값은 e 이다.

답 ④

9 $x=e^t+e^{-t}$ 에서 $\frac{dx}{dt}=e^t-e^{-t}$

$$y=e^t-e^{-t} \text{에서 } \frac{dy}{dt}=e^t+e^{-t}$$

이므로 시각 t 에서의 점 P의 속력은

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{(e^t - e^{-t})^2 + (e^t + e^{-t})^2}$$

$$= \sqrt{2(e^{2t} + e^{-2t})}$$

따라서 $t=\ln 2$ 에서의 점 P의 속력은

$$\sqrt{2(e^{2\ln 2} + e^{-2\ln 2})} = \sqrt{2\left(4 + \frac{1}{4}\right)} = \frac{\sqrt{34}}{2}$$

답 ④

Level 2 기본 연습

본문 72~73쪽

- 1 ② 2 ② 3 ④ 4 ④ 5 ③
6 ③ 7 ② 8 ⑤

1 함수 $f(x)$ 가 이계도함수를 가지며 $f'(1)=0$ 이므로

$$f''(1)=-1+a+2=a+1<0, \text{ 즉 } a<-1$$

이면 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대이다.

$$\text{한편 } a=-1 \text{일 때, } f''(x)=-x-\frac{1}{x}+2=-\frac{(x-1)^2}{x}$$

므로 $x=1$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 음이다.

이때 $x=1$ 의 좌우에서 함수 $f'(x)$ 는 감소하고 $f'(1)=0$

이므로 $x=1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀐다. 그러므로 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이다.

따라서 $a \leq -1$ 이므로 정수 a 의 최댓값은 -1 이다.

답 ②

정답과 풀이

- 2 $f(x) = \left(\frac{1}{5}x^2 - x + a\right)\sqrt{x}$ 에서
 $f'(x) = \left(\frac{2}{5}x - 1\right)\sqrt{x} + \left(\frac{1}{5}x^2 - x + a\right) \times \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$

$$= \frac{2x\left(\frac{2}{5}x - 1\right) + \left(\frac{1}{5}x^2 - x + a\right)}{2\sqrt{x}}$$

$$= \frac{x^2 - 3x + a}{2\sqrt{x}}$$

 함수 $f(x)$ 가 $x=2$ 에서 극값을 가지므로
 $f'(2) = \frac{4 - 6 + a}{2\sqrt{2}} = 0$
 $a = 2$
 그러므로 $f(x) = \left(\frac{1}{5}x^2 - x + 2\right)\sqrt{x}$,
 $f'(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{2\sqrt{x}} = \frac{(x-1)(x-2)}{2\sqrt{x}}$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x=1$ 또는 $x=2$
 $x \geq 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| | | | | | | |
|---------|---|-----|---------------|-----|-----------------------|-----|
| x | 0 | ... | 1 | ... | 2 | ... |
| $f'(x)$ | | + | 0 | - | 0 | + |
| $f(x)$ | 0 | ↗ | $\frac{6}{5}$ | ↘ | $\frac{4\sqrt{2}}{5}$ | ↗ |

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이고 극댓값은

$$f(1) = \frac{6}{5}$$

답 ②

- 3 원점 O와 점 $A(t, 0)$ 을 이은 선분 OA를 1 : 2로 내분하는 점이 B이고, 점 B를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = e^{-x}$ 과 만나는 점이 C이므로
 $B\left(\frac{1}{3}t, 0\right), C\left(\frac{1}{3}t, e^{-\frac{1}{3}t}\right)$
 삼각형 OAC의 넓이를 $f(t)$ 라 하면
 $f(t) = \frac{1}{2} \times t \times e^{-\frac{1}{3}t} = \frac{1}{2}te^{-\frac{t}{3}}$
 $f'(t) = \frac{1}{2}\left(e^{-\frac{t}{3}} - \frac{1}{3}te^{-\frac{t}{3}}\right) = \frac{1}{6}(3-t)e^{-\frac{t}{3}}$
 $f'(t) = 0$ 에서 $t=3$ 이고 $0 < t < 3$ 에서 $f'(t) > 0$, $t > 3$ 에서 $f'(t) < 0$ 이므로 함수 $f(t)$ 는 $t=3$ 에서 극대이면서 최대이고 최댓값은
 $f(3) = \frac{3}{2} \times e^{-1} = \frac{3}{2e}$

답 ④

- 4 함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 좌표를 $A(p, 0)$ 이라 하자.

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 서로 역함수 관계이므로

$$g(p) = 0 \text{에서 } f(0) = p$$

$$f(x) = ax + \ln(3x+1) + 2 \text{에서}$$

$$f(0) = 0 + \ln 1 + 2 = 2 \text{이므로}$$

$$p = 2 \text{이고 점 } A(2, 0) \text{이다.}$$

함수 $y = g(x)$ 의 그래프 위의 점 $A(2, 0)$ 에서의 접선이 점 $(7, 1)$ 을 지나므로 이 접선의 기울기는

$$g'(2) = \frac{1-0}{7-2} = \frac{1}{5}$$

$$g(2) = 0, f(0) = 2$$

이므로 역함수의 미분법에 의하여

$$f'(0) = \frac{1}{g'(2)} = 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

이때 $f(x) = ax + \ln(3x+1) + 2$ 에서

$$f'(x) = a + \frac{3}{3x+1}$$

이므로

$$f'(0) = a + 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$a + 3 = 5$$

$$\text{따라서 } a = 2$$

답 ④

- 5 $x + 8 - kxe^x = 0$ 에서 k 는 자연수, 즉 $k \neq 0$ 이므로

$$\frac{1}{k}(x+8) = xe^x$$

그러므로 방정식 $x + 8 - kxe^x = 0$ 의 실근은 방정식

$$\frac{1}{k}(x+8) = xe^x \text{의 실근과 같으므로 방정식}$$

$x + 8 - kxe^x = 0$ 의 모든 실근이 1보다 작으려면 직선

$$y = \frac{1}{k}(x+8) \text{과 곡선 } y = xe^x \text{이 } x < 1 \text{에서만 만나야 한다.}$$

$$f(x) = \frac{1}{k}(x+8), g(x) = xe^x \text{이라 하자.}$$


$$g'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$$

$$g'(x) = 0 \text{에서 } x = -1$$

실수 전체의 집합에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| | | | |
|---------|-----|----------------|-----|
| x | ... | -1 | ... |
| $g'(x)$ | - | 0 | + |
| $g(x)$ | ↘ | $-\frac{1}{e}$ | ↗ |

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



점 $(-8, 0)$ 을 지나고 기울기가 양수인 직선

$y = \frac{1}{k}(x+8)$ 과 곡선 $y = xe^x$ 은 두 점에서 만난다. 이때 한 교점의 x 좌표는 -8 보다 작다. 나머지 한 교점의 x 좌표가 1 보다 작으려면 $f(1) < g(1)$ 이어야 한다.

$$\frac{9}{k} < e, \text{ 즉 } k > \frac{9}{e}$$

이때 $\frac{5}{2} < e < 3$ 에서 $3 < \frac{9}{e} < \frac{18}{5}$ 이므로 10 이하의 자연수 k 는 $4, 5, 6, \dots, 10$ 이고 그 개수는 7 이다. ㉓ ③

6 $x = \ln(\cos t)$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = \frac{-\sin t}{\cos t} = -\tan t, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = -\sec^2 t$$

$y = 3 \sin t$ 에서

$$\frac{dy}{dt} = 3 \cos t, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -3 \sin t$$

이므로 시각 t 에서의 점 P 의 속력은

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{(-\tan t)^2 + (3 \cos t)^2} \\ &= \sqrt{\tan^2 t + 9 \cos^2 t} \\ &= \sqrt{(\sec^2 t - 1) + 9 \cos^2 t} \\ &= \sqrt{\sec^2 t + 9 \cos^2 t - 1} \end{aligned}$$

$0 < t < \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sec^2 t > 0$, $9 \cos^2 t > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$\sec^2 t + 9 \cos^2 t \geq 2\sqrt{\sec^2 t \times 9 \cos^2 t} = 2 \times 3 = 6$$

(단, 등호는 $\sec^2 t = 9 \cos^2 t$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$), 즉

$$\cos t = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{일 때 성립})$$

점 P 의 속력이 최소인 시각이 $t = \alpha$ 이므로 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이고

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{3} \text{이므로 } \sec^2 \alpha = 3, \sin^2 \alpha = \frac{2}{3}$$

시각 t 에서의 점 P 의 가속도의 크기는

$$\sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2} = \sqrt{\sec^4 t + 9 \sin^2 t}$$

이므로 $t = \alpha$ 에서의 점 P 의 가속도의 크기는

$$\sqrt{3^2 + 9 \times \frac{2}{3}} = \sqrt{15}$$

㉓ ③

참고

시각 t 에서의 점 P 의 속력은

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{(-\tan t)^2 + (3 \cos t)^2} \\ &= \sqrt{\tan^2 t + 9 \cos^2 t} \\ &= \sqrt{(\sec^2 t - 1) + \frac{9}{\sec^2 t}} \\ &= \sqrt{\left(\sec t - \frac{3}{\sec t}\right)^2 + 5} \end{aligned}$$

이므로 점 P 의 속력은 $\sec t = \frac{3}{\sec t}$ 일 때 최소이다. 즉,

$$\sec \alpha = \frac{3}{\sec \alpha}, \sec^2 \alpha = 3, \cos^2 \alpha = \frac{1}{3} \text{이다.}$$

7 $x > 0$ 이므로

$$t(\ln x)^2 = kx^2 \text{에서 } k = \frac{t(\ln x)^2}{x^2}$$

그러므로 두 곡선 $y = t(\ln x)^2$, $y = kx^2$ 이 서로 다른 두 점에서만 만나려면 직선 $y = k$ 와 곡선 $y = \frac{t(\ln x)^2}{x^2}$ 이 서로 다른 두 점에서만 만나야 한다.


$$g(x) = \frac{t(\ln x)^2}{x^2} \text{이라 하자.}$$

$$\begin{aligned} g'(x) &= t \times \frac{2 \ln x \times \frac{1}{x} \times x^2 - (\ln x)^2 \times 2x}{x^4} \\ &= 2t \times \frac{(1 - \ln x) \ln x}{x^3} \end{aligned}$$

$g'(x) = 0$ 에서 $\ln x = 0$ 또는 $\ln x = 1$, 즉 $x = 1$ 또는 $x = e$
 $x > 0$ 에서 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| x | (0) | \dots | 1 | \dots | e | \dots |
|---------|-------|------------|-----|------------|-----------------|------------|
| $g'(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ |
| $g(x)$ | | \searrow | 0 | \nearrow | $\frac{t}{e^2}$ | \searrow |

$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ 이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



정답과 풀이

직선 $y=k$ 와 곡선 $y=\frac{t(\ln x)^2}{x^2}$ 이 서로 다른 두 점에서만 만나려면

$$k=\frac{t}{e^2}, \text{ 즉 } f(t)=\frac{t}{e^2}$$

$$f'(t)=\frac{1}{e^2} \text{ 이므로 } \frac{f'(a)}{f(2a)}=\frac{\frac{1}{e^2}}{\frac{2a}{e^2}}=\frac{1}{2a}=6$$

$$\text{따라서 } a=\frac{1}{12}$$

답 ②

8 조건 (가)에 의하여 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 에서 함수 $f(x)$ 는 증가한다.

또한 조건 (나)에 의하여 $\frac{f'(x_4)-f'(x_3)}{x_4-x_3} < 0$ 에서 평균

값 정리에 의하여 $f''(c) < 0$ 을 만족시키는 실수 c 가 열린구간 (x_3, x_4) 에 존재한다. ㉠

$f'(x)=ae^{\sin(ax)}$ 에서 $a=0$ 이면 $f'(x)=0$ 이고 $f(x)$ 는 상수함수가 되어 두 조건을 만족시키지 않는다. 그러므로 $a \neq 0$ 이다.

모든 실수 x 에 대하여 $e^{\sin(ax)} > 0$ 이므로 조건 (가)를 만족시키려면

$$a > 0$$

$$f'(x)=ae^{\sin(ax)} \text{에서}$$

$$f''(x)=ae^{\sin(ax)} \times a \cos(ax)=a^2 e^{\sin(ax)} \cos(ax)$$

$a > 0$ 에서 $a^2 > 0$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $e^{\sin(ax)} > 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키려면 ㉠에 의하여 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 인 어떤 실수 x 에 대하여 $f''(x) < 0$, 즉 $\cos(ax) < 0$ 이어야 한다.

$$0 < x < \frac{\pi}{4} \text{에서 } 0 < ax < \frac{\pi}{4} \text{이므로}$$

$$\frac{\pi}{4} a > \frac{\pi}{2}, \text{ 즉 } a > 2$$

따라서 정수 a 의 최솟값은 3이다.

답 ⑤

Level 3 실력 완성

본문 74쪽

1 ④ 2 41 3 ②

1 $f(x)=2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$, $g(x)=ax+b$ 라 하면


함수 $f(x)=2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}}=8$ 이다.

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) \leq ax+b$, 즉 $f(x) \leq g(x)$ 가 성립하기 위해서

는 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 직선 $y=g(x)$ 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있거나 만나야 한다.

이때 $a+b=g(1)$ 이므로 $a+b$ 가 최소일 때는 그림과 같이 직선 $y=g(x)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선과 일치할 때이다.



$$f(x)=2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) \text{에서 } f(1)=2 \sin \frac{\pi}{4}=\sqrt{2}$$

$$f'(x)=\frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) \text{에서 } f'(1)=\frac{\pi}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-\sqrt{2}=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}(x-1)$$

$$y=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}x-\frac{\sqrt{2}\pi}{4}+\sqrt{2}$$

$$\text{따라서 } a_1=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}, b_1=-\frac{\sqrt{2}\pi}{4}+\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$a_1 \times b_1 = -\frac{1}{8}\pi^2 + \frac{1}{2}\pi = \frac{\pi}{8}(4-\pi)$$

답 ④

다른 풀이

$f(x)=2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ 라 하면 함수 $f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}}=8$


$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) \leq ax+b$

가 성립하기 위해서는 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 직선 $y=ax+b$ 가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있거나 만나야 한다.

이때 $f(0)=0$ 이고 함수 $f(x)$ 의 최댓값이 2이므로 직선 $y=ax+b$ 의 y절편 b 의 값의 범위를 다음과 같이 나누어 살펴보자.


(i) $b \geq 2$ 인 경우

$$a \geq 0 \text{이므로 } a+b \geq 2$$



(ii) $0 \leq b < 2$ 인 경우

a 는 점 $(0, b)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ ($0 \leq x < 2$)에 그은 접선의 기울기보다 크거나 같아야 한다.



점 $(0, b)$ 에서 곡선 $y=f(x)$ ($0 \leq x < 2$)에 그은 접선의 접점의 좌표를 $(t, 2 \sin(\frac{\pi}{4}t))$ ($0 \leq t < 2$)라 하자.

$$f(x) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) \text{에서 } f'(x) = \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, 2 \sin(\frac{\pi}{4}t))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y = \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)(x-t) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$$

이 접선이 점 $(0, b)$ 를 지나므로

$$b = -\frac{\pi}{2}t \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$$

이때 $a \geq \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)$ 이므로

$$a+b \geq \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - \frac{\pi}{2}t \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)$$

$$h(t) = \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) - \frac{\pi}{2}t \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \text{라 하면}$$

$$h'(t) = -\frac{\pi^2}{8} \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) - \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right) + \frac{\pi^2}{8}t \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) + \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t\right)$$

$$= \frac{\pi^2}{8}(t-1) \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \quad (0 < t < 2)$$

$h'(t)=0$ 에서 $t=1$

$h'(1)=0$ 이고 $t=1$ 의 좌우에서 $h'(t)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $h(t)$ 는 $t=1$ 에서 최소이고 최소값은 $h(1)$ 이다. 그러므로

$$a+b \geq h(t) \geq h(1)$$

$$= \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$$

(i), (ii)에 의하여 $a+b$ 의 최솟값은 $\sqrt{2}$ 이다.

$a+b=\sqrt{2}$ 일 때, $t=1$ 이고

$$a_1 = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi,$$

$$b_1 = -\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{4} \pi + \sqrt{2} \text{이므로}$$

$$a_1 \times b_1 = \frac{\pi}{8} (4 - \pi)$$

2 삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 -1 이고 $f(0)=1$ 이므로

$$f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + 1 \quad (a, b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$g(x) = \sin(\pi f(x)) \text{에서}$$

$$g'(x) = \pi \cos(\pi f(x)) \times f'(x)$$

조건 (가)에서 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이므로

$$g'(0) = \pi \cos(\pi f(0)) \times f'(0) = \pi \cos \pi \times f'(0) = -\pi f'(0) = 0$$

$$\text{에서 } f'(0) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$f'(x) = -3x^2 + 2ax + b \text{이므로}$$

$$f'(0) = b = 0$$

또한 함수 $g(x)$ 가 $x=0$ 에서 극소이면 $x=0$ 의 좌우에서

$g'(x) = \pi \cos(\pi f(x)) \times f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌어야 한다.

$f(0)=1$ 이고 $x=0$ 의 좌우에서 $\cos(\pi f(x))$ 의 부호는 모두 음이므로 $x=0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌어야 한다. $\dots\dots \textcircled{8}$

$\textcircled{7}$, $\textcircled{8}$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이다.

$$f''(x) = -6x + 2a \text{이므로 } f''(0) = 2a < 0 \text{에서 } a < 0$$

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + 1$ ($a < 0$)은 $x > 0$ 일 때

$$f'(x) = -3x\left(x - \frac{2}{3}a\right) < 0$$

즉, $x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소하므로 $x > 0$ 에서

$$f(x) < f(0) = 1 \text{이다.}$$

조건 (나)에서 함수 $g(x) = \sin(\pi f(x))$ 가 최대가 될 때는 $\sin(\pi f(x)) = 1$ 이고 $f(x) < 1$ 이므로

$$f(x) = \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{7}{2}, \dots$$

$x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 는 감소하므로 위의 값을 만족시키는 x 의 값은 하나씩 존재한다. 즉,

$$f(a_1) = \frac{1}{2}, f(a_2) = -\frac{3}{2}, f(a_3) = -\frac{7}{2} \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

조건 (나)에서 $a_2=1$ 이고 $\textcircled{9}$ 에 의하여

$$f(1) = -1 + a + 1 = -\frac{3}{2}$$

$$\text{에서 } a = -\frac{3}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = -x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 1 \text{이므로}$$

$$f(-4) = 64 - 24 + 1 = 41$$

정답과 풀이

- 3 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2+ax & (x \leq 0) \\ bxe^{-x}+x & (x > 0) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서

미분가능하므로 $x=0$ 에서 미분가능하다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2+ax) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (bxe^{-x}+x) = 0, \quad f(0) = 0$$

이므로 $x=0$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2+ax}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+a) = a$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{bxe^{-x}+x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (be^{-x}+1) = b+1 \end{aligned}$$

이므로 $x=0$ 에서 미분가능하려면 $a=b+1$ ㉠

㉡. ㉠에서 $a=2$ 이면 $b=1$ 이므로

$$f(x) = \begin{cases} x^2+2x & (x \leq 0) \\ xe^{-x}+x & (x > 0) \end{cases}$$

에서 $t=1$ 일 때 점 P의 좌표는 $(1, \frac{1}{e}+1)$ 이다.

따라서 점 P $(1, \frac{1}{e}+1)$ 과 직선 $y=x$, 즉 $x-y=0$ 사이의 거리 $g(1)$ 은

$$g(1) = \frac{|1 \times 1 - 1 \times (\frac{1}{e}+1)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2e} \text{ (참)}$$

㉢. ㉠에서

$$f(x) = \begin{cases} x^2+(b+1)x & (x \leq 0) \\ bxe^{-x}+x & (x > 0) \end{cases}$$

$x \leq 0$ 일 때, 직선 $y=x$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 교점을 구하면 $x^2+(b+1)x=x$, $x(x+b)=0$ 에서 $x=-b$ 또는 $x=0$

이므로 $x < -b$ 에서 $f(x) > x$ 이고 $-b \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) \leq x$

$x > 0$ 일 때, 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$f(x)-x = bxe^{-x} > 0 \text{ 이므로 } f(x) > x \text{ 이다.}$$

따라서 점 P $(t, f(t))$ 와 직선 $x-y=0$ 사이의 거리

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{|t-f(t)|}{\sqrt{2}} \\ &= \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} \{f(t)-t\} & (t \leq -b \text{ 또는 } t \geq 0) \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \{t-f(t)\} & (-b < t < 0) \end{cases} \end{aligned} \quad \dots\dots ㉣$$

함수 $g(t)$ 는 $t=-b$, $t=0$ 에서 연속이고 $g(-b)=0$, $g(0)=0$ 이다.

(i) $t < -b$ 에서 $f'(t) = 2t+b+1$ 이므로

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \{f'(t)-1\} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (2t+b) \\ &< \frac{\sqrt{2}}{2} (-2b+b) \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} b < 0 \end{aligned}$$

그러므로 $t < -b$ 에서 함수 $g(t)$ 는 감소한다.

(ii) $-b < t < 0$ 에서 $f'(t) = 2t+b+1$ 이므로

$$g'(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \{1-f'(t)\} = -\frac{\sqrt{2}}{2} (2t+b)$$

$g'(t)=0$ 에서 $t=-\frac{b}{2}$ 이고 $t=-\frac{b}{2}$ 의 좌우에서 함수 $g(t)$ 는 증가에서 감소로 바뀐다.


(iii) $t > 0$ 에서

$$\begin{aligned} f'(t) &= be^{-t} + bte^{-t} \times (-1) + 1 \\ &= be^{-t} (1-t) + 1 \end{aligned}$$

$$g'(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \{f'(t)-1\} = \frac{\sqrt{2}}{2} be^{-t} (1-t)$$

$g'(t)=0$ 에서 $t=1$ 이고 $t=1$ 의 좌우에서 함수 $g(t)$ 는 증가에서 감소로 바뀐다.

(i), (ii), (iii)과 $\lim_{t \rightarrow \infty} te^{-t} = 0$ 에 의하여 함수 $y=g(t)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.




이때 $t=-b$ 또는 $t=0$ 일 때, 함수 $g(t)$ 는 극소이고 극솟값은 0이다.

함수 $g(t)$ 가 $t=-2$ 에서 극소이므로 $-b=-2$ 에서 $b=2$
㉠에서 $a=b+1=3$ 이므로 $a+b=5$ (참)


㉡. ㉢에서 함수 $g(t)$ 는 $t=-\frac{b}{2}$, $t=1$ 에서 극대이다.

$$g\left(-\frac{b}{2}\right) > g(1) \text{ 또는 } g\left(-\frac{b}{2}\right) < g(1) \text{ 이면 집합}$$

$\{t \mid g(t) = g\left(-\frac{b}{2}\right)\}$ 와 $\{t \mid g(t) = g(1)\}$ 의 원소의 개수는 2 또는 4가 되어 조건을 만족시키지 않는다.



$$\left[g\left(-\frac{b}{2}\right) > g(1) \text{ 인 경우} \right]$$




$$\left[g\left(-\frac{b}{2}\right) < g(1) \text{ 인 경우} \right]$$

$g\left(-\frac{b}{2}\right)=g(1)$ 이면 집합

$$\left\{t \mid g(t)=g\left(-\frac{b}{2}\right)\right\}=\{t \mid g(t)=g(1)\}$$

이고 이 집합의 원소의 개수는 3이 되어 조건을 만족시킨다.



$$\left[g\left(-\frac{b}{2}\right)=g(1) \text{인 경우}\right]$$

㉔에서

$$\begin{aligned} g\left(-\frac{b}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left\{ -\frac{b}{2} - f\left(-\frac{b}{2}\right) \right\} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[-\frac{b}{2} - \left\{ \left(-\frac{b}{2}\right)^2 + (b+1) \times \left(-\frac{b}{2}\right) \right\} \right] \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} b^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(1) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \{f(1)-1\} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left\{ \left(\frac{b}{e}+1\right)-1 \right\} = \frac{\sqrt{2}b}{2e} \end{aligned}$$

이므로 $g\left(-\frac{b}{2}\right)=g(1)$ 이려면

$$\frac{\sqrt{2}}{8} b^2 = \frac{\sqrt{2}b}{2e}$$


$b > 0$ 이므로 $b = \frac{4}{e}$ 이고, ㉔에서 $a = \frac{4}{e} + 1$

따라서 $a+b=1+\frac{8}{e}$ (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

참고

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.



함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표가 $x=-b$, $x=0$ 이고, 이 x 의 값이 함수 $g(x)$ 가 극소가 되는 x 의 값과 같다. 또한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점에서 접선의 기울기가 1이 되는 x 의 값이 $x=-\frac{b}{2}$ 와 $x=1$ 이고 이 x 의 값이 함수 $g(x)$ 가 극대가 되는 x 의 값과 같다.

06 여러 가지 적분법

유제

본문 77~81쪽

1 ① 2 ③ 3 ③ 4 ② 5 ①
6 14

1 $f(2)=\frac{a}{4}+\frac{b}{8}=1$ 에서

$$2a+b=8 \quad \dots\dots ㉔$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 f(x) dx &= \int_1^2 \left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} \right) dx \\ &= \int_1^2 (ax^{-2} + bx^{-3}) dx \\ &= \left[-\frac{a}{x} - \frac{b}{2x^2} \right]_1^2 \\ &= \left(-\frac{a}{2} - \frac{b}{8} \right) - \left(-a - \frac{b}{2} \right) \\ &= \frac{a}{2} + \frac{3b}{8} \end{aligned}$$

이므로 $\frac{a}{2} + \frac{3b}{8} = \frac{5}{2}$ 에서

$$4a+3b=20 \quad \dots\dots ㉕$$

㉔, ㉕을 연립하여 풀면

$$a=2, b=4$$

따라서 $a+b=6$

답 ①

2 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h)-f(x)}{2h} \times 2$
 $= 2f'(x)$

이므로 $2f'(x)=2^{x+1}-4$ 에서

$$f'(x)=2^x-2$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int (2^x-2) dx \\ &= \frac{2^x}{\ln 2} - 2x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

$$f(0) = \frac{1}{\ln 2} + C = \frac{1}{\ln 4} \text{에서}$$

$$C = \frac{1}{\ln 4} - \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{2 \ln 2} - \frac{1}{\ln 2} = -\frac{1}{2 \ln 2}$$

이므로

$$f(x) = \frac{2^x}{\ln 2} - 2x - \frac{1}{2 \ln 2}$$

따라서

정답과 풀이

$$f(-1) = \frac{1}{2 \ln 2} + 2 - \frac{1}{2 \ln 2} = 2$$

답 ③

3 $f'(x) = -xe^{-x}$ 이므로

$$f(x) = \int (-xe^{-x}) dx \text{이고,}$$

$$u(x) = -x, v'(x) = e^{-x} \text{으로 놓으면}$$

$$u'(x) = -1, v(x) = -e^{-x} \text{이므로}$$

$$f(x) = xe^{-x} - \int e^{-x} dx$$

$$= xe^{-x} + e^{-x} + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

$$f(0) = 1 + C = 1 \text{이므로 } C = 0$$

$$\text{즉, } f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \text{이다.}$$

$$f(1) = \frac{2}{e}, f'(1) = -\frac{1}{e} \text{이므로 곡선 } y=f(x) \text{ 위의}$$

$$\text{점 } \left(1, \frac{2}{e}\right) \text{에서의 접선의 방정식은}$$

$$y - \frac{2}{e} = -\frac{1}{e}(x-1), \text{ 즉 } y = -\frac{1}{e}x + \frac{3}{e}$$

$$y=0 \text{이면 } 0 = -\frac{1}{e}x + \frac{3}{e} \text{에서 } x=3$$

$$\text{따라서 구하는 접선의 } x \text{절편은 } 3 \text{이다.}$$

답 ③

4 $\int_0^x \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt$ 에서

$$t^2+1=s \text{로 놓으면 } \frac{ds}{dt} = 2t \text{이고,}$$

$$t=0 \text{일 때 } s=1, t=x \text{일 때 } s=x^2+1 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt &= \int_1^{x^2+1} \frac{1}{2\sqrt{s}} ds = \int_1^{x^2+1} \frac{1}{2} s^{-\frac{1}{2}} ds \\ &= \left[\sqrt{s} \right]_1^{x^2+1} = \sqrt{x^2+1} - 1 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } f(x) = \sqrt{x^2+1} - 1 \text{이다.}$$

$$\text{곡선 } y=f(x) \text{와 직선 } y=2 \text{가 만나는 점의 } x \text{좌표를 구하면}$$

$$\sqrt{x^2+1} - 1 = 2, \sqrt{x^2+1} = 3$$

$$\text{양변을 제곱하면}$$

$$x^2+1=9, x^2=8, x=\pm 2\sqrt{2}$$

$$\text{따라서 곡선 } y=f(x) \text{와 직선 } y=2 \text{는 두 점 } (-2\sqrt{2}, 2),$$

$$(2\sqrt{2}, 2) \text{에서 만나므로 두 점 사이의 거리는 } 4\sqrt{2} \text{이다.}$$

답 ②

참고

$$\int_0^x \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt \text{에서 } \sqrt{t^2+1}=s \text{로 놓으면}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{2t}{2\sqrt{t^2+1}} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} \text{이고}$$

$$t=0 \text{일 때 } s=1, t=x \text{일 때 } s=\sqrt{x^2+1} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt &= \int_1^{\sqrt{x^2+1}} ds = \left[s \right]_1^{\sqrt{x^2+1}} \\ &= \sqrt{x^2+1} - 1 \end{aligned}$$

5 등식

$$\int_1^{x+1} (e^{t-1} + e^{1-t}) f(t-1) dt = e^{2x} + e^{-2x} - 2$$

$$\text{의 양변을 } x \text{에 대하여 미분하면}$$

$$(e^x + e^{-x}) f(x) = 2e^{2x} - 2e^{-2x}$$

$$= 2(e^x + e^{-x})(e^x - e^{-x})$$

$$f(x) = 2(e^x - e^{-x})$$

$$\text{따라서}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} f(x) dx &= \int_0^{\ln 2} 2(e^x - e^{-x}) dx \\ &= \left[2e^x + 2e^{-x} \right]_0^{\ln 2} \\ &= (4+1) - (2+2) \\ &= 1 \end{aligned}$$

답 ①

6 $f(t) = \sqrt{2t} + \frac{1}{\sqrt{t+a}}$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2-4} \int_2^x f(t) dt \\ = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x+2} \times \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t) dt \right) \\ = \frac{1}{4} f(2) \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \frac{1}{4} f(2) = \frac{9}{16} \text{에서 } f(2) = \frac{9}{4}$$

$$f(2) = 2 + \frac{1}{\sqrt{2+a}} = \frac{9}{4} \text{에서}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2+a}} = \frac{1}{4}, \sqrt{2+a} = 4$$

$$2+a=16$$

$$\text{따라서 } a=14$$

답 14

Level 1 기초 연습

본문 82~83쪽

1 ③

2 ⑤

3 ⑤

4 ②

5 ④

6 ①

7 ③

8 ④

$$\begin{aligned}
 1 \quad \int_1^2 \frac{5x^2-1}{\sqrt{x}} dx &= \int_1^2 \left(5x\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx \\
 &= \int_1^2 \left(5x^{\frac{3}{2}} - x^{-\frac{1}{2}} \right) dx \\
 &= \left[2x^{\frac{3}{2}}\sqrt{x} - 2\sqrt{x} \right]_1^2 \\
 &= (8\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) - (2 - 2) \\
 &= 6\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

답 ③

$$\begin{aligned}
 2 \quad |2^x-4| &= \begin{cases} 4-2^x & (x < 2) \\ 2^x-4 & (x \geq 2) \end{cases} \text{이므로} \\
 \int_0^4 |2^x-4| dx &= \int_0^2 (4-2^x) dx + \int_2^4 (2^x-4) dx \\
 &= \left[4x - \frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^2 + \left[\frac{2^x}{\ln 2} - 4x \right]_2^4 \\
 &= \left(8 - \frac{4}{\ln 2} \right) - \left(-\frac{1}{\ln 2} \right) + \left(\frac{16}{\ln 2} - 16 \right) - \left(\frac{4}{\ln 2} - 8 \right) \\
 &= \frac{9}{\ln 2}
 \end{aligned}$$

답 ⑤

$$\begin{aligned}
 3 \quad \int \left(4 \sin 2x + 3 \sec^2 \frac{x}{2} \right) dx &= -4 \cos 2x \times \frac{1}{2} + 3 \tan \frac{x}{2} \times 2 + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \\
 &= -2 \cos 2x + 6 \tan \frac{x}{2} + C \\
 \text{이므로} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(4 \sin 2x + 3 \sec^2 \frac{x}{2} \right) dx &= \left[-2 \cos 2x + 6 \tan \frac{x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= (2+6) - (-2) \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

답 ⑤

참고

$$\begin{aligned}
 \int 4 \sin 2x dx \text{에서 } 2x=t \text{로 놓으면 } \frac{dt}{dx} &= 2 \text{이므로} \\
 \int 4 \sin 2x dx &= \int \left(4 \sin t \times \frac{1}{2} \right) dt = \int 2 \sin t dt \\
 &= -2 \cos t + C_1 \quad (\text{단, } C_1 \text{은 적분상수}) \\
 &= -2 \cos 2x + C_1 \\
 \int 3 \sec^2 \frac{x}{2} dx \text{에서 } \frac{x}{2}=s \text{로 놓으면 } \frac{ds}{dx} &= \frac{1}{2} \text{이므로}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int 3 \sec^2 \frac{x}{2} dx &= \int (3 \sec^2 s \times 2) ds = \int 6 \sec^2 s ds \\
 &= 6 \tan s + C_2 \quad (\text{단, } C_2 \text{는 적분상수}) \\
 &= 6 \tan \frac{x}{2} + C_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4 \quad \int_1^{e^2} \frac{(\ln x+1)^3}{2x} dx \text{에서} \\
 \ln x+1=t \text{로 놓으면 } \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \text{이고, } x=1 \text{일 때 } t=1, \\
 x=e^2 \text{일 때 } t=3 \text{이므로} \\
 \int_1^{e^2} \frac{(\ln x+1)^3}{2x} dx &= \int_1^3 \frac{1}{2} t^3 dt \\
 &= \left[\frac{1}{8} t^4 \right]_1^3 \\
 &= \frac{1}{8} (81-1) \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned}
 5 \quad \int_0^{\pi} (x+2)(\sin x + \cos x) dx \text{에서} \\
 u(x)=x+2, v'(x)=\sin x + \cos x \text{로 놓으면} \\
 u'(x)=1, v(x)=-\cos x + \sin x \text{이므로} \\
 \int_0^{\pi} (x+2)(\sin x + \cos x) dx &= \left[(x+2)(-\cos x + \sin x) \right]_0^{\pi} \\
 &\quad - \int_0^{\pi} (-\cos x + \sin x) dx \\
 &= (\pi+2) + 2 + \int_0^{\pi} (\cos x - \sin x) dx \\
 &= \pi + 4 + \left[\sin x + \cos x \right]_0^{\pi} \\
 &= \pi + 4 + (-1-1) \\
 &= \pi + 2
 \end{aligned}$$

답 ④

$$\begin{aligned}
 6 \quad f(x) &= \int f'(x) dx = \int x^2 e^{x+1} dx \\
 \int x^2 e^{x+1} dx \text{에서} \\
 u_1(x) &= x^2, v_1'(x) = e^{x+1} \text{으로 놓으면} \\
 u_1'(x) &= 2x, v_1(x) = e^{x+1} \text{이므로} \\
 \int x^2 e^{x+1} dx &= x^2 e^{x+1} - \int 2x e^{x+1} dx \quad \dots\dots \text{㉠} \\
 \int 2x e^{x+1} dx \text{에서} \\
 u_2(x) &= 2x, v_2'(x) = e^{x+1} \text{으로 놓으면} \\
 u_2'(x) &= 2, v_2(x) = e^{x+1} \text{이므로}
 \end{aligned}$$

정답과 풀이

$$\int 2xe^{x+1} dx = 2xe^{x+1} - \int 2e^{x+1} dx \quad \dots\dots \textcircled{L}$$

㉠, ㉡에서

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 e^{x+1} - \left(2xe^{x+1} - \int 2e^{x+1} dx \right) \\ &= x^2 e^{x+1} - 2xe^{x+1} + \int 2e^{x+1} dx \\ &= (x^2 - 2x + 2)e^{x+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \\ f(0) &= 2e + C = 2e \text{에서 } C = 0 \\ \text{따라서 } f(x) &= (x^2 - 2x + 2)e^{x+1} \text{이므로} \\ f(1) &= e^2 \end{aligned}$$

답 ①

7 $xf(x) = x + \int_1^x f(t) dt \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$

등식 ㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) + xf'(x) = 1 + f(x)$$

$$xf'(x) = 1$$

$$x > 0 \text{일 때, } f'(x) = \frac{1}{x} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \\ &= \ln x + C \end{aligned}$$

등식 ㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) = 1 \text{이므로}$$

$$f(1) = C = 1$$

따라서 $x > 0$ 에서 $f(x) = \ln x + 1$ 이므로

$$f(e^2) = 2 + 1 = 3$$

답 ③

8 $f'(x) = \frac{x}{x^2+1}$ 에서

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \frac{x}{x^2+1} dx = \int \left(\frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \ln |x^2+1| + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \\ &= \frac{1}{2} \ln (x^2+1) + C \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = f(1) = \ln 2 \text{이므로}$$

$$f(1) = \frac{1}{2} \ln 2 + C = \ln 2 \text{에서 } C = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{2} \ln (x^2+1) + \frac{1}{2} \ln 2 \text{이므로}$$

$$f(7) = \frac{1}{2} \ln 50 + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 100 = \ln 10$$

답 ④

Level 2 기본 연습

본문 84~85쪽

- 1 ② 2 ④ 3 ③ 4 ④ 5 ②
6 ① 7 ③

$$\begin{aligned} 1 \quad f'(x) &= \sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt{x}} - 4 = \frac{x+3-4\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $\sqrt{x} = 1$ 또는 $\sqrt{x} = 3$

즉, $x = 1$ 또는 $x = 9$

$x > 0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| x | (0) | ... | 1 | ... | 9 | ... |
|---------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| $f'(x)$ | | + | 0 | - | 0 | + |
| $f(x)$ | | ↗ | 극대 | ↘ | 극소 | ↗ |

함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극대이고, $x=9$ 에서 극소이다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \left(\sqrt{x} + \frac{3}{\sqrt{x}} - 4 \right) dx \\ &= \int \left(x^{\frac{1}{2}} + 3x^{-\frac{1}{2}} - 4 \right) dx \\ &= \frac{2}{3} x\sqrt{x} + 6\sqrt{x} - 4x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

이고, 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4이므로

$$f(1) = \frac{2}{3} + 6 - 4 + C = 4 \text{에서 } C = \frac{4}{3}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{2}{3} x\sqrt{x} + 6\sqrt{x} - 4x + \frac{4}{3} \text{이므로}$$

함수 $f(x)$ 의 극솟값은

$$f(9) = 18 + 18 - 36 + \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$

답 ②

2 $x < 0$ 일 때,

$$f(x) = \int \sin x dx = -\cos x + C_1 \quad (\text{단, } C_1 \text{은 적분상수})$$

$x > 0$ 일 때,

$$f(x) = \int \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C_2 \quad (\text{단, } C_2 \text{는 적분상수})$$

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-\cos x + C_1) = -1 + C_1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x + C_2 \right) = -\frac{1}{2} + C_2$$

이므로 $-1+C_1=-\frac{1}{2}+C_2$ 에서

$$C_1-C_2=\frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x + C_2 \right) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4} \sin 2x + C_2 x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\ &= C_2 \pi - \frac{C_2}{2} \pi \\ &= \frac{C_2}{2} \pi \end{aligned}$$

이므로 $\frac{C_2}{2} \pi = \pi$ 에서 $C_2=2$

$$\textcircled{7} \text{에서 } C_1=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$$

따라서 $x < 0$ 일 때 $f(x) = -\cos x + \frac{5}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} f\left(-\frac{\pi}{3}\right) &= -\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \frac{5}{2} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 2 \end{aligned}$$

답 ④

- 3 $\int_0^1 e^x f(x) dx = \left[e^x f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 e^x f'(x) dx$
 이므로
 $\int_0^1 e^x f(x) dx + \int_0^1 e^x f'(x) dx = \left[e^x f(x) \right]_0^1$
 즉, $\int_0^1 e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e \times f(1) - f(0) \quad \dots\dots \textcircled{7}$
 $f(x) = ax + b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)으로 놓으면
 $f(-1) = -a + b = 0$ 에서 $b = a$
 $f(x) = ax + a$ 이므로 $\textcircled{7}$ 에서
 $e \times f(1) - f(0) = 2ae - a = 4e - 2$
 $(2e - 1)a = 2(2e - 1)$
 $2e - 1 \neq 0$ 이므로 $a = 2$
 따라서 $f(x) = 2x + 2$ 이므로
 $f(2) = 6$

답 ③

다른 풀이

함수 $f(x)$ 가 $f(-1) = 0$ 인 일차함수이므로
 $f(x) = a(x+1)$ (a 는 상수, $a \neq 0$)으로 놓으면 $f'(x) = a$
 이다.
 $\int_0^1 e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = \int_0^1 e^x \{a(x+1) + a\} dx$
 $= \int_0^1 a(x+2)e^x dx$

$$\begin{aligned} &= \left[a(x+2)e^x \right]_0^1 - \int_0^1 ae^x dx \\ &= (3ae - 2a) - \left[ae^x \right]_0^1 \\ &= (3ae - 2a) - (ae - a) \\ &= 2ae - a \end{aligned}$$

그러므로 $2ae - a = 4e - 2$ 에서

$$(2e - 1)a = 2(2e - 1)$$

$2e - 1 \neq 0$ 이므로 $a = 2$

따라서 $f(x) = 2(x+1)$ 이므로

$$f(2) = 6$$

- 4 $\int_0^p xf(x^2) dx$ 에서 $x^2 = t$ 로 놓으면
 $\frac{dt}{dx} = 2x$ 이고, $x=0$ 일 때 $t=0$, $x=p$ 일 때 $t=p^2$ 이므로
 $\int_0^p xf(x^2) dx = \int_0^{p^2} \frac{1}{2} f(t) dt = -\frac{1}{6}$
 즉, $\int_0^{p^2} f(t) dt = -\frac{1}{3}$
 $\int_0^{p^2} f(t) dt = \int_0^{p^2} (t - p^2) \cos t dt$
 이고, $u(t) = t - p^2$, $v'(t) = \cos t$ 로 놓으면
 $u'(t) = 1$, $v(t) = \sin t$ 이므로
 $\int_0^{p^2} (t - p^2) \cos t dt = \left[(t - p^2) \sin t \right]_0^{p^2} - \int_0^{p^2} \sin t dt$
 $= (0 - 0) + \left[\cos t \right]_0^{p^2}$
 $= \cos(p^2) - 1$
 $\cos(p^2) - 1 = -\frac{1}{3}$ 에서
 $\cos(p^2) = \frac{2}{3}$
 $f(x) = (x - p^2) \cos x$ 에서
 $f'(x) = \cos x - (x - p^2) \sin x$ 이므로
 $f'(p^2) = \cos(p^2) = \frac{2}{3}$

답 ④

- 5 $\int_0^p (\tan^n x + \tan^{n+2} x) dx$
 $= \int_0^p (\tan^n x)(1 + \tan^2 x) dx$
 $= \int_0^p \tan^n x \sec^2 x dx$
 $\tan x = t$ 로 놓으면 $\frac{dt}{dx} = \sec^2 x$ 이고,
 $x=0$ 일 때 $t=0$, $x=p$ 일 때 $t=\tan p$ 이므로

정답과 풀이

$$\begin{aligned}\int_0^p \tan^n x \sec^2 x dx &= \int_0^{\tan p} t^n dt \\ &= \left[\frac{1}{n+1} t^{n+1} \right]_0^{\tan p} \\ &= \frac{1}{n+1} \tan^{n+1} p\end{aligned}$$

$$\frac{a_n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \tan^{n+1} p \text{에서}$$

$$a_n = \tan^{n+1} p$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 $\tan^2 p$, 공비가 $\tan p$ 인 등비수열이다.

$$0 < p < \frac{\pi}{4} \text{에서 } 0 < \tan p < 1 \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{\tan^2 p}{1 - \tan p} = \frac{1}{12}$$

$$12 \tan^2 p + \tan p - 1 = 0$$

$$(3 \tan p + 1)(4 \tan p - 1) = 0$$

$$0 < \tan p < 1 \text{이므로 } \tan p = \frac{1}{4}$$

답 ②

6 $\int_1^e 2tf(t)dt = a$ (a 는 상수)라 하면

$$f(x) + a = \ln x, f(x) = \ln x - a$$

$$a = \int_1^e 2t(\ln t - a)dt$$

$$= \int_1^e 2t \ln t dt - \int_1^e 2at dt \quad \dots\dots ①$$

$$\int_1^e 2t \ln t dt \text{에서}$$

$$u(t) = \ln t, v'(t) = 2t \text{로 놓으면}$$

$$u'(t) = \frac{1}{t}, v(t) = t^2 \text{이므로}$$

$$\int_1^e 2t \ln t dt = \left[t^2 \ln t \right]_1^e - \int_1^e \left(t^2 \times \frac{1}{t} \right) dt$$

$$= e^2 - \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_1^e$$

$$= e^2 - \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2}$$

①에서

$$a = \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} - \left[at^2 \right]_1^e$$

$$= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} - (ae^2 - a)$$

$$= \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} - ae^2 + a$$

이므로

$$ae^2 = \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2}, a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2e^2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \ln x - \frac{1}{2} - \frac{1}{2e^2} \text{이므로}$$

$$f(\sqrt{e}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2e^2} = -\frac{1}{2e^2}$$

답 ①

7 조건 (나)에서

$$f(x) = x \int_1^x f'(t) dt - \int_1^x t f'(t) dt + x \quad \dots\dots ①$$

등식 ①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$f(1) = 1$$

등식 ①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(x) = \int_1^x f'(t) dt + x f'(x) - x f'(x) + 1$$

$$= \left[f(t) \right]_1^x + 1$$

$$= f(x) - f(1) + 1$$

$$= f(x) - 1 + 1 = f(x)$$

조건 (가)에서 $f(x) > 0$ 이므로

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 1$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = x + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

$$\text{즉, } \ln |f(x)| = x + C$$

$$f(x) > 0 \text{이므로 } \ln f(x) = x + C$$

$$f(1) = 1 \text{이므로}$$

$$\ln f(1) = 1 + C \text{에서}$$

$$0 = 1 + C, C = -1$$

$$\text{따라서 } \ln f(x) = x - 1, f(x) = e^{x-1} \text{이므로}$$

$$f(2) = e$$

답 ③

다른 풀이

조건 (나)에서

$$f(x) = \int_1^x (x-t) f'(t) dt + x$$

등식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면 $f(1) = 1$

$$f(x) = x \int_1^x f'(t) dt - \int_1^x t f'(t) dt + x$$

$$= x \left[f(t) \right]_1^x - \left(\left[t f(t) \right]_1^x - \int_1^x f(t) dt \right) + x$$

$$= x \{ f(x) - 1 \} - \{ x f(x) - 1 \} + \int_1^x f(t) dt + x$$

$$= 1 + \int_1^x f(t) dt$$

이므로 등식 $f(x) = 1 + \int_1^x f(t) dt$ 의 양변을 x 에 대하여

미분하면

$$f'(x)=f(x)$$

조건 (가)에서 $f(x)>0$ 이므로

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=1$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = x+C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

즉, $\ln |f(x)| = x+C$

$f(x)>0$ 이므로 $\ln f(x) = x+C$

$f(1)=1$ 이므로

$\ln f(1) = 1+C$ 에서

$0=1+C, C=-1$

따라서 $\ln f(x) = x-1, f(x)=e^{x-1}$ 이므로

$f(2)=e$

Level 3 실력 완성

본문 86쪽

1 ① 2 24 3 ③

1 조건 (가)에 의하여

$$f(x) = \int (1-x)e^{1-x} dx \text{이고,}$$

$u(x)=1-x, v'(x)=e^{1-x}$ 으로 놓으면

$u'(x)=-1, v(x)=-e^{1-x}$ 이므로

$$\int (1-x)e^{1-x} dx$$

$$= -(1-x)e^{1-x} - \int e^{1-x} dx$$

$$= (x-1)e^{1-x} + e^{1-x} + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$= xe^{1-x} + C$$

즉, $f(x)=xe^{1-x}+C \quad \dots\dots \textcircled{1}$

조건 (나)에서

$2t+1=s$ 로 놓으면 $\frac{ds}{dt}=2$ 이고,

$t=0$ 일 때 $s=1, t=\frac{x-1}{2}$ 일 때 $s=x$ 이므로

$$\int_0^{\frac{x-1}{2}} f(2t+1)dt = \int_1^x \frac{1}{2}f(s)ds$$

그러므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_0^{\frac{x-1}{2}} f(2t+1)dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x \frac{1}{2}f(s)ds$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(s)ds$$

$$= \frac{1}{2} f(1) = e^2$$

$$f(1)=2e^2$$

①에서 $f(1)=1+C=2e^2$

$$C=2e^2-1$$

따라서 $f(x)=xe^{1-x}+2e^2-1$ 이므로

$$f(-1)=-e^2+2e^2-1=e^2-1$$

답 ①

2 $f(x)=(ax+b)e^x$

$$f'(x)=ae^x+(ax+b)e^x=(ax+a+b)e^x$$

이므로 조건 (가)에 의하여

$$\frac{f'(1)}{f(1)} = \frac{(2a+b)e}{(a+b)e} = \frac{2a+b}{a+b} = \frac{4}{3}$$

$$4a+4b=6a+3b$$

$$b=2a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

그러므로 $f(x)=(ax+2a)e^x, f'(x)=(ax+3a)e^x$

함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로

$$g(f(x))=x$$

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$g'(f(x))f'(x)=1$$

$x>0$ 에서 $f'(x)=a(x+3)e^x \neq 0$ 이므로

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

조건 (나)에 의하여

$$\int_1^5 g'(f(x))e^x dx = \int_1^5 \frac{e^x}{f'(x)} dx = \int_1^5 \frac{e^x}{(ax+3a)e^x} dx$$

$$= \int_1^5 \frac{1}{ax+3a} dx = \frac{1}{a} \int_1^5 \frac{1}{x+3} dx$$

$$= \frac{1}{a} [\ln |x+3|]_1^5 = \frac{1}{a} (\ln 8 - \ln 4)$$

$$= \frac{1}{a} \ln 2 = \ln \sqrt{2}$$

이므로 $\frac{1}{a} \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2$ 에서 $a=2$

①에서 $b=4$

따라서 $10a+b=24$

답 24

3 $\int_0^1 x^2(1-t)f(xt)dt$ 에서

$xt=s$ 로 놓으면 $\frac{ds}{dt}=x$ 이고,

$t=0$ 일 때 $s=0, t=1$ 일 때 $s=x$ 이므로

$$\int_0^1 x^2(1-t)f(xt)dt = \int_0^1 x(x-xt)f(xt)dt$$

$$= \int_0^x (x-s)f(s)ds$$

정답과 풀이

$$\begin{aligned} g(x) &= \pi^2 \int_0^x (x-s)f(s)ds \\ &= \pi^2 \left\{ x \int_0^x f(s)ds - \int_0^x sf(s)ds \right\} \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} g'(x) &= \pi^2 \left\{ \int_0^x f(s)ds + xf(x) - xf(x) \right\} \\ &= \pi^2 \int_0^x f(s)ds \\ &= \pi^2 \int_0^x \cos(2\pi s)ds \\ &= \left[\frac{\pi}{2} \sin(2\pi s) \right]_0^x \\ &= \frac{\pi}{2} \sin(2\pi x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= \int \frac{\pi}{2} \sin(2\pi x)dx \\ &= -\frac{1}{4} \cos(2\pi x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

①에서 $g(0)=0$ 이므로

$$g(0) = -\frac{1}{4} + C = 0, \quad C = \frac{1}{4}$$

그러므로 $g(x) = -\frac{1}{4} \cos(2\pi x) + \frac{1}{4}$ 이고, 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

함수 $h(x) = \begin{cases} g(x) & (x < a) \\ g(x-a) + g(a) & (x \geq a) \end{cases}$ 가 $x=a$ 에서 미분

가능하면 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $h(x)$ 의 $x=a$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사한다.

(i) 함수 $h(x)$ 의 $x=a$ 에서의 연속성

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} h(x) &= \lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = g(a) \\ \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) &= \lim_{x \rightarrow a^+} \{g(x-a) + g(a)\} \\ &= g(0) + g(a) \\ &= 0 + g(a) = g(a) \end{aligned}$$

$$h(a) = g(0) + g(a) = g(a)$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = h(a)$ 이므로 함수

$h(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

(ii) 함수 $h(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분가능성

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{h(x) - h(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a) \\ \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{h(x) - h(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x-a) + g(a) - g(a)}{x - a} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{g(u)}{u} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{g(u) - g(0)}{u} = g'(0) \end{aligned}$$

따라서 $g'(a) = g'(0)$ 이면 함수 $h(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분

가능하다.

$g'(x) = \frac{\pi}{2} \sin(2\pi x)$ 이므로 $g'(a) = g'(0)$ 에서

$$\frac{\pi}{2} \sin(2\pi a) = 0, \quad \sin(2\pi a) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①을 만족시키는 양수 a 의 값은

$$\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots$$

이므로 $a_n = \frac{n}{2}$ 이다.

$$\sum_{k=1}^m a_k = \sum_{k=1}^m \frac{k}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{m(m+1)}{2} = 18$$

에서 $m(m+1) = 72$

$$m^2 + m - 72 = 0, \quad (m+9)(m-8) = 0$$

따라서 자연수 m 의 값은 8이다.

답 ③

다른 풀이

$$\int_0^1 x^2(1-t)f(xt)dt \text{에서}$$

$xt=s$ 로 놓으면 $\frac{ds}{dt} = x$ 이고,

$t=0$ 일 때 $s=0$, $t=1$ 일 때 $s=x$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2(1-t)f(xt)dt &= \int_0^1 x(x-xt)f(xt)dt \\ &= \int_0^x (x-s)f(s)ds \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= \pi^2 \int_0^x (x-s)f(s)ds \\ &= \pi^2 \left\{ x \int_0^x f(s)ds - \int_0^x sf(s)ds \right\} \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} g'(x) &= \pi^2 \left\{ \int_0^x f(s)ds + xf(x) - xf(x) \right\} \\ &= \pi^2 \int_0^x f(s)ds \\ &= \pi^2 \int_0^x \cos(2\pi s)ds \\ &= \left[\frac{\pi}{2} \sin(2\pi s) \right]_0^x \\ &= \frac{\pi}{2} \sin(2\pi x) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} g(x) &= \int \frac{\pi}{2} \sin(2\pi x)dx \\ &= -\frac{1}{4} \cos(2\pi x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

①에서 $g(0)=0$ 이므로


$$g(0) = -\frac{1}{4} + C = 0, \quad C = \frac{1}{4}$$

그러므로 $g(x) = -\frac{1}{4} \cos(2\pi x) + \frac{1}{4}$ 이고,

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$x \geq a$ 에서 함수 $y=h(x)$ 의 그래프는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $g(a)$ 만큼 평행이동한 것이므로 $a=\frac{1}{2}$ 인 경우 $y=h(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



함수 $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하려면 함수 $h(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능해야 하고, 점 $(a, h(a))$ 는 점 $(0, 0)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $g(a)$ 만큼 평행이동한 것이므로 함수 $h(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하려면 $h'(a)=g'(0)$ 이어야 한다.

$g'(x)=\frac{\pi}{2} \sin(2\pi x)$ 에서 $g'(0)=0$ 이므로 $h'(a)=0$ 이고

$h(a)=g(a)$ 이므로 $h'(a)=0$ 이라면 $g'(a)=0$ 이어야 한다.

함수 $g(x)$ 에서 $g'(a)=0$ 인 양수 a 의 값은

$$\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots$$

이므로 $a_n=\frac{n}{2}$ 이다.

$$\sum_{k=1}^m a_k = \sum_{k=1}^m \frac{k}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{m(m+1)}{2} = 18$$

에서 $m(m+1)=72$

$$m^2+m-72=0, (m+9)(m-8)=0$$

따라서 자연수 m 의 값은 8이다.

참고

$$\begin{aligned} g(x) &= \pi^2 \int_0^1 x^2(1-t)f(xt) dt \\ &= \pi^2 x^2 \int_0^1 (1-t) \cos(2\pi xt) dt \quad \dots\dots \textcircled{7} \end{aligned}$$

$$\int_0^1 (1-t) \cos(2\pi xt) dt \text{에서}$$

$u(t)=1-t, v'(t)=\cos(2\pi xt)$ 로 놓으면

$$u'(t)=-1, v(t)=\frac{1}{2\pi x} \sin(2\pi xt) \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (1-t) \cos(2\pi xt) dt \\ &= \left[(1-t) \times \frac{1}{2\pi x} \sin(2\pi xt) \right]_0^1 \\ & \quad + \int_0^1 \frac{1}{2\pi x} \sin(2\pi xt) dt \\ &= 0 + \left[-\frac{1}{4\pi^2 x^2} \cos(2\pi xt) \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{4\pi^2 x^2} \{\cos(2\pi x) - 1\} \quad \dots\dots \textcircled{8} \end{aligned}$$

⑧을 ⑦에 대입하면

$$\begin{aligned} g(x) &= \pi^2 x^2 \times \left[-\frac{1}{4\pi^2 x^2} \{\cos(2\pi x) - 1\} \right] \\ &= -\frac{1}{4} \cos(2\pi x) + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

만점마무리 봉투모의고사

수능과 동일한 구성과 난이도,
OMR 카드 마킹 연습까지
선배들이 증명한 실전 훈련 효과!

정답과 풀이

07 정적분의 활용

유제

본문 89~97쪽

- 1 ④ 2 ② 3 ② 4 ③ 5 ④
6 ③ 7 4 8 ① 9 14

$$\begin{aligned}
 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+3nk}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n \sqrt{1+\frac{3k}{n}}} \\
 &= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}} \times \frac{3}{n} \right) \\
 &= \frac{1}{3} \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\
 &= \frac{1}{3} \left[2\sqrt{x} \right]_1^4 \\
 &= \frac{1}{3} (4-2) = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

답 ④

다른 풀이

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+3nk}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n \sqrt{1+\frac{3k}{n}}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{3k}{n}}} \times \frac{1}{n} \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+3x}} dx \\
 1+3x=t \text{로 놓으면 } x=0 \text{일 때 } t=1, x=1 \text{일 때 } t=4 \text{이고,} \\
 \frac{dt}{dx} &= 3 \text{이므로} \\
 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+3x}} dx &= \frac{1}{3} \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{3} \left[2\sqrt{t} \right]_1^4 \\
 &= \frac{1}{3} (4-2) = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+3nk}} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned}
 2 \quad P_k \left(1 + \frac{2k}{n}, 0 \right) \text{이므로} \\
 S_k &= \frac{1}{2} \times \overline{AP_k} \times \overline{P_k Q_k} \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{2k}{n} \times \ln \left(1 + \frac{2k}{n} \right)
 \end{aligned}$$

그러므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{2k}{n} \ln \left(1 + \frac{2k}{n} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2k}{n} \ln \left(1 + \frac{2k}{n} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^3 (x-1) \ln x dx \quad \cdots \cdots ㉠
 \end{aligned}$$

이때 $\int_1^3 (x-1) \ln x dx$ 에서 $u(x) = \ln x$, $v'(x) = x-1$

로 놓으면 $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = \frac{1}{2}x^2 - x$ 이므로


$$\begin{aligned}
 \int_1^3 (x-1) \ln x dx &= \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \ln x \right]_1^3 - \int_1^3 \left(\frac{1}{2}x - 1 \right) dx \\
 &= \frac{3}{2} \ln 3 - \left[\frac{1}{4}x^2 - x \right]_1^3 \\
 &= \frac{3}{2} \ln 3
 \end{aligned}$$

따라서 ㉠에서

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k &= \frac{1}{4} \int_1^3 (x-1) \ln x dx \\
 &= \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} \ln 3 \\
 &= \frac{3}{8} \ln 3
 \end{aligned}$$

답 ②

$$\begin{aligned}
 3 \quad 2 \cos x + 1 = 0 \text{에서 } \cos x &= -\frac{1}{2} \\
 0 \leq x < 2\pi \text{에서 } x &= \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } x = \frac{4}{3}\pi
 \end{aligned}$$



이때 닫힌구간 $\left[\frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi \right]$ 에서 $y \leq 0$ 이므로 구하는 부분의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}
 S &= \int_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} (-2 \cos x - 1) dx = \left[-2 \sin x - x \right]_{\frac{2}{3}\pi}^{\frac{4}{3}\pi} \\
 &= \left(\sqrt{3} - \frac{4}{3}\pi \right) - \left(-\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi \right) = 2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi
 \end{aligned}$$

답 ②

- 4 닫힌구간 $[0, \ln 4]$ 에서 $e^x > 0$ 이므로 곡선 $y=e^x$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x=\ln 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_0^{\ln 4} e^x dx = [e^x]_0^{\ln 4} \\ = 4 - 1 = 3$$


직선 $x=k$ 에 의하여 이 넓이가 이등분되므로 곡선 $y=e^x$ 과 x 축, y 축 및 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{3}{2}$ 이다.

이때

$$\int_0^k e^x dx = [e^x]_0^k = e^k - 1$$

$$\text{이므로 } e^k - 1 = \frac{3}{2} \text{에서 } e^k = \frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } k = \ln \frac{5}{2}$$



답 ③


- 5 두 곡선 $y=e^x$, $y=e^{2x}-2$ 의 교점의 x 좌표는

$$e^x = e^{2x} - 2, e^{2x} - e^x - 2 = 0$$

$$(e^x + 1)(e^x - 2) = 0$$

$$e^x + 1 > 0 \text{이므로 } e^x = 2, x = \ln 2$$

이때 두 곡선 $y=e^x$, $y=e^{2x}-2$ 및 y 축으로 둘러싸인 부분은 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\int_0^{\ln 2} \{e^x - (e^{2x} - 2)\} dx$$

$$= \int_0^{\ln 2} (e^x - e^{2x} + 2) dx$$


$$= \left[e^x - \frac{1}{2}e^{2x} + 2x \right]_0^{\ln 2}$$

$$= \left(2 - \frac{1}{2} \times 4 + 2 \ln 2 \right) - \left(1 - \frac{1}{2} + 0 \right)$$

$$= 2 \ln 2 - \frac{1}{2}$$

답 ④

- 6 두 곡선 $y=\ln x$, $y=\frac{1-x}{x}$ 는 그림과 같이 점 $(1, 0)$ 을 지난다.



닫힌구간 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 에서 $\ln x \leq \frac{1-x}{x}$, 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서

$\ln x \geq \frac{1-x}{x}$ 이므로 구하는 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_{\frac{1}{2}}^2 \left| \ln x - \frac{1-x}{x} \right| dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1-x}{x} - \ln x \right) dx + \int_1^2 \left(\ln x - \frac{1-x}{x} \right) dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\frac{1}{x} - 1 - \ln x \right) dx + \int_1^2 \left(\ln x - \frac{1}{x} + 1 \right) dx$$

$\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ (C 는 적분상수)이므로

$$S = \left[\ln |x| - x - (x \ln x - x) \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\ + \left[(x \ln x - x) - \ln |x| + x \right]_1^2$$

$$= \left[\ln |x| - x \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[x \ln x - \ln |x| \right]_1^2$$

$$= \left(0 + \frac{1}{2} \ln 2 \right) + (\ln 2 - 0)$$

$$= \frac{3}{2} \ln 2$$

답 ③

참고

$\int \ln x dx$ 에서 $u(x) = \ln x$, $v'(x) = 1$ 로 놓으면

$$u'(x) = \frac{1}{x}, v(x) = x \text{이므로}$$

$$\int \ln x dx = \ln x \times x - \int \left(\frac{1}{x} \times x \right) dx$$

$$= x \ln x - \int 1 dx$$

$$= x \ln x - x + C \text{ (단, } C \text{는 적분상수)}$$

- 7 $2 \leq t \leq 4$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면은 반지름의 길이가 $\frac{k}{t}$ 인 반원이므로 그 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{k}{t} \right)^2 = \frac{k^2}{2t^2} \pi$$

정답과 풀이

구하는 입체도형의 부피를 V 라 하면

$$\begin{aligned} V &= \int_2^4 S(t) dt = \int_2^4 \left(\frac{k^2}{2t^2} \pi \right) dt \\ &= \frac{k^2}{2} \pi \int_2^4 \frac{1}{t^2} dt = \frac{k^2}{2} \pi \left[-\frac{1}{t} \right]_2^4 \\ &= \frac{k^2}{2} \pi \times \frac{1}{4} = \frac{k^2}{8} \pi \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \frac{k^2}{8} \pi = 2\pi \text{에서 } k^2 = 16$$

$$k > 0 \text{이므로 } k = 4$$

답 4

8 $x = \sin t \cos t$ 에서 $\frac{dx}{dt} = \cos^2 t - \sin^2 t$

$$y = \cos^2 t \text{에서 } \frac{dy}{dt} = -2 \cos t \sin t$$

$$\begin{aligned} &\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \\ &= (\cos^2 t - \sin^2 t)^2 + (-2 \cos t \sin t)^2 \\ &= (\cos^4 t - 2 \cos^2 t \sin^2 t + \sin^4 t) + 4 \cos^2 t \sin^2 t \\ &= \cos^4 t + 2 \cos^2 t \sin^2 t + \sin^4 t \\ &= (\cos^2 t + \sin^2 t)^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

따라서 시각 $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 $t = \pi$ 까지 점 P가 움직인 거리를 s 라 하면

$$\begin{aligned} s &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 1 dt \\ &= \left[t \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

답 ①

9 $x = 2 + 3t^2$ 에서 $\frac{dx}{dt} = 6t$

$$y = 2 + 2t^3 \text{에서 } \frac{dy}{dt} = 6t^2$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 &= (6t)^2 + (6t^2)^2 \\ &= 36t^2(1+t^2) \end{aligned}$$

따라서 $0 \leq t \leq \sqrt{3}$ 에서 이 곡선의 길이를 l 이라 하면

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt \\ &= \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{36t^2(1+t^2)} dt \\ &= \int_0^{\sqrt{3}} 6t\sqrt{1+t^2} dt \end{aligned}$$

이때 $1+t^2=s$ 로 놓으면 $t=0$ 일 때 $s=1$, $t=\sqrt{3}$ 일 때

$s=4$ 이고, $\frac{ds}{dt} = 2t$ 이므로

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{\sqrt{3}} 6t\sqrt{1+t^2} dt = \int_1^4 3\sqrt{s} ds \\ &= \left[2s^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 = 2 \times 2^3 - 2 \times 1 = 14 \end{aligned}$$

답 14

Level 1 기초 연습

본문 98~99쪽

| | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 1 ③ | 2 ① | 3 4 | 4 ② | 5 ① |
| 6 ① | 7 ③ | 8 ⑤ | 9 12 | |

$$\begin{aligned} 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{3k}{n}} &= \int_1^4 \sqrt{x} dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_1^4 \\ &= \frac{2}{3} \times 8 - \frac{2}{3} \times 1 \\ &= \frac{14}{3} \end{aligned}$$


답 ③

$$\begin{aligned} 2 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f' \left(1 + \frac{2k}{n} \right) &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n f' \left(1 + \frac{2k}{n} \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_1^3 f'(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \left[f(x) \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{2} \{ f(3) - f(1) \} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{a}{5} - \frac{a}{3} \right) \\ &= -\frac{a}{15} \end{aligned}$$

따라서 $-\frac{a}{15} = \frac{1}{3}$ 에서 $a = -5$

답 ①

3 $0 \leq x \leq 4\pi$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 그림과 같다.




닫힌구간 $[\pi, 3\pi]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{\pi}^{3\pi} \left| \cos \frac{x}{2} \right| dx = \int_{\pi}^{3\pi} \left(-\cos \frac{x}{2} \right) dx \\ &= \left[-2 \sin \frac{x}{2} \right]_{\pi}^{3\pi} = -2 \sin \frac{3\pi}{2} + 2 \sin \frac{\pi}{2} \\ &= 2 + 2 = 4 \end{aligned}$$

답 4

4 $y = \frac{2-x}{x+2} = -1 + \frac{4}{x+2}$

이므로 곡선 $y = \frac{2-x}{x+2}$ 는 곡선 $y = \frac{4}{x}$ 를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이고, 이 곡선은 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 \frac{2-x}{x+2} dx = \int_0^2 \left(-1 + \frac{4}{x+2} \right) dx \\ &= \left[-x + 4 \ln |x+2| \right]_0^2 \\ &= (-2 + 4 \ln 4) - (0 + 4 \ln 2) \\ &= 4 \ln 2 - 2 \end{aligned}$$


답 ②

5 $f(x) = |\ln x| = \begin{cases} -\ln x & (0 < x < 1) \\ \ln x & (x \geq 1) \end{cases}$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=1$ 이 만나는 점의 x 좌표는

$0 < x < 1$ 일 때, $-\ln x = 1$ 에서 $x = \frac{1}{e}$

$x \geq 1$ 일 때, $\ln x = 1$ 에서 $x = e$




따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{1}{e}}^e (1 - |\ln x|) dx \\ &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \{1 - (-\ln x)\} dx + \int_1^e (1 - \ln x) dx \\ &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx = x \ln x - x + C \quad (C \text{는 적분상수}) \text{이므로} \\ S &= \left[x + (x \ln x - x) \right]_{\frac{1}{e}}^1 + \left[x - (x \ln x - x) \right]_{\frac{1}{e}}^e \\ &= \left[x \ln x \right]_{\frac{1}{e}}^1 + \left[2x - x \ln x \right]_{\frac{1}{e}}^e \\ &= \left(0 + \frac{1}{e} \right) + \{ (2e - e) - (2 - 0) \} \\ &= e + \frac{1}{e} - 2 \end{aligned}$$

답 ①

6 곡선 $y=2^x-1$ 과 직선 $y=-x+2$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A 라 하자.



$$\begin{aligned} S_2 + A &= \int_0^2 (2^x - 1) dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} - x \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{4}{\ln 2} - 2 \right) - \left(\frac{1}{\ln 2} - 0 \right) \\ &= \frac{3}{\ln 2} - 2 \end{aligned}$$

$$S_1 + A = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$$

따라서

$$\begin{aligned} S_2 - S_1 &= (S_2 + A) - (S_1 + A) \\ &= \left(\frac{3}{\ln 2} - 2 \right) - 2 \\ &= \frac{3}{\ln 2} - 4 \end{aligned}$$

답 ①

7 $0 \leq t \leq \ln 3$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = (e^t + 1)^2 = e^{2t} + 2e^t + 1$$

따라서 구하는 입체도형의 부피를 V 라 하면

정답과 풀이

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^{\ln 3} S(t) dt \\
 &= \int_0^{\ln 3} (e^{2t} + 2e^t + 1) dt \\
 &= \left[\frac{1}{2} e^{2t} + 2e^t + t \right]_0^{\ln 3} \\
 &= \left(\frac{1}{2} \times 9 + 2 \times 3 + \ln 3 \right) - \left(\frac{1}{2} + 2 + 0 \right) \\
 &= 8 + \ln 3
 \end{aligned}$$

답 ③

8 $x = 2 \ln t$ 에서 $\frac{dx}{dt} = \frac{2}{t}$ 이고,
 $y = t + \frac{1}{t}$ 에서 $\frac{dy}{dt} = 1 - \frac{1}{t^2}$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 &= \left(\frac{2}{t} \right)^2 + \left(1 - \frac{1}{t^2} \right)^2 \\
 &= 1 + \frac{2}{t^2} + \frac{1}{t^4} = \left(1 + \frac{1}{t^2} \right)^2
 \end{aligned}$$

따라서 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\begin{aligned}
 \int_1^4 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt &= \int_1^4 \sqrt{\left(1 + \frac{1}{t^2} \right)^2} dt \\
 &= \int_1^4 \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) dt \\
 &= \left[t - \frac{1}{t} \right]_1^4 \\
 &= \left(4 - \frac{1}{4} \right) - (1 - 1) \\
 &= \frac{15}{4}
 \end{aligned}$$

답 ⑤

9 $f(x) = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{\frac{3}{2}}$ 이라 하면

$$f'(x) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times (x^2 + 2)^{\frac{1}{2}} \times 2x = x\sqrt{x^2 + 2}$$

이므로 $0 \leq x \leq 3$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 의 길이는

$$\begin{aligned}
 \int_0^3 \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2} dx &= \int_0^3 \sqrt{1 + x^2(x^2 + 2)} dx \\
 &= \int_0^3 \sqrt{(x^2 + 1)^2} dx \\
 &= \int_0^3 (x^2 + 1) dx \\
 &= \left[\frac{1}{3} x^3 + x \right]_0^3 \\
 &= \frac{1}{3} \times 3^3 + 3 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

답 12

Level 2 기본 연습

본문 100~101쪽

- 1 ⑤ 2 ④ 3 ③ 4 ① 5 ③
 6 ④ 7 19 8 ④

1 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n^2} \sum_{k=1}^n k \sin \frac{k\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n} \sin \frac{k\pi}{n}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k\pi}{n} \sin \frac{k\pi}{n} \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \sin x dx
 \end{aligned}$$

$\int_0^\pi x \sin x dx$ 에서 $u(x) = x$, $v'(x) = \sin x$ 로 놓으면
 $u'(x) = 1$, $v(x) = -\cos x$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi x \sin x dx &= \left[-x \cos x \right]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx \\
 &= \pi + \left[\sin x \right]_0^\pi \\
 &= \pi
 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n^2} \sum_{k=1}^n k \sin \frac{k\pi}{n} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x \sin x dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \times \pi \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

답 ⑤

2 $\angle AOP_k = \frac{k\pi}{n}$ 이므로 점 P_k 의 좌표는

$$\left(\cos \frac{k\pi}{n}, \sin \frac{k\pi}{n} \right)$$

이때 삼각형 AP_kH_k 의 넓이 $S(k)$ 는

$$\begin{aligned}
 S(k) &= \frac{1}{2} \times \overline{AH_k} \times \overline{P_kH_k} \\
 &= \frac{1}{2} \times \left(1 - \cos \frac{k\pi}{n} \right) \times \sin \frac{k\pi}{n}
 \end{aligned}$$

그러므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S(k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 - \cos \frac{k\pi}{n} \right) \sin \frac{k\pi}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \cos \frac{k\pi}{n} \right) \sin \frac{k\pi}{n} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \cos \frac{k\pi}{n} \right) \sin \frac{k\pi}{n} \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (1 - \cos x) \sin x dx
 \end{aligned}$$

이때 $1 - \cos x = t$ 로 놓으면 $x=0$ 일 때 $t=0$, $x=\pi$ 일 때

$$t = 2 \text{이고, } \frac{dt}{dx} = \sin x \text{이므로}$$


$$\begin{aligned}\int_0^\pi (1-\cos x) \sin x dx &= \int_0^2 t dt \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^2 \\ &= 2\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (1-\cos x) \sin x dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \times 2 \\ &= \frac{1}{\pi}\end{aligned}$$

답 ④

3



곡선 $y = \ln x$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 2$, $x = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_2^4 \ln x dx$$

이때 $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$ (C 는 적분상수)이므로

$$\begin{aligned}S &= \int_2^4 \ln x dx \\ &= \left[x \ln x - x \right]_2^4 \\ &= (4 \ln 4 - 4) - (2 \ln 2 - 2) \\ &= 6 \ln 2 - 2\end{aligned}$$

한편 곡선 $y = \ln kx$ 와 x 축 및 두 직선 $x = 2$, $x = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 T 라 하면

$$\begin{aligned}T &= \int_2^4 \ln kx dx \\ &= \int_2^4 (\ln k + \ln x) dx \\ &= \left[x \ln k \right]_2^4 + \int_2^4 \ln x dx \\ &= 2 \ln k + (6 \ln 2 - 2)\end{aligned}$$

이때 $T = \frac{S}{2}$ 이어야 하므로

$$2 \ln k + 6 \ln 2 - 2 = 3 \ln 2 - 1$$

$$2 \ln k = 1 - 3 \ln 2$$

$$\ln k^2 = \ln \frac{e}{8}$$

$$\text{따라서 } k^2 = \frac{e}{8}$$

답 ③

$$4 \quad f(x) = \frac{4}{x} \text{로 놓으면 } f'(x) = -\frac{4}{x^2}$$

$f'(2) = -1$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 방정식은


$$y - 2 = -(x - 2), \text{ 즉 } y = -x + 4$$

직선 $y = -x + 4$ 와 곡선 $y = \frac{3}{x}$ 의 교점의 x 좌표를 구하면

$$-x + 4 = \frac{3}{x}, x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$(x - 1)(x - 3) = 0$$

$$x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$




따라서 직선 $y = -x + 4$ 와 곡선 $y = \frac{3}{x}$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}&\int_1^3 \left((-x + 4) - \frac{3}{x} \right) dx \\ &= \left[-\frac{1}{2} x^2 + 4x - 3 \ln |x| \right]_1^3 \\ &= \left(-\frac{9}{2} + 12 - 3 \ln 3 \right) - \left(-\frac{1}{2} + 4 - 0 \right) \\ &= 4 - 3 \ln 3\end{aligned}$$

답 ①

5



$$S_1 + S_2 = \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \left[\sin x \right]_0^{\pi/2} = 1$$

이때 $S_2 = 2S_1$ 이므로

$$S_1 = \frac{1}{3}, S_2 = \frac{2}{3}$$

정답과 풀이

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표를

$\alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 라 하면

$$\cos \alpha = k \sin \alpha \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ 에 $\textcircled{1}$ 을 대입하면

$$(k \sin \alpha)^2 + \sin^2 \alpha = 1, \sin^2 \alpha = \frac{1}{k^2 + 1}$$

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이므로

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}, \cos \alpha = \frac{k}{\sqrt{k^2 + 1}} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

한편 닫힌구간 $[0, \alpha]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 이므로

$$S_1 = \int_0^\alpha |f(x) - g(x)| dx$$

$$= \int_0^\alpha \{f(x) - g(x)\} dx$$

$$= \int_0^\alpha (\cos x - k \sin x) dx$$

$$= \left[\sin x + k \cos x \right]_0^\alpha$$

$$= \sin \alpha + k \cos \alpha - k$$

$$= \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}} + \frac{k^2}{\sqrt{k^2 + 1}} - k$$

$$= \frac{k^2 + 1}{\sqrt{k^2 + 1}} - k$$

$$= \sqrt{k^2 + 1} - k$$

$$\text{즉, } \sqrt{k^2 + 1} - k = \frac{1}{3} \text{에서 } \sqrt{k^2 + 1} = k + \frac{1}{3}$$

양변을 제곱하면

$$k^2 + 1 = k^2 + \frac{2}{3}k + \frac{1}{9}, \frac{2}{3}k = \frac{8}{9}, k = \frac{4}{3}$$

$k = \frac{4}{3}$ 를 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \cos \alpha = \frac{4}{5}$$

닫힌구간 $\left[\alpha, \frac{\pi}{2} \right]$ 에서 $f(x) \leq g(x)$ 이므로

$$S_3 = \int_\alpha^{\frac{\pi}{2}} |f(x) - g(x)| dx$$

$$= \int_\alpha^{\frac{\pi}{2}} \{g(x) - f(x)\} dx$$

$$= \int_\alpha^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{4}{3} \sin x - \cos x \right) dx$$

$$= \left[-\frac{4}{3} \cos x - \sin x \right]_\alpha^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= (-1) - \left(-\frac{4}{3} \cos \alpha - \sin \alpha \right)$$

$$= -1 + \frac{4}{3} \times \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{2}{3}$$

답 ③

다른 풀이

$k = \frac{4}{3}$ 이므로 다음과 같이 S_3 의 값을 구할 수 있다.

$g(x) = \frac{4}{3} \sin x$ 이고 $S_2 + S_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx$ 이므로

$$S_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx - S_2$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{3} \sin x dx - \frac{2}{3}$$

$$= \left[-\frac{4}{3} \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{3}$$

$$= \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

6 $f(x) = x^2 e^{-x+2}$ 에서

$$f'(x) = 2xe^{-x+2} - x^2 e^{-x+2}$$

$$= -x(x-2)e^{-x+2}$$


$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| x | \dots | 0 | \dots | 2 | \dots |
|---------|------------|----|------------|----|------------|
| $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ |
| $f(x)$ | \searrow | 극소 | \nearrow | 극대 | \searrow |

$f(0) = 0$, $f(2) = 4$ 이고, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



방정식 $f(x) = f(k)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 양수 k 의 값은 2이고, 이때 $f(2) = 4$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ ($x \geq 0$)과 y 축 및 직선 $y = 4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$S = \int_0^2 \{4 - f(x)\} dx$$

$$= \int_0^2 (4 - x^2 e^{-x+2}) dx$$

$$= \left[4x \right]_0^2 - \int_0^2 x^2 e^{-x+2} dx$$

$$= 8 - \int_0^2 x^2 e^{-x+2} dx$$

$\int_0^2 x^2 e^{-x+2} dx$ 에서 $u_1(x)=x^2$, $v_1'(x)=e^{-x+2}$ 으로 놓으면

$u_1'(x)=2x$, $v_1(x)=-e^{-x+2}$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 e^{-x+2} dx &= \left[-x^2 e^{-x+2} \right]_0^2 + 2 \int_0^2 x e^{-x+2} dx \\ &= -4 + 2 \int_0^2 x e^{-x+2} dx\end{aligned}$$

또 $\int_0^2 x e^{-x+2} dx$ 에서 $u_2(x)=x$, $v_2'(x)=e^{-x+2}$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned}u_2'(x)=1, v_2(x)=-e^{-x+2} \text{이므로} \\ \int_0^2 x e^{-x+2} dx &= \left[-x e^{-x+2} \right]_0^2 + \int_0^2 e^{-x+2} dx \\ &= -2 + \left[-e^{-x+2} \right]_0^2 \\ &= -2 + (-1 + e^2) = e^2 - 3\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 e^{-x+2} dx &= -4 + 2 \int_0^2 x e^{-x+2} dx \\ &= -4 + 2(e^2 - 3) = 2e^2 - 10\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}S &= \int_0^2 \{4 - f(x)\} dx \\ &= 8 - \int_0^2 x^2 e^{-x+2} dx \\ &= 8 - (2e^2 - 10) = 18 - 2e^2\end{aligned}$$

답 ④

- 7 $e \leq t \leq e^2$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 를 포함하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{\ln t}{\sqrt{t}} \right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{(\ln t)^2}{t}$$

구하는 입체도형의 부피를 V 라 하면

$$V = \int_e^{e^2} S(t) dt = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_e^{e^2} \frac{(\ln t)^2}{t} dt$$

이때 $\ln t = s$ 로 놓으면 $t=e$ 일 때 $s=1$, $t=e^2$ 일 때 $s=2$ 이

고, $\frac{ds}{dt} = \frac{1}{t}$ 이므로

$$\begin{aligned}V &= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_e^{e^2} \frac{(\ln t)^2}{t} dt = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^2 s^2 ds \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{1}{3} s^3 \right]_1^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{7}{3} \\ &= \frac{7\sqrt{3}}{12}\end{aligned}$$

따라서 $p=12$, $q=7$ 이므로

$$p+q=19$$

답 19

8 $x=2 \ln(t^2-1)$ 에서 $\frac{dx}{dt} = \frac{4t}{t^2-1}$

$y=2t$ 에서 $\frac{dy}{dt} = 2$

$$\begin{aligned}\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 &= \left(\frac{4t}{t^2-1} \right)^2 + 4 \\ &= \frac{16t^2 + 4(t^2-1)^2}{(t^2-1)^2} \\ &= \frac{16t^2 + 4(t^4 - 2t^2 + 1)}{(t^2-1)^2} \\ &= \frac{4(t^2+1)^2}{(t^2-1)^2}\end{aligned}$$

따라서 $3 \leq t \leq 7$ 에서 이 곡선의 길이는

$$\begin{aligned}&\int_3^7 \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt \\ &= \int_3^7 \sqrt{\frac{4(t^2+1)^2}{(t^2-1)^2}} dt \\ &= \int_3^7 \frac{2(t^2+1)}{t^2-1} dt \\ &= 2 \int_3^7 \left\{ 1 + \frac{2}{(t-1)(t+1)} \right\} dt \\ &= 2 \int_3^7 \left(1 + \frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt \\ &= 2 \left[t + \ln |t-1| - \ln |t+1| \right]_3^7 \\ &= 2 \{ (7 + \ln 6 - \ln 8) - (3 + \ln 2 - \ln 4) \} \\ &= 2 \left(4 + \ln \frac{3}{2} \right) = 8 + 2 \ln \frac{3}{2}\end{aligned}$$

답 ④

Level 3 실력 완성

본문 102쪽

1 ② 2 ① 3 ④

1 $f(x)=(x-1)^2 e^x$ 에서

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2(x-1)e^x + (x-1)^2 e^x \\ &= (x^2-1)e^x\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} f'\left(\frac{k}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n \left(1 + \frac{k}{n}\right)} f'\left(\frac{k}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} f'\left(\frac{k}{n}\right)\end{aligned}$$

정답과 풀이

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \frac{f'(x)}{1+x} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{(x^2-1)e^x}{x+1} dx \\
 &= \int_0^1 (x-1)e^x dx
 \end{aligned}$$


이때 $\int_0^1 (x-1)e^x dx$ 에서 $u(x)=x-1$, $v'(x)=e^x$ 으로

놓으면 $u'(x)=1$, $v(x)=e^x$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} f'\left(\frac{k}{n}\right) &= \int_0^1 (x-1)e^x dx \\
 &= \left[(x-1)e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\
 &= 1 - \left[e^x \right]_0^1 \\
 &= 1 - (e-1) \\
 &= 2-e
 \end{aligned}$$

답 ②

2 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 는 그림과 같다.



곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=t$ 의 두 교점 A, B의 x 좌표를 각각 $\alpha(t)$, $\beta(t)$ ($\alpha(t) < \beta(t)$)라 하면

$$0 < \alpha(t) < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < \beta(t) < \pi \text{이고}$$

$$f(\alpha(t))=t, f(\beta(t))=t$$

또 곡선 $y=f(x)$ 가 직선 $x=\frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로

$$\alpha(t) + \beta(t) = \pi, \text{ 즉 } \beta(t) = \pi - \alpha(t)$$

한편 $f(x)=2 \sin x$ 에서 $f'(x)=2 \cos x$

$f(\alpha(t))=t$ 의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$f'(\alpha(t))\alpha'(t)=1$$

$$\alpha'(t) = \frac{1}{f'(\alpha(t))} = \frac{1}{2 \cos \alpha(t)}$$

$f(\beta(t))=t$ 의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$f'(\beta(t))\beta'(t)=1$$

$$\begin{aligned}
 \beta'(t) &= \frac{1}{f'(\beta(t))} = \frac{1}{2 \cos \beta(t)} \\
 &= \frac{1}{2 \cos(\pi - \alpha(t))} = -\frac{1}{2 \cos \alpha(t)}
 \end{aligned}$$

이때 $g(t)=\beta(t)-\alpha(t)$ 이므로

$$\begin{aligned}
 g'(t) &= \beta'(t) - \alpha'(t) \\
 &= -\frac{1}{2 \cos \alpha(t)} - \frac{1}{2 \cos \alpha(t)} \\
 &= -\frac{1}{\cos \alpha(t)}
 \end{aligned}$$

이고 $g'(t)=-2$ 에서

$$-\frac{1}{\cos \alpha(t)} = -2, \cos \alpha(t) = \frac{1}{2}$$

$$0 < \alpha(t) < \frac{\pi}{2} \text{이므로 } \alpha(t) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{그러므로 } k=f\left(\frac{\pi}{3}\right)=2 \sin \frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$$


이때 $A\left(\frac{\pi}{3}, \sqrt{3}\right)$, $B\left(\frac{2}{3}\pi, \sqrt{3}\right)$ 이고 두 점 A, B에서 각각

곡선 $y=f(x)$ 에 그은 접선은 직선 $x=\frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 및 직선 $x=\frac{\pi}{2}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 2배와 같다.

먼저 $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=2 \cos \frac{\pi}{3}=1$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점

$A\left(\frac{\pi}{3}, \sqrt{3}\right)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-\sqrt{3}=x-\frac{\pi}{3}, \text{ 즉 } y=x-\frac{\pi}{3}+\sqrt{3}$$



따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}
 S &= 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left\{ \left(x - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3} \right) - 2 \sin x \right\} dx \\
 &= 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \left\{ x - 2 \sin x - \left(\frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \right) \right\} dx \\
 &= 2 \left[\frac{1}{2} x^2 + 2 \cos x - \left(\frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \right) x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= 2 \left\{ \left(\frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} \pi \right) - \left(\frac{\pi^2}{18} + 1 - \frac{\pi^2}{9} + \frac{\sqrt{3}}{3} \pi \right) \right\} \\
 &= 2 \left(\frac{\pi^2}{72} + \frac{\sqrt{3}}{6} \pi - 1 \right) \\
 &= \frac{\pi^2}{36} + \frac{\sqrt{3}}{3} \pi - 2
 \end{aligned}$$

답 ①

3 $f(x) = \frac{ax}{\sqrt{1+x^2}}$ 에서

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a \times \sqrt{1+x^2} - ax \times \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{(\sqrt{1+x^2})^2} \\ &= \frac{a(1+x^2) - ax^2}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{a}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}} \\ f''(x) &= \left[\frac{a}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} \right]' \\ &= \frac{-a \times \frac{3}{2} \times (1+x^2)^{\frac{1}{2}} \times 2x}{(1+x^2)^3} \\ &= \frac{-3ax}{(1+x^2)^2\sqrt{1+x^2}} \end{aligned}$$

$f''(x)=0$ 에서 $x=0$


모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

| | | | |
|----------|------------|-----|--------------------|
| x | ... | 0 | ... |
| $f'(x)$ | + | a | + |
| $f''(x)$ | + | 0 | - |
| $f(x)$ | \nearrow | 0 | \curvearrowright |

모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 는 원점에 대하여 대칭이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

$x > 0$ 일 때 $f''(x) < 0$ 이므로 $x > 0$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 위로 볼록, $x < 0$ 일 때 $f''(x) > 0$ 이므로 $x < 0$ 에서 곡선 $y=f(x)$ 는 아래로 볼록하고, $f(0)=0$ 이므로 점 $(0, 0)$ 은 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

또 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -a$ 이고, $f'(0) = a > 1$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 를 좌표평면에 나타내면 그림과 같다.



두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 x 좌표이므로

$$\frac{ax}{\sqrt{1+x^2}} = x \text{에서}$$

$$ax = x\sqrt{1+x^2}, \quad x(\sqrt{1+x^2} - a) = 0$$


$a > 1$ 이므로

$$x=0 \text{ 또는 } x=\sqrt{a^2-1} \text{ 또는 } x=-\sqrt{a^2-1}$$

$$\text{그러므로 } k=\sqrt{a^2-1} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 서로 다른 세 점

$(-k, -k)$, $(0, 0)$, (k, k) 에서 만나고, 곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=x$ 를 좌표평면에 나타내면 그림과 같다.



한편 함수 $g(x)$ 는 함수 $f(x)$ 의 역함수이므로

$$f(g(x)) = x$$

위 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(g(x))g'(x) = 1$$

이때 모든 실수 x 에 대하여 $f'(g(x)) > 0$ 이므로

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}$$

그러므로

$$\begin{aligned} \int_0^k \frac{x}{f'(g(x))} dx &= \int_0^k x g'(x) dx \\ &= \left[xg(x) \right]_0^k - \int_0^k g(x) dx \\ &= kg(k) - \int_0^k g(x) dx \\ &= k^2 - \int_0^k g(x) dx \end{aligned}$$

$$\text{즉, } k^2 - \int_0^k g(x) dx = 2$$

위 그림에서 $k^2 - \int_0^k g(x) dx$ 의 값은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같으므로

$$\int_0^k f(x) dx = 2, \quad \text{즉 } \int_0^k \frac{ax}{\sqrt{1+x^2}} dx = 2$$

정답과 풀이

이때 $1+x^2=t$ 로 놓으면 $x=0$ 일 때 $t=1$, $x=k$ 일 때

$t=1+k^2$ 이고 $\frac{dt}{dx}=2x$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^k \frac{ax}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int_1^{1+k^2} \frac{a}{2\sqrt{t}} dt \\ &= \left[a\sqrt{t} \right]_1^{1+k^2} \\ &= a(\sqrt{1+k^2}-1)\end{aligned}$$


즉, $a(\sqrt{1+k^2}-1)=2$ ㉠

㉠에서 $a=\sqrt{1+k^2}$ 이므로 이를 ㉠에 대입하면

$$a(a-1)=2, \quad a^2-a-2=0$$

$$(a-2)(a+1)=0$$

$a>1$ 이므로 $a=2$ 이고 $k=\sqrt{3}$



따라서 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned}S &= 4 \int_0^{\sqrt{3}} \{f(x)-x\} dx \\ &= 4 \left\{ \int_0^{\sqrt{3}} f(x) dx - \int_0^{\sqrt{3}} x dx \right\} \\ &= 4 \left(2 - \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \right) \\ &= 4 \times \frac{1}{2} \\ &= 2\end{aligned}$$

답 ④

수능 기출의 미래

두꺼운 분량을 벗어난 가장 완벽한 기출문제집
쉬운 문항은 간략하고 빠르게,
고난도 문항은 상세하고 심도 있게