



“배려와 사랑으로 모두가 행복한 학교”

# 가 정 통 신 문

<http://school.jbedu.kr/muju>

등록번호: 2022-92호

발송일자: 2022.9.8

담당부서: 보건실

문의전화: 322-2018

제 목 : HPV(사람유두종바이러스) 국가예방접종 지원사업의 대상 및 접종안내

학부모님 안녕하십니까?

질병관리청에서는 HPV(사람유두종바이러스) 국가예방접종 지원사업의 대상을 올해('22.3.14.~)부터 확대하여 시행하고 있습니다.

※ 사람유두종바이러스 감염증으로 인해 유발되는 암의 90% 이상 예방효과가 있음  
이에, 귀댁의 자녀가 무료접종 대상자임을 확인하시고 예방접종에 참여할 수 있도록 다음과 같이 안내해 드리오니 예방접종에 적극적인 참여를 부탁드립니다.

-다음-

가. 접종 대상 및 내용

구분	기존	확대
지원대상 (2022년 기준)	▲ 만 12세 여성 청소년 (2009.1.1. ~ 2010.12.31. 출생자)	▲ 만 13 ~ 17세 여성 청소년 (2004.1.1. ~ 2008.12.31. 출생자) ▲ 만 18 ~ 26세 저소득층 여성 <sup>1)</sup> (1995.1.1. ~ 2003.12.31. 출생자)
지원내용	▲ 예방접종 및 건강상담비용	▲ 예방접종비용(건강상담 미지원)
지원기간	▲ 1차 접종일로부터 24개월 하루 전까지	▲ 1차 접종일~ 12개월 하루 전까지
지원백신	▲ HPV 2가(서바릭스) 또는 HPV 4가(가다실)	
접종기관	▲ 전국 지정의료기관 <sup>2)</sup> 및 보건소* <b>무주군의 경우 보건의료원(HPV 4가)만 가능</b>	

나. 접종횟수 및 간격

- 1) (첫 접종 나이 만 9~14세) 6~12개월 간격으로 2회 접종
- 2) (첫 접종 나이 만 15세 이상)
  - HPV 2가: 0, 1, 6개월 간격으로 3회 접종
  - HPV 4가: 0, 2, 6개월 간격으로 3회 접종.

2022. 9. 8.

무 주 중 학 교 장 (직인생략)



질병관리청

질병관리청 1339  
질병관리본부 센터

NIP 예방접종의 모든 것  
예방접종도우미

# 2022년 HPV 국가예방접종 지원사업 안내

건강여성첫걸음(기존사업) + HPV 예방접종사업(확대 대상)



## 접종 필요성

- ✓ '자궁경부암'은 사람유두종바이러스(HPV) 감염이 주 원인으로, HPV 예방접종을 통해 자궁경부암 등 관련 암에 대해 90% 이상의 높은 예방 효과를 확인할 수 있습니다.
- ✓ HPV 예방접종은 HPV 감염의 가장 큰 원인인 성경험 이전에 접종을 권고하고 있으며, 만 12세가 지났어도 성경험이 없는 경우라면 예방효과가 높아 대상자 확대를 통한接种의 기회를 높이고자 합니다.

## 지원 대상 및 지원 내용

### 건강여성 첫걸음 클리닉 사업

**지원 대상** 만 12세 여성 청소년(2009~2010년 출생자)

**지원 내용** 예방접종, 건강상담

※건강상담의 경우, 국민건강보험 급여대상이 아닐 시  
보건소에서만 가능

### HPV 예방접종 사업

**지원 대상** 만 13~17세 여성 청소년(2004~2008년도 출생자),

만 18~26세 저소득층\* 여성(1995~2003년도 출생자)  
(주민등록상 출생연도 기준)

**지원 내용** 예방접종

\* 저소득층: 기초생활수급자 및 차상위계층 (기준중위소득 50% 이하)

## 접종 기관

**지정의료기관** 예방접종도우미 누리집 또는 앱에서 확인(<https://nip.kdca.go.kr>)

**보건소** 방문 전 접종가능 여부 확인 필수

## 접종 횟수

### 건강여성 첫걸음 클리닉 사업

2회

### HPV 예방접종 사업

첫 접종 나이 기준 만 12~14세 2회, 만 15세 이상 3회

※자세한 접종 일정은 접종 당일 지정의료기관 또는 보건소에서 상담

## 예방접종 전·후 주의사항

- ✓ 안전한 예방접종을 위해 미성년자는 보호자와 동행하도록 합니다.
- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받도록 합니다.
- ✓ 중증도 이상의 심한 급성질환이 있는 경우에는 접종을 연기하나, 감기 등 가벼운 질환을 앓는 경우는 접종 시행 가능합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 백신 접종 후 통증으로 일시적으로 실신하는 경우가 있으나 예방접종 후 20~30분 동안 접종기관에 앉아있거나 누워있는 것으로 예방이 가능합니다.
- ✓ 예방접종 후 2~3일간은 주의 깊게 관찰하고, 평소와 다른 신체증상이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

※자세한 예방접종 안내는 보건소 및 의료기관에서 가능합니다.