



질병관리청 KHA 대한역사학회



# 코로나19 예방접종 후 이상반응에 대한 안내

## 이럴 땐, 이렇게 하세요.

- 접종 후 접종부위 부기·통증이 있는 경우, 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 양말집을 하세요.
- 접종 후 미열이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하세요.
- 접종 후 발열, 근육통 등으로 불편할 경우, 해열·진통제를 복용하시면 도움이 됩니다.
- 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜·살icylic acid의 해열·진통제를 준비하고, 예방 접종 후 증상 증상이 있으면 해열·진통제를 복용하세요.

## 이럴 땐, 의사진료를 받으세요.

- 접종 후 접종부위 부기·통증, 발적(48시간이 지나도 호전되지 않는 경우)
- 접종 후 간지러움 기운이 떨어지거나 패스와 다른 이상증상이 나타난 경우
- **심근염·심낭염·심낭막염·심낭막염 의심 증상**
- 접종 후 심한 또는 2일 이상 지속되는 두통이 발생하며, 진통제에 반응하지 않거나 조절되지 않는 경우 또는 구토 등 동반하거나 사야가 호전되는 경우
- 접종 후 4주 이내에 호흡곤란, 흉통, 지속적인 복부 통증, 팔·다리 부기와 같은 증상이 나타난 경우
- **신장염 및 신장질환 의심 증상**
- 접종 후 접종부위가 아닌 곳에서 양이나 출혈이 생긴 경우 등
- 가슴 통증, 압박감, 불쾌감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우

## 이럴 땐, 119에 신고 또는 응급실을 방문하세요.

- 접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
- 접종 후 인슐, 얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
- 접종 후 간지러움의식이 없거나 쓰러진 경우

2021.07.05.

## 코로나19 예방접종 후 심근염 및 심낭염 안내

### 심근염/심낭염이란?

- 심근염(myocarditis)은 심장의 근육에 발생한 염증입니다.
- 심낭염(pericarditis)은 심장을 둘러싼 막에 생긴 염증입니다.

미국에서 mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후 심근염/심낭염이 드물게 보고되고 있으며, 한지들의 특징은 다음과 같습니다

\*미국에서 mRNA 코로나19 백신 접종 후 심근염/심낭염 1,000건 이상(화이자 42건/mRNA 백신 접종 300건) 보고되고 있음

- 주로 16세 이상의 남자 청소년과 젊은 연령층의 남지에서 발생
- mRNA 코로나19 백신 접종 후 발생했으며, 지난 2차 접종 후 더 많이 발생
- 일반적으로 백신 접종 후 수 일 이내에 발생
- 대부분의 환자는 치료와 휴식 후 빠르게 호전되었고, 호전된 후 정상적인 일상 활동이 가능했음

“ 코로나19 예방접종 후 아래의 증상이 새롭게 발생되거나 악화되어 지속되는 경우 의료기관의 진료를 받으시기 바랍니다. ”

### 심근염/심낭염 주요 증상

- 기슴 통증, 압박감, 불쾌감
- 호흡곤란 또는 숨가쁨, 호흡시 통증
- 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림
- 실신



## 코로나19 예방접종 후 심근염 및 심낭염 Q&A

### Q1 심근염과 심낭염은 어떤 질병인가요?

심근염은 심장의 근육에 염증이 발생하는 질병이고, 심낭염은 심장을 둘러싼 막에 염증이 생기는 질병입니다.

### Q2 어떤 백신 접종 후에 심근염/심낭염이 발생하나요?

mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후 심근염 및 심낭염 발생이 보고되고 있습니다.

### Q3 심근염이나 심낭염의 의심증상은 무엇인가요?

코로나19 백신 접종 후 의심증상이 발생하면 어떻게 해야 하나요?

심근염/심낭염의 주요 증상은 가슴통증·압박감·불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 흉통, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 심신 등입니다. 코로나19 백신 접종 후 이런 의심증상이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우 의료기관을 방문하여 진료를 받으시기 바랍니다.

### Q4 다른 나라에서 코로나19 백신 접종 후 심근염/심낭염은 얼마나 발생했나요?

미국에서는 2021년 4월 이후 mRNA 백신 접종 후 심근염/심낭염이 1000건 이상 발생(mRNA 코로나19 백신 접종 100만건당 약 4.1건 수준) 했습니다(2021.6.11 기준). 주로 16세 이상의 남자 청소년과 젊은 연령층의 남자에서 발생하고, 1차보다 2차 접종 후 더 많이 발생했습니다.