

백일해 예방 및 전파 차단 안내

학부모님, 안녕하십니까?

최근 백일해(의사)환자가 증가하는 추세로 이에 관한 정보 및 주의사항을 안내드리오니 백일해 예방 및 전파 차단에 유의해 주시기 바랍니다.

■ 백일해란?

- 전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병으로 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 점진적으로 심해져서 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타납니다. 호흡기 분비물을 통하여 호흡기로 감염되므로 손 위생 등 개인 위생 수칙을 준수하고, 증상이 있는 사람과의 접촉을 피하시기 바랍니다.

■ 예방접종의 중요성

- 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우, 의사와 상의하여 연령에 알맞은 백일해 포함 백신(DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)을 접종받도록 합니다.

※ 연령별 예방접종

- (소아) 생후 2, 4, 6, 15~18개월, 4~6세에 DTaP 백신으로 접종
11~12세에 Tdap 백신으로 추가접종
이후 Td 또는 Tdap 백신으로 매 10년마다 추가접종 실시
- (성인) 과거 접종력이 없는 경우 최소 4주 간격을 두고 2회 접종
2차 접종 후, 6~12개월 후에 Td 또는 Tdap 백신으로 총 3회 접종

■ 자녀가 백일해에 걸렸거나 의심될 경우

- 백일해에 걸렸거나 의심될 경우 의료기관/보건소에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다.
- 백일해를 진단받은 경우 학교·담임선생님께 백일해에 확진됨을 알립니다.
- 백일해 항생제 치료 중인 경우에는 진단 후, 5일까지 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 등교를 하지 않고 자택 격리 치료 또는 입원 치료를 받도록 합니다.
- 손 씻기를 자주하고 기침·재채기 시, 반드시 휴지를 사용하거나 옷으로 가리고 하도록 합니다.
- 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용합니다.

2023. 12. 6.



남원한빛중학교장(관인생략)

※ 본교 홈페이지 <http://school.ibedu.kr/nwhb> 학부모자료/가정통신문에서도 보실 수 있습니다.