



중학교 입학생(6학년) 예방접종 확인 안내

감염병 예방과 건강한 생활을 위해 학부모님께 당부 말씀드립니다.

- ▣ 초등학교 6학년 중학교 입학예정 학생은 본인의 건강은 물론 함께 공부하는 친구들의 건강을 위해 빠트린 예방접종이 없는지 반드시 확인하고, 예방접종을 완료하여야 합니다.
- ▣ 가까운 지정의료기관(질병관리청 누리집 확인 <http://nip.cdc.go.kr>)을 방문하여 접종하세요.

□ 예방접종의 중요성

- 예방접종은 감염병 예방에 가장 효과적이고 안전한 수단으로 예방접종을 받으면 감염이 되더라도 심각한 합병증을 피할 수 있습니다.
- 단체생활을 하는 아동은 만 11~12세 시기에 받아야 하는 예방접종을 소홀히 하는 경향이 있어 감염병에 노출되기 쉽습니다. 따라서, 중학교 입학생은 본인의 건강과 함께 공부하는 친구들의 건강을 위해 빠트린 예방접종이 없는지 확인하고 예방접종을 완료하여야 합니다.

【어린이 필수예방접종 일정】

접종명/ 간격	1회	2회	3회	4회	5회	비고
BCG(결핵)	4주이내					피내
B형간염	출생일	1개월	6개월			근육
DTaP(디프테리아, 파상풍, 백일해)	2개월	4개월	6개월	15~18개월	만4~6세	근육
폴리오(소아마비)	2개월	4개월	6개월	만4~6세		근육/피하
수두	12~15개월					피하
MMR(홍역, 볼거리, 풍진)	12~15개월	만4~6세				피하
일본뇌염	12~24개월	1주일 후	1년 후 1회	만6세	만12세	피하
Tdap/Td	만11~12세					근육
HPV(사람유두종바이러스)	만12세(여)	6개월 후				여학생만

* 자녀 예방접종 기록은 예방접종도우미 누리집(<http://nip.cdc.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※ 표준일정에 늦었더라도 <따라잡기 접종>을 통해 예방접종을 완료하면 면역 형성에는 지장이 없으므로
누락된 접종은 가급적 빨리 예방접종 받는 것이 좋습니다.

※ 예방접종 내역이 전산등록 되어 있는 경우, 학교에 <예방접종증명서>를 제출하지 않아도 됩니다.

□ 초등학교 6학년(만 11~12세) 추가접종 안내

- Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 또는 Td(파상풍, 디프테리아), 일본뇌염(사백신 5차, 생백신 2차)
- HPV(사람유두종바이러스) 1차 접종 (만12세 희망 여학생만 해당)
- 2차 접종은 1차 접종 6개월 후

* 접종을 받기 전 방문하고자 하는 병·의원이 지정의료기관인지, 접종하고자 하는 백신을 보유하고 있는지 확인 후 방문하시길 바랍니다.

2022. 12. 13.

남원중앙초등학교장 김동오

예방접종내역 전산등록 확인 방법 등 안내

1) 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에 회원가입하고, 자녀를 등록합니다.

- 예방접종도우미 누리집 → 예방접종관리 → 자녀예방접종관리 → 아이정보 등록

2) 등록된 자녀의 접종 내역을 다음의 방법으로 확인합니다.

- 예방접종도우미 누리집 로그인 → 예방접종관리 → 자녀예방접종관리 → 아이 예방접종 내역조회

3) 접종 내역이 없는 경우 다음 절차에 따라 전산 등록이 필요합니다.

- 예방접종을 완료하지 않은 경우 가까운 지정 의료기관 또는 보건소에서 접종을 완료하고, 예방접종도우미 누리집에서 예방접종 전산 등록 내역을 확인합니다.
- 예방접종을 완료하였으나 전산등록 되어 있지 않은 경우 접종받은 기관(의료기관 또는 보건소)에 전산등록을 요청합니다.
- 의료기관 폐업*으로 접종기관에서 전산등록이 불가능한 경우에는 보건소에 전산등록을 요청합니다.

* 「의료법」 제40조에 의거하여 진료기록부를 관할 보건소에 이관하도록 하고 있습니다. 그러나, 의료기관 개설자가 진료기록부 등의 보관계획서를 제출하여 관할 보건소장의 허가를 득한 경우에는 직접 보관이 가능하도록 하고 있습니다.

- 외국에서 접종한 경우 접종받았던 외국 의료기관에 <영문 예방접종증명서> 또는 접종기관의 직인이나 공식사인 된 서류를 발급(팩스 또는 이메일 등을 이용) 요청하신 후 가까운 보건소에 전산 등록을 요청하시기 바랍니다.

4) ‘예방접종 금기자’는 접종(진단)받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산 등록을 요청하시기 바랍니다.

■ 예방접종 금기자

- 백신 성분에 대해서 또는 이전 백신 접종 후에 심한 알레르기 반응(아나필락시스)이 발생했던 경우
- 백일해 백신 투여 7일 이내에 다른 이유가 밝혀지지 않은 뇌증이 발생했던 경우
- 면역결핍자 또는 면역억제제 사용자

5) 예방접종이 자연 실시된 경우 다음의 사항을 참고하시기 바라며, 자세한 접종 일정은 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.

- 일본뇌염 불활성화 백신 3차 또는 4차 접종을 만 10세 이후에 실시한 경우, 더 이상의 추가접종은 불필요합니다.
- DTaP 백신 접종을 완료하지 못해 만 7~10세에 Tdap(또는 Td) 백신을 1회 접종받은 어린이의 경우, 만 11~12세에 Tdap 백신으로 추가접종이 필요합니다.