



소중한 나, 행복하게 성장하는 우리

가정통신문

우)55737
 남원시 춘향로 73번지
<http://www.nwys.ms.kr>
 교무실 : (063) 633-4549
 팩 스 : (063) 631-4734

감염병 수두 환자 발생에 따른 자녀 건강 지도 안내

학부모님, 안녕하십니까?

교내에 『수두』 확진학생이 발생하여 감염병 예방 및 전파 차단을 위해 아래와 같이 안내드립니다.

자녀가 가정에서 외출 후 반드시 손발을 씻고 양치질하기 등 개인위생을 철저히 할 수 있도록 학부모님들의 많은 관심 부탁드립니다.

1. 수두는 어떤 질병일까요?

- 수두는 법정 감염병으로 전염력이 높은 질환입니다. **감염 또는 감염이 의심될 경우** 학교와 같이 집단생활을 하는 곳(학원 포함)에서는 **등교중지**를 해야 합니다.
- 완치 후 등교 시 의사 소견서 또는 진단서를 제출하면 결석으로 처리하지 않습니다. (출석인정)

병원체	수두 대상포진 바이러스(Varicella Zoster Virus)에 의한 제2급 법정감염병			
전파경로	수포성 병변에 직접접촉, 호흡기 분비물의 공기전파를 통해 감염			
격리기간	모든 피부 병변에 가피(딱지)가 형성될 때까지			
전염기간	<ul style="list-style-type: none"> ■ 물집이 잡히기 1~2일 전부터 물집 잡히고 3~7일 뒤, 딱지가 생길 때까지 (격리 기간 : 발진 후 7~10일간) ■ 전염력이 매우 높아 가족 안에서 2차 전파율이 매우 높음 - 따라서 집안에 소아 및 청소년 등 수두 예방접종을 하지 않았거나 수두에 걸린 적이 없는 사람들은 환자와의 접촉을 피해야 함 			
증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 발진 시작 1~2일 전부터 권태감과 미열이 나타난 뒤 발진이 발생(소아는 발진이 첫 증상인 경우가 많음) ■ 발진은 보통 두피, 얼굴, 또는 몸통에 먼저 나타나고 사지로 퍼지는 양상이며 반점, 구진, 수포, 농포, 가피순으로 병변이 24시간 이내에 빠르게 진행됨 ■ 모든 병변에 가피가 형성되면서 회복함 			
	붉은 반점(모기 물린 것과 비슷함) 	물집 (수포성발진) 	딱지 	은꺾 
치료	대증요법(피부병소의 세균감염을 줄이기 위한 목욕, 항히스타민제 투여 등)			
예방	<ul style="list-style-type: none"> ■ 수두 예방을 위해서는 개인위생수칙을 준수하고, 수두를 앓은 적이 없거나 예방접종을 받지 않은 소아는 예방접종을 받아야 함 * 접종기준: 생후 12~15개월 1회 예방접종			

2. 예방수칙

3대 예방수칙

- ✓ **첫째**, 비누를 사용하여 30초 이상 손을 자주 씻고, 기침이나 재채기를 할 때는 손이 아닌 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 기침 예절을 지켜 주십시오.
 - ✓ **둘째**, 감염병 의심증상이 발생한 경우 다른 사람과 접촉하지 않고 곧바로 가까운 의료기관에서 진료를 받으십시오.
 - ✓ **셋째**, 집단유행을 막기 위해 감염 환자는 전염기간* 동안에는 등원·등교(학원 등 사람이 많은 장소 포함)를 하지 않도록 하십시오.
- * 등원·등교중지 기간
- ※수두: 모든 피부병변에 딱지가 앉을 때까지 격리

❖ 가정에서 지켜야 할 일

구분	지켜야할일
·발진, 식욕부진 등 수두 전신증상 확인 시	·학교 등교 전 담임 선생님께 연락 후 가까운 병·의원 진료 실시 ·모든 피부병변의 가피(딱지)가 생길 때까지 환부 자극 피함
·수두 환자와 접촉 시	·마스크를 착용하고, 접촉 후 3~5일 이내 예방접종을 권장하며, 개인위생을 철저히 준수하고 의심증상이 나타나면 즉시 병의원을 방문하여 진료받도록 권장
·병원에서 수두확진 시	·담임 선생님께 진단 사실을 알리고, 의사의 판단에 따라 입원 또는 집에서 치료 실시 및 물품 별도 사용 ·진료확인서에 기록된 격리기간 동안 등교 중지 및 사람들이 많은 장소에 가지 않도록

❖ 수두 예방접종 안내

- 가. 예방접종 권장대상: 수두 바이러스 면역의 증거가 없는* 1970년 이후 출생자
 * 면역의 증거: 수두 진단, 항체 양성, 수두 백신 접종력 중 1가지 이상
 ※ 직업별 위험군: 학생, 의료인, 학교 및 유치원 교사 등
- 나. 접종용량 및 횟수
 4~8주 간격으로, 2회 접종 [유료접종: 소아과 또는 백신이 있는 내과에서 접종]
- 다. 금기사항
- 1) 이전 접종 후 심한 알레르기 반응이 있었던 경우
 - 2) 면역 저하 및 면역결핍인 경우
 - 3) 임신부 또는 임신가능성이 있는 경우(접종 후 최소 1개월간 임신을 피해야 함)
- 라. 기타 문의사항이 있으신 분은 **남원시 보건소 예방접종실(625-7939)**로 연락

2023. 06. 13.

남 원 용 성 중 학 교 장(직인생략)

※ 이 가정통신문은 본교 홈페이지 <http://www.nwys.ms.kr> 학교소식/가정통신문에서도 보실 수 있습니다.