	<h1>삼 봉 유 치 원 교 육 통 신</h1>	<p> <span style="color: green;">놀이</span>로 배우며  <span style="color: purple;">꿈</span>을 키우는  <span style="color: orange;">행복한</span> 우리         </p>
<p>홈페이지 : <a href="http://school.jbedu.kr/sambong/">http://school.jbedu.kr/sambong/</a> 교무실 262-2115 원장실 262-1012 행정실 262-3609</p>		
<h2>홍역, 백일해 감염병 예방 안내</h2>		

안녕하십니까


질병관리청에서 해외 방문이나 환자 접촉을 통해 **홍역** 감염 사례가 발생하고, 부산을 중심으로 **백일해** 등 감염병 발생 사례가 있어 각별한 주의가 필요한 시기입니다. 학부모님들께서는 유아들의 감염병 예방 관리에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

### 1. 홍역의 주요 증상 및 전파경로

- 기침 또는 재채기 등 비말과 공기를 통해 전파되는 감염병, 전염성이 매우 높은 것이 특징임



### 2. 해외여행 시 홍역 예방 수칙



### 3. 백일해의 정의와 주요 증상

구 분	내용
정 의	• 백일해균( <i>Bordetella pertussis</i> ) 감염에 의한 급성 호흡기 질환
잠복기	• 4~21일(평균 7~10일)
전염기	• 2주간 전염력 높으며 증상 발생 4주 후에는 전염성 소실
감염경로	• 환자 또는 보균자의 <b>비말 감염</b> 에 의해 전파, <b>전염성이 강함</b>
주요증상 및 임상경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 급성 호흡기 감염병으로 <b>발작성 기침이 특징적(발열은 심하지 않음)</b></li> <li>• 카타르기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 콧물, 눈물, 경한 기침 등의 상기도 감염 증상이 1~2주간 나타남. 백일해 균의 증식이 가장 왕성하여 전염성이 제일 높은 시기</li> </ul> </li> <li>• 발작기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발작성 기침이 있으며, whooping cough, 기침 후 구토, 무호흡 등의 증상</li> </ul> </li> <li>• 회복기 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발작성 기침의 횟수나 정도가 호전됨</li> <li>- 회복은 천천히 진행되고 2~3주 후 기침은 소실되지만 비발작성 기침은 수주간 지속될 수 있음</li> </ul> </li> </ul>
진단	• 검체(비인두도말, 비인두흡인물, 가래)에서 병원체 분리 또는 특이 유전자 검출
환자관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환자 격리 : <b>비말격리(격리 기간 : 항생제 치료기간 5일까지 격리)</b></li> <li>• 접촉자 관리: 예방적 항생제 투여, 증상 발생 모니터링</li> </ul>
치료	• 항생제 치료: 증상을 완화시킬 수도 있으나 주로 이차적 전파 억제 목적
예방	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>예방접종</b></li> <li>-소아) 생후 2, 4, 6, 15~18개월, 만4~6세에 DTap 백신으로 접종 후 만 11~12세에 Tdap백신으로 추가접종 이후 Td 또는 Tdap 백신으로 매 10년마다 추가접종 실시</li> <li>-성인) 과거 접종력이 없는 경우 최소 4주 간격을 두고 2회 접종하고, 2차 접종 후 6~12개월 후에 Td 또는 Tdap 백신으로 총 3회 접종</li> <li>*연령, 예방접종력에 따라 접종일정 상이</li> </ul>



### 4. 호흡기 감염병 예방을 위한 5대 예방수칙

1. 기침예절 실천	<ul style="list-style-type: none"> <li>-호흡기 증상이 있을 시 <b>마스크</b> 착용</li> <li>-기침 할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코를 가리기</li> <li>-기침한 후에는 비누로 손씻기</li> </ul>
2. 올바른 손씻기	-흐르는 물에 비누로 <b>30초 이상</b>
3. 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기	-외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침, 재채기 후, 용변 본 후에는 반드시 비누로 손 씻기
4. 실내 환기	-하루에 최소 3회, 매회 10분 이상 창문 열기
5. 증상 시 의료기관 방문	-발열 및 호흡기 증상 시 의료기관에 방문하여 적절한 진료 받기

출처: 질병관리청 감염병 자료실

2024년 4월 25일



공립  
단설

삼봉유치원장