



삼 봉 유 치 원 교 육 통 신

놀이로 배우며
꿈을 키우는
행복한 우리

홈페이지 : <http://school.jbedu.kr/sambong/> 교무실 262-2115 원장실 262-1012 행정실 262-3609

백일해 감염병 예방 안내

안녕하십니까

최근 백일해가 전 세계적으로 유행하고 있으며, 국내 백일해 환자도 가파른 증가세를 보이고 있습니다. 이에 백일해 정보 및 예방 수칙을 안내하오니, 학부모님들께서는 유아들의 감염병 예방 관리에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

❖ 백일해 예방 안내

백일해는 전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병으로 백일해균 감염에 의한 급성 호흡기 질환입니다. 처음에는 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 기침이 점진적으로 심해져서 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타납니다. 감염된 사람이 기침이나 재채기 등을 할 때 비말을 통해 전파가 가능하며 유증상 감염자의 침, 콧물 등이 묻은 물건을 통해서도 간접적으로 전파가 가능합니다.

백일해의 증상은 무엇인가요?

백일해의 잠복기는 일반적으로 7~10일 (최소 4일~ 최장 21일)입니다. 증상은 다양하지만 크게 3가지 단계로 진행되고 발열은 심하지 않습니다.



카타르기(1~2주)

- 일반적 감기와 비슷하고 전염력이 가장 높습니다.
- 콧물, 재채기, 가벼운 기침이지만 점점 심해집니다.



경해기(4주 이상)

- 매우 심한 기침, 발작성 기침으로 밤에 더 흔하고, 하루 평균 15회 이상 발생합니다.
- 숨을 들이쉴 때 높은 소리의 흠(Whoop)소리 나는 특징이 있습니다.
- 소아와 아기는 기침을 하는 동안 얼굴이 파래질 수 있고, 구토를 하거나 탈진이 발생할 수도 있습니다.
- 기침 발작 사이엔 아파 보이지 않습니다.



회복기(2~3주)

- 발작성 기침이 서서히 줄어들며 2~3주 내 사라집니다

백일해 면역력이 없는
가족 내 접촉자에서는
70~100% 전파 가능!

백일해 예방법은?



올바른 손씻기의 생활화
흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기



기침예절 실천
휴지나 옷소매로 입과 코를 가리기



실내에서는 자주 환기하기
하루 최소 3회, 매회 10분 이상



**씻지 않은 손으로
눈, 코, 입 만지지 않기**



**기침 증상이 있는 경우 마스크 착용하
의료기관 방문하여 진료받기**



예방접종

접종일정에 맞춘 예방접종이
가장 중요합니다!



기초접종

1차
DTaP

생후 2개월

2차
DTaP

생후 4개월

3차
DTaP

생후 6개월



추가접종

4차
DTaP

생후 15~18개월

5차
DTaP

4~6세

6차
Tdap

11~12세

백일해 감염되면 어떻게 해야 하나요?


- 백일해에 걸리면 학교, 어린이집 등 **전파 차단**을 위해 전염기간 동안 **등교, 등원***을 중지하고 집에서 격리합니다.

* 등교, 등원 중지기간 :

- (적정 항생제 복용 시) 투여 후 5일까지 격리
- (치료받지 않는 경우) 기침 멈출 때까지 최소 3주 이상 격리



- 백일해 환자와 접촉한 사람은 의료기관을 방문하여 상담 후 **예방적 항생제 치료**를 고려할 수 있습니다.



참고자료: 질병관리청 (24.4.29)

2024년 6월 18일



대학
병원

삼봉유치원장