

ព័ត៌មានស្តីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការ ដោយផ្អែកលើអត្រាការរីករាល
ដាលនៃរោគខាន់ស្លាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
- បច្ចុប្បន្ននៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អត្រាកើតជំងឺខាន់ស្លាក់ នៅប្រទេស
វៀតណាមកំពុងកើនឡើង -

- ▲ ការណែនាំអំពីការចាក់ថ្នាំបង្ការ មុនពេលចាកចេញទៅប្រទេសវៀតណាម
- ▲ នៅពេលមកពីប្រទេសវៀតណាម ករណីមានរោគសញ្ញាគួរឱ្យសង្ស័យ ដូចជា គ្រុនក្តៅ, ឈឺបំពង់ក ឬភ្លាសពណ៌សគ្របដណ្តប់លើបំពង់ក ត្រូវតែរាយការណ៍ អំពីរោគសញ្ញា ទៅកាន់អាជ្ញាពិនិត្យរោគឆ្លង និងធ្វើការពិនិត្យរោគខាន់ស្លាក់។
- នៅពេលចូលប្រទេស ទោះបីជាមិនមានរោគសញ្ញាក៏ដោយ ត្រូវសង្កេតមើលពី ស្ថានភាពសុខភាពកំឡុងពេលនៃការបង្ករោគ រយៈពេល១០ថ្ងៃហើយប្រសិនបើ មានការសង្ស័យណាមួយ ទាក់ទងទៅមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈ ឬ១៣៣៩
- ▲ កុមារដែលមានអាយុក្រោម ១២ឆ្នាំ ដែលមិនបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង ត្រូវ តែអនុវត្តតាមកាលវិភាគនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការ

<ការបកប្រែនេះ គឺធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទជាន់វី ១៥៧៧-១៣៦៦ >