



마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보 발령 안내

삼례중학교
가정통신문 제 60호

2024년 7월 3일

(우)55341 전북 완주군 삼례읍 신금로 53-23

☎ 063-291-2624,

<http://samrye.ms.kr>.

학부모님, 안녕하십니까? 항상 학생들의 건강을 위해 많은 관심과 협조를 보내주심에 감사드립니다.

최근 마이코플라스마 폐렴균 감염증 환자가 유행 기준 이상 발생함에 따라, **질병관리청에서 2024.6.24. (월)자로 마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보를 발령**하였습니다. 아울러, 아동·청소년 연령대의 백일해 환자 발생이 전국 및 전북 모두 증가 추세를 보여 **호흡기 감염병에 대한 각별한 대비와 대응이 요구**되고 있으니, 자녀 건강관리에 참고하시어 감염 및 전파에 주의하시기를 바랍니다. 감사합니다.

정의	• 마이코플라스마 폐렴균(Mycoplasma pneumoniae)에 의한 급성 호흡기 감염증	
질병분류	• 법정 감염병(제4급)	
질병 코드	• J02.8&B96.0, J03.80&B96.0, J03.81&B96.0, J15.7, J20.0, J21.88&B96.0	
병원체	• 마이코플라스마 폐렴균(Mycoplasma pneumoniae)	
전파 경로	• 비말 전파(호흡기 전파)	
잠복기	• 2~3주(범위 1~4주)	
임상적 특징	<ul style="list-style-type: none">• 연중 발생하지만 주로 늦가을~초봄에 유행• 국내에서는 3~4년을 주기로 유행• 5세 이상 학동기에서 폐렴의 가장 흔한 원인• 발열, 기침, 인후통, 두통, 피로감 등의 경미한 임상증상을 시작으로• 인후염(pharyngitis) 등과 같은 상기도 감염증, 기관지염 등을 유발하며• 일부의 경우 중증의 비정형 폐렴으로 발전<ul style="list-style-type: none">- 감염 초기 발열, 두통, 콧물, 인후통이 나타나고 이어서 기침이 2주 이상 지속- 보통 증상이 3~4주가 지속되다가 회복	
전염 기간	• 증상 발현 2~8일 전부터 증상 발생 후 20일 이내(일부 문헌은 14주까지)	
치료	• 항생제 치료	
관리	환자 관리	<ul style="list-style-type: none">• 표준주의, 비말주의 준수• 급성기 증상이 있는 동안 가급적 집에서 휴식을 취하고 다른 사람과 접촉을 피하도록 권고
	접촉자 관리	<ul style="list-style-type: none">• 감염 증상 발생 여부 관찰
예방	<ul style="list-style-type: none">• 올바른 손 씻기<ul style="list-style-type: none">- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기- 외출 후, 배변 후, 식사 전후, 기저귀 교체 전후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후 등 실시• 기침 예절 준수<ul style="list-style-type: none">- 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 하기- 호흡기 증상이 있는 경우 마스크 착용• 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기	

2024년 7월 3일

삼례중학교장 (직인생략)