



국내 성홍열 발생 증가에 따른 소아·청소년 예방 관리 수칙 안내

삼례중학교
가정통신문 제69호

2025년 6월 10일

(우)55341 전북 완주군 삼례읍 신금로 53-23

☎ 063-291-2624,

<http://samrye.ms.kr>.

학부모님, 안녕하십니까?

언제나 학생들의 건강관리를 위해 많은 관심과 협조를 보내주심에 감사드립니다.

최근 국내에서 성홍열 발생이 증가하고 있으며, 특히 어린이집, 유치원, 학교 등 집단시설에서의 소아·청소년 중심 집단발생 가능성이 있어 성홍열 예방 및 관리에 각별한 주의가 필요합니다. 이에 성홍열 예방 관리 수칙을 아래와 같이 안내해 드리니, 자녀 건강관리에 참고해 주시길 바랍니다.

질병명	성홍열	
정의	'A군 베타 용혈성 연쇄구균'의 발열성 외독소에 의한 급성 발열성 질환	
질병분류	법정 감염병(제2급) : ICD-10 A38	
전파경로	<ul style="list-style-type: none">환자와 보균자의 호흡기 분비물과 직접 접촉환자와 보균자의 호흡기 분비물과 손이나 물건을 통한 간접 접촉	
호발 대상	5~15세에 주로 발생	
잠복기	1~7일 (평균 2~5일)	
주요 증상	<ul style="list-style-type: none">인후통에 동반되는 갑작스러운 발열, 두통, 식욕부진, 구토, 인두염 등발진 : 1~2일 후면 좁쌀 크기로 입 주위 및 손·발바닥 제외한 전신에 나타남붉은 얼굴 : 얼굴은 홍조가 나타나나 입 주위는 창백혀 : 처음에는 회백색이 덮이고 돌기가 현저히 두드러지는 모양에 발병 후 2~3일 지나면 붉은색을 띠고 돌기가 붓는 딸기 모양으로 새빨간 혀가 됨편도선이나 인두 후부에 점액 화농성의 삼출액, 경부 림프절 종창 등	
일반 예방 수칙	<ul style="list-style-type: none">올바른 손 씻기 준수<ul style="list-style-type: none">비누나 세정제 등을 사용하여 흐르는 물에 30초 이상 손 씻기외출 후, 식사 전, 배변 후 손 씻기기침 예절(옷소매로 가리고 기침, 마스크 사용 등) 준수수건, 물컵, 식기구 등 개인용품 공유하지 않기	
집단시설 예방·관리 수칙	평상시	<ul style="list-style-type: none">일반 예방 수칙 지속 강조(환경 소독) 가구 표면, 장난감, 손잡이, 수도꼭지 등 환경 표면을 자주 청소·소독
	의심 환자 발생 시	<ul style="list-style-type: none">성홍열 의심 증상이 있으면 이른 시일 내 의료기관 진료 안내성홍열 진단 시, 항생제 치료 시작 후 최소 24시간까지 등원 중지

2025년 6월 10일

삼례중학교장 (직인생략)