


마이코플라스마균 감염증 정보 안내

감염에 취약한 동절기를 맞이하여 독감(인플루엔자) 유행세가 지속되고 있고, 특히, 마이코플라스마 감염증(급성호흡기 감염증)이 증가하는 추세로 나타나고 있어 감염병 예방, 대응하기 위해 카드뉴스를 통해 정보를 전달하고자 합니다. 학부모께서는 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

2023.11.3. 질병관리청

부모님을 주목!

겨울철 한파 예상에 따라
마이코플라스마 페렴균
감염 유행에 대비하세요!




1/7

2023.11.3. 질병관리청

마이코플라스마 페렴균 감염증이란?

마이코플라스마 페렴균에 의한 급성 호흡기 감염증으로
연중 발생 가능하지만 4~7년 주기로 유행하고,
주로 늦가을~초봄에 유행합니다.
* 가장 최근 유행: 2019년



2/7

2023.11.3. 질병관리청

마이코플라스마 페렴균 감염증 주요 증상은?

감염 초기 발열, 두통, 인후통이 나타나고,
이어서 기침이 2주 이상 지속됩니다.
* 보통 3~4주간 지속

일반적인 감기 증상과 비슷하여 자연적으로 회복되지만,
일부 중증으로 진행되어 폐렴 등을 유발할 수 있습니다.
* 환자의 3~13%가 폐렴으로 진행

 발열
  두통
  인후통

3/7

2023.11.3. 질병관리청

마이코플라스마 페렴균 감염증 감염 경로는?

환자의 기침이나 콧물 등 호흡기 분비물의
비말 전파 또는 직접 접촉을 통해 감염될 수 있습니다.
특히, 어린이집, 유치원, 학교 등 집단시설이나
같이 거주하는 가족 사이에서 전파가 쉽게 일어날 수 있습니다.
증상이 발생한 이후 20일까지 전파가 가능하므로
예방수칙 준수가 중요합니다.



4/7

예방수칙1 일상에서!

- ☒ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ☒ 기침이나 재채기 할 때는 입과 코를 가리기
- ☒ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- ☒ 호흡기 증상 시 진료 및 휴식하기
- ☒ 증상이 있는 동안 사람 많은 곳 피하기
- ☒ 환자와 수건, 물컵 등 구분하여 사용하기

5/7

예방수칙2 보육시설·학교에서!

- ☒ 식기, 수건, 장난감의 공동사용 금지
- ☒ 호흡기 등 감염 증상 발생 여부 관찰
- ☒ 호흡기 증상이 있는 경우 등교, 등원 자제





6/7

마이코플라스마 페렴균 감염증

**예방수칙 꼭 지키시고
증상이 있을 때는
의료기관에서 진료 받으세요!**



7/7

2023. 12. 07.

성원고등학교장

