

성홍열 발생 주의 안내문

최근 어린이들에게 성홍열이 많이 발생하고 있어 성홍열 의심 증상 및 주의사항을 알려드립니다.

성홍열은 간혹 류마티스열이나 급성 사구체신염과 같은 합병증이 발생할 수 있으므로 진료를 통해 빠른 시기에 치료를 하는 것이 중요합니다.

성홍열 의심증상이 있는 경우는 빠른 시일 내에 의료기관에서 진료를 받고, 성홍열로 진단되는 경우는 의사의 처방에 따라 항생제 치료를 받으시기 바라며, **항생제 치료 시작 후 최소 24시간까지 등교를 중지**하여 주실 것을 당부 드립니다.

□ 성홍열 의심증상

- 갑작스러운 발열
- 갑자기 발생한 인두염과 인후통
- 두통, 메스꺼움, 구토, 복통
- 증상 발생 12~48시간 이내 선홍색 작은 발진

□ 성홍열 의심 또는 진단 시 주의사항

- 성홍열 의심 증상이 있는 경우 빠른 시일 내 진료
- 항생제 치료 시작 후 최소 24시간까지 등교 중지
- 항생제는 처방에 따라 모두 복용하여 치료 완료

□ 성홍열 환자 간호 시

- 충분한 수분 섭취
- 가능한 말을 삼가고 가습기 사용
- 매일 발열을 확인하고 의사의 지시에 따라 관리
- 기침이나 재채기 시 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리도록 교육
- 기침이나 재채기, 또는 코를 킁 후에는 손씻기