

학생결핵관리, 이렇게 하세요!!

예방교육

1. 2주 이상 기침하면 (보건)선생님과 상의 후 가까운 보건소나 병원을 방문하여 결핵검사

* (주요증상) 2주 이상 기침 및 가래, 발열, 수면 중 식은 땀, 체중감소

2. 올바른 기침예절 실천

- * 기침할 땐 손이 아닌 휴지나 손수건, 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리기
- * 기침한 후에는 손 씻기

유증상자 발견

- * 담임교사 : 학급 학생
- * 보건교사 : 보건실 이용 학생

결핵의 가장 대표적인 증상은 기침, 가래가 2~3주 이상 지속되는 것이다.



보호자 연락 후 귀가조치, 보건소·병원진료 안내

담임교사

* 학생정보 등
관련내용 전달

보건교사

* 진료결과 전달
* 등교중지 요청

진료결과 확인

담임교사

(결핵확진) 등교중지

보건교사

교육청 보고 / 보건소 신고

* 규칙적인 환기, 채광

학교장/
보건교사

역학조사 실시에 따른 협조 (질병관리본부·보건소 주관)

* 가정통신문 발송
* 학생 및 학부모 설명회
(방역당국 협조)

학생환자
발생

홍부 X-선 검사
(추가환자 발견 목적)

동일
학급
조사

(추가환자 발견 YES)

동일
학년
조사

(추가환자 발견 YES)

전체
학교
조사

※ 현장조사 결과에 따라 접촉자 조사 범위가 변경될 수 있음

복약중인 학생에 대한 상담 및 교육

보건교사

복약지도
중점사항



약 2주간 결핵약을 복용하면 전염성이 소실되어, 등교하여 정상적인 학교생활이 가능
(등교 전 전염성 소실여부 확인)