



‘사랑 속에서 바르고 즐겁게 자라는 어린이’
2023-2024절기 어린이 인플루엔자 국가예방접종 안내

보건실
☎ 252-2616

안녕하십니까? 귀 가정의 건강과 안녕을 기원합니다.

질병관리청에서는 인플루엔자 고위험군인 어린이의 겨울철 건강보호를 위한 2023-2024절기 인플루엔자 국가예방접종 지원사업을 진행합니다. 인플루엔자(독감) 환자가 지속적으로 발생하고 있으니 일정을 참고하시어 학생들의 건강관리에 관심을 가지고 힘써주시기 바랍니다.

가. 지원대상: 생후 6개월 ~ 13세 어린이(2010.1.1. ~ 2023.8.31. 출생아)

나. 지원내용: 인플루엔자 4가 백신

다. 접종기간: (2회 접종대상자) '23.9.20.(수) ~ '24.4.30.(화)

(1회 접종대상자) '23.10.5.(목) ~ '24.4.30.(화)

※ 2회 접종 대상(4주 간격 접종): 생후 6개월~만 9세 미만 어린이 중

① 예방접종을 처음 받는 경우

② 이전에 인플루엔자 예방접종을 총 1회만 접종한 경우

라. 접종기관: 지정 위탁의료기관

* 지정 의료기관은 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능, 백신 잔고 및
접종가능 여부를 반드시 전화 확인하고 방문

마. 기타 안내사항

- 어린이 예방접종은 반드시 부모를 동반, 부득이하게 보호자와 함께 방문하기 어려운 대상자인 경우 의료기관
방문 전 보호자가 작성한 '예방접종 시행동의서'와 '예방접종예진표' 지참 시 예방접종 가능

※ 단, 서식은 반드시 보호자(부모 또는 법정대리인)가 작성

☞ 서식 내려받기: 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) → 예방접종관리 → 관련자료 다운로드 →
'소아청소년 대상 인플루엔자 예방접종 시행 동의서 및 예방접종예진표' 검색

※ 접종 금기사항

- 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우
- 인플루엔자 백신 접종 후 심한 과민 반응 또는 계란에 심한 과민반응(아나필락시스, 쇼크 증상)의 과거력
- 과거 백신접종 후 6주 이내 길랑-바레 증후군이나 다른 신경 이상의 발생력이 있는 경우
- 현재 발열이 확인된 경우 등

※ 백신 접종은 강제사항이 아니며 희망하는 경우에만 접종을 실시하시면 됩니다.

※ 모든 예방접종은 부작용이 있을 수 있으므로 의사와 충분히 상담하시기 바랍니다.

○ 인플루엔자(독감) 진단 시 학교 내 전파 방지를 위해 등교중지를 권고합니다.

- 진료확인서 또는 의사소견서를 학교에 제출하면 출석으로 인정(사유와 기간 명시)됩니다.

- 등교중지 기간: **의사의 소견에 따른 기간**

- 중증의 증상을 보이거나 면역저하자 등의 경우는 의사의 판단에 따라 달라질 수 있음

○ 인플루엔자(독감) 예방을 위해 개인위생관리 수칙을 준수합니다.

※ 독감 예방접종 받기, 비누로 자주 손씻기, 호흡기 유증상 시 마스크 착용하기(기침예절),
증상 발생 시 의료기관에서 진료받기, 자주 실내 환기하기

2023. 9. 26.

전 주 송 천 초 등 학 교 장

2023 - 2024절기

어린이

우리 아이들의 건강을
지켜주는 예방접종!



인플루엔자 예방접종 안내문



2023-2024절기 어린이 인플루엔자 국가예방접종 지원 안내

지원대상

생후 6개월 ~ 13세 어린이 (2010.1.1. ~ 2023.8.31. 출생)

※ 실제 생년월일과 주민등록상 생년월일이 다른 어린이는 실제 생년월일 기준

지원기간

2회 접종대상자 2023.9.20.(수) ~ 2024.4.30.(화)

1회 접종대상자 2023.10.5.(목) ~ 2024.4.30.(화)

※ 예방접종 일정 및 접종횟수는 예진 의사와 상담

접종기관

지정의료기관 및 보건소

※ 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능 (보건소는 방문 전 확인 필수)

지원내용

인플루엔자 4가 예방접종 1회

※ 단, 생후 6개월 ~ 9세 미만 소아 중 아래의 대상은 2회 접종 지원되니, 접종 전 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.

- 인플루엔자 예방접종을 처음하거나 이전 접종이력을 모르는 경우

- 2023-2024절기 전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우



이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다!

- 생후 6개월 미만 영아
- 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우



이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- 인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기

예방접종도우미
바로가기 >>>



예방접종도우미

검색창에 '예방접종도우미'를
검색해주세요.



바로가기 QR코드 스캔
<https://nip.kdca.go.kr/>



예방접종 전·후 주의사항

- 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다.
- 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- 접종 부위는 청결하게 유지합니다.
- 접종 후 2~3일간은 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종을 위해 의료기관 방문 시 행동수칙



보호자와 접종대상자
모두 마스크 착용



손소독 등
개인위생 수칙 준수



대상자, 보호자는 코로나19 증상
있을 시 방문 전 알리기



접종 후 현장에서 20~30분
머무르며 이상반응 관찰 후 귀가



인플루엔자 예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생가능한 이상반응

- 국소 이상반응: 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다.

다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우
의사의 진료를 받도록 합니다.



인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등을 만지지 않기
- 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침 예절 지키기
- 기침, 콧물 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기
- 인플루엔자에 감염되었을 경우 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에 등원·등교·자제 하기
- 갑작스러운 발열과 콧물, 인후통, 근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우
- 곧바로 가까운 의료기관에서 진료 받기

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.

*예방접종피해 국가보상제도를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.



질병관리청



국민건강보험공단



대한의료협회